

“USO AGRÍCOLA”



Soleado[®]

boscalid

Fungicida / Gránulos dispersables en agua (WG)

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Boscalid: 2-cloro- <i>N</i> -(4'-clorobifenil-2-il)nicotinamida (Equivalente a 500 g de i.a./kg)	50.0
INGREDIENTES INERTES: Dispersantes, humectante, solución buffer, aglutinante y agente desintegrante.	50.0
TOTAL:	<u>100.0</u>

Registro Sanitario No.: RSCO-FUNG-0301V-X0585-420-50.0

PUEDA SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDA SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDA SER NOCIVO SI SE INHALA

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR:

ADVAN MEXICO, S.A. DE C.V.

Calle José Guadalupe Montenegro 1886 Int. 301,
Colonia Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (33) 38-12-04-44



PRECAUCIÓN

“DOCUMENTO INFORMATIVO E ILUSTRATIVO, NO TIENE VALOR LEGAL”.

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones: Durante la preparación, carga del equipo de aplicación, el manejo y aplicación de este producto; use el equipo de protección adecuado, y completo: gorra o sombrero, overol de algodón o camisa larga y pantalón largo de algodón, mascarilla contra polvos y vapores, lentes transparentes de seguridad con protección hermética lateral, guantes y botas de neopreno. No coma, beba o fume durante el manejo del producto. Después de la jornada laboral, descontamine el equipo de protección con agua y detergente separada de la ropa de uso común, báñese y utilice ropa limpia. Almacene el equipo de protección personal en el lugar de trabajo. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que se hayan contaminado seriamente con este producto.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”.
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”.
- “NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto, retire al paciente del área contaminada y aplique los siguientes primeros auxilios:

- En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y el calzado de ser necesario y lave la piel con abundante agua y jabón durante por lo menos 15 minutos. Si se presenta irritación dar atención médica.
- En caso de contacto con los ojos: Enjuague con agua limpia por lo menos durante 15 minutos, si tiene lentes de contacto, quíteselos después de haber transcurrido los primeros 5 minutos y continúe lavando los ojos.
- En caso de inhalación: retire al paciente del área de contaminación, colóquelo en un lugar fresco y ventilado bajo sombra. Si no respira dar respiración artificial por el personal capacitado y con las debidas precauciones; no dé respiración de boca a boca y utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable).
- En caso de ingestión: NO introduzca nada por la boca si la persona está inconsciente y NO provoque el vómito y consiga inmediatamente asistencia médica.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

GRUPO QUÍMICO: carboxamidas.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de sobreexposición, se pueden presentar los siguientes síntomas de intoxicación de acuerdo con el tipo de contacto. **Por contacto con la piel:** enrojecimiento y descamación. **Por inhalación:** respiración acelerada, piloerección y piel manchada. **Por ingestión:** Dificultad para respirar, temblor y apatía.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe un antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- “DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.
- “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.
- “EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.
- “EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVETEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA

ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a **ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V.**, esta reembolsará el importe pagado por el producto. Por ningún motivo **ADVAN MÉXICO, S.A. DE C.V.** asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

**"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS
AQUÍ RECOMENDADOS"
"INSTRUCCIONES DE USO"**

"SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

Soleado® (boscalid) es un fungicida con acción preventiva y curativa, recomendado para el control de las enfermedades en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (Kg/ha)	OBSERVACIONES
Ajo, Cebolla, Cebollín, Espárrago, Poro (7)	Mancha Púrpura (<i>Alternaria porri</i>)	0.15 - 0.35	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 200 - 400 L de agua/ha.
Berenjena, Chile, Jitomate, Pimiento morrón, Tomate de cáscara (0)	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	0.15 - 0.35	Realizar 3 aplicaciones al follaje de manera preventiva a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 300 - 400 L de agua/ha.
Banano (0)	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	0.30 - 0.35	Realizar 4 aplicaciones foliares a intervalos de 14 días, cuando se presenten las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 1000 - 1200 L de agua/ha.
Arándano, Frambuesa, Fresa, Grosella, Zarzamora (0)	Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0.75 - 1.25	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, de manera preventiva al presentarse las condiciones ambientales favorables para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de aplicación sugerido 400 - 600 L de agua/ha.

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 3 horas después de la aplicación.

() **Intervalo de Seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Siempre utilice el equipo de protección de seguridad al manejar el producto **Soleado®**. Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, agregue la cantidad a utilizar de **Soleado®** de acuerdo con lo indicado en la etiqueta. Agite vigorosamente y complete con agua la totalidad del tanque si dejar de agitar. Las aplicaciones deberán efectuarse cuidando que haya un buen cubrimiento del follaje para mejor control de la enfermedad.

CONTRAINDICACIONES: No realice la aplicación cuando las condiciones ambientales sean desfavorables tales como calor intenso, vientos mayores a 10 km/h e inminente pronóstico de lluvia.

FITOTOXICIDAD: Ese producto no es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No se recomienda mezclar **Soleado®** con otros productos agroquímicos. Si desea mezclar se recomienda que el usuario realice una prueba de compatibilidad en campo antes de realizar la mezcla con otros productos. Al hacer una mezcla use únicamente productos con registro vigente.

MANEJO DE RESISTENCIA: "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL."