

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar. Ter em atenção as frases de advertência e os símbolos constantes no rótulo do produto.



EPIK SG – USOS MENORES

Cultura	Praga	Ar livre/ Estufa	No máx. aplic. (interv. aplic.)	Conc./dose máxima	Intervalo Segurança
Macieira	António-da-macieira Hoplocampa-da-pereira	Ar livre	I	25 g/hL -250 g/hax	30 dias
Pereira	António-da-macieira Hoplocampa-da-pereira Cecidómia-da-pereira	Ar livre	I	25 g/hL - 250 g/ha	30 dias
Cerejeira	Mosca-da-cereja	Ar livre	I	25 g/hL - 250 g/ha	14 dias
	Drosófila	Ar livre	I	37,5 g/hL - 375 g/ha	14 dias
Ginjeira	Drosófila	Ar livre	I	37,5 g/hL - 375 g/ha	14 dias
Citrinos (inclui viveiros)	Psila-africana-citrinos	Ar livre	2 (10)	400 g/ha	14 dias
Romãzeira	Afídeos	Ar livre	I	250-350 g/ha	
Nogueira	Afídeos	Ar livre	2 (8)	25 g/hL - 250g/ha	14 dias
Figueira	Mosca-negra-do-figo	Ar livre	2	25 g/hL -250g/ha	14 dias
Abóbora-almiscarada Abóbora-manteiga Abóbora-porqueira Abóbora-cabaça Abóbora-chila	Moscas brancas	Ar livre	2 (25)	325 g/ha	14 dias
Couve-bróculo Couve-flor	Couve-bróculo Couve-flor	Ar livre	Ar livre	Ar livre	14 dias
Couve-repolho Couve-coração Couve-roxa Couve-lombarda	Áltica	Ar livre	I	250 g/ha	14 dias
Alecrim Estragão Tomilho Hortelã-comum	Cicadelídeo	Ar livre	I	250 g/ha	10 dias
		Estufa	I	250 g/ha	5 dias
Couve-chinesa (baby leaf)	Afídeos	Ar livre	I	250 g/ha	10 dias
Rabanete (baby leaf)	Áltica	Ar livre	I	250 g/ha	10 dias
		Estufa	I	250 g/ha	7 dias
Salicórnia	Afídeos	Ar livre	I	250-300 g/ha	10 dias
Ornamentais	Mosca brancas	A+E	2 (7)	400-500 g/ha	
Eucalipto	Percevejo-bronzeamento	Ar livre	2	200 g/ha	
	Psílídeo-de-concha	Ar livre	2	200 g/ha	
	Traquimela	Ar livre	2	200 g/ha	

EPIK SL® SGrânulos solúveis em água (SG) com 20 % (p/p) ou 200 g/kg de acetamipride. Autorização de venda, nº 0078 concedida pela DGAU.



EPIK®SG

INSECTICIDA SISTÉMICO
DE RÁPIDA ABSORÇÃO

- Insecticida sistémico de rápida absorção
- Alta eficácia específica contra Drosophila de asa manchada (*Drosophila suzukii*)
- Actua por ingestão e contacto
- A sua actividade translaminar e sistemica garantem uma boa protecção da planta
- Autorizado em mais de 25 culturas e contra 18 insetos diferentes



Growing attitude





CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Epik^{®SG} é um inseticida sistémico da família dos cloronicotinilos que atua ao nível do sistema nervoso central dos insetos, através da ativação e posterior bloqueio dos impulsos nervosos nos recetores acetilcolínicos das membranas pós-sinápticas.

A presença de um radical ciano-substituído na estrutura química do **Epik^{®SG}** confere-lhe características particulares, nomeadamente um menor impacto sobre himenópteros polinizadores, domésticos e selvagens.

Epik^{®SG} atua por contacto e ingestão, apresentando uma elevada eficácia e um rápido poder de choque.

A sua forte ação translaminar permite-lhe proteger, de forma eficaz e uniforme toda a planta, enquanto que a sua elevada sistemica e estabilidade no seu interior protegem os tecidos jovens em crescimento.

Epik^{®SG} atua a baixas concentrações e de forma prolongada sobre um largo espectro de insetos, sendo particularmente indicado para combater pragas que causam graves estragos nas culturas como é o caso de afídeos, moscas brancas, escaravelho de batateira, *Epitrix similis*, entre outras.

apresenta uma boa seletividade e um perfil toxicológico e ecotoxicológico favorável.



EPIK^{®SG} em resumo

Composição
acetamipride 200 g/kg ou 20 % (p/p)
Formulação
Grânulos solúveis em água
Autorização de venda
Autorização de venda nº 0078 concedida pela DGAV
Embalagens
1 Kg, 5 Kg

UTILIZAÇÕES

Cultura	Praga	Ar livre/ Estufa	No máx. aplic. (interv. aplic.)	Conc./dose máxima	Intervalo Segurança
Macieira	Afídeos - Lagartas mineiras	Ar livre	I	25 g/hL -250 g/hax	30 dias
Pereira	Afídeos Lagartas mineiras	Ar livre	I	25 g/hL- 250 g/ha	30 dias
Videira	Cicadelídeos - Cicadelídeo-flavescência Mosca-mediterrâneo - Cochonilha-algodão	Ar livre	I	250-375 g/ha	14
Pessegueiro (inclui nectarina)	Afídeos	Ar livre	I	25 g/hL - 250 g/ha	30 dias
Ameixeira	Afídeos	Ar livre	2	25 g/hL- 250 g/ha	14 dias
Cerejeira	Afídeos	Ar livre	I	25 g/hL- 250 g/ha	14 dias
Oliveira	Mosca-da-azeitona- Traça-da-oliveira	Ar livre	2 (14)	350 g/ha	28 dias
Citrínos	Afídeos	Ar livre	2 (10)	25 g/hL- 250 g/ha	14 dias
	Mineira-folhas-rebentos	Ar livre	2 (10)	40-50 g/hL - 400-500 g/ha	
Tomateiro	Afídeos	Ar livre	2 (28)	25 g/hL - 250 g/ha	7 dias
		Estufa	2 (28)	25 g/hL - 250 g/ha	14 dias
	Moscas brancas	Ar livre	2 (28)	40-50 g/hL- 500 g/ha	7 dias
Beringela	Afídeos	Ar livre	2 (14)	25 g/hL- 250 g/ha	7 dias
		Estufa	2 (14)	25 g/hL - 250 g/ha	3 dias
	Moscas brancas	Ar livre	2 (14)	25 g/hL -250 g/ha	7 dias
Meloeiro	Afídeos	Ar livre	2 (25)	25 g/hL- 250 g/ha	14 dias
	Moscas brancas	Ar livre	2 (25)	32,5 g/hL -325 g/ha	14 dias
Melancia	Afídeos	Ar livre	2 (25)	25 g/hL -250 g/ha	14 dias
	Moscas brancas	Ar livre	2 (25)	25 g/hL - 250 g/ha	
Abóbora	Moscas brancas	Ar livre	2 (25)	32,5 g/hL -325 g/ha	14 dias
Batateira	Afídeos	Ar livre	2 (10)	25 g/hL -250 g/ha	7 dias
	Escaravelho-da-batateira	Ar livre	2 (10)	15 g/hL - 150 g/ha	
	Epitrix-da-batateira	Ar livre	2 (10)	15-25 g/hL - 150-250 g/ha	
Pimenteiro	Afídeos	Ar livre	2 (28)	25 g/hL - 250 g/ha	7 dias
	Moscas brancas	Ar livre	2 (28)	40 g/hL - 400 g/ha	
Pepino	Afídeos	Estufa	I	25 g/hL - 250 g/ha	10 dias
Ervilheira	Afídeos	Ar livre	2 (14)	250-325 g/ha	14 dias
Faveira	Afídeos	Ar livre	2 (14)	250-325 g/ha	28 dias
Feijoeiro	Afídeos	Ar livre	2 (14)	250-325 g/ha	7 dias
Couve-bróculo Couve-flor	Afídeos	Ar livre	I	325 g/ha	14 dias
Couve-repolho Couve-coração Couve-roxa Couve-lombarda	Afídeos	Afídeos	I	325 g/ha	14 dias
Milho	Broca-do-milho	Ar livre	2 (14)	250-500 g/ha	
Arroz	Afídeos	Ar livre	I	150 g/ha	80 dias
Tabaco	Afídeos	Ar livre	2	235 g/hL- 250 g/ha	
Alcachofra	Afídeos	Ar livre	2 (14)	250-325 g/ha	7 dias
Crisântemo, Gerbera, Roseira	Afídeos	A+E	2 (10)	25 g/hL - 250 g/ha	-
	Moscas brancas	A+E	2 (10)	40-50 g/hL - 500 g/ha	
Eucalipto	Gorgulho	Ar livre	2	200 g/ha	