

Mitacid[®] plus



MITACID[®] PLUS

NOVO ACARICIDA COM O DOBRO DAS VANTAGENS

- Dois modos de acção
- Eficácia contra ovos, larvas, ninfas e adultos
- Ideal para evitar resistências
- Bom efeito de choque
- Eficácia prolongada
- Pouco tóxico para os auxiliares



Growing attitude


SIPCAM
PORTUGAL

CARACTERÍSTICAS

MITACID PLUS® é um novo produto para o controlo de ácaros tetrânquideos fitófagos, que resulta da associação de dois acaricidas específicos - o fenepiroximato e o hexitiazox.

Fenepiroximato + Hexitiazox

A sinergia entre estas duas substâncias activas faz do **MITACID PLUS®** um produto com uma acção ovicida, larvicida e adulticida, altamente eficaz contra as principais espécies de ácaros tetrânquideos que atacam as culturas.

MITACID PLUS® um acaricida completo, actuado sobre todas as fases ou estádios da praga, conseguindo em simultâneo um potente efeito de choque graças à eliminação de larvas e adultos, assim como, uma boa persistência de acção sobre os ovos.

MODOS DE ACÇÃO

As duas substâncias activas que compõem o **MITACID PLUS®** têm modos de acção distintos, pelo que tornam este produto num acaricida de duplo modo de acção:

FENEPIROXIMATO - pertence a um grupo pirazol, e actua na respiração celular como inibidor da cadeia de transporte de electrões no interior das mitocôndrias (METI - Mitochondrial Electron Transport Inhibitor) (IRAC MoA Grupo 21A). Actua por contacto sobre as formas móveis (larvas, ninfas e adultos), que morrem pouco tempo depois de serem tratadas.

HEXITIAZOX - pertence à família tiazolidinona e actua como regulador de crescimento dos ácaros (IRAC MoA grupo 10A). Apresenta uma excelente actividade sobre os ovos, larvas e ninfas de numerosas espécies de ácaros fitófagos, permitindo um controlo duradouro destas pragas. Actua por contacto e ingestão, possuindo uma eficácia prolongada, tendo assim a capacidade de interromper o ciclo reprodutivo dos ácaros fitófagos.


O **MITACID PLUS®** tem um efeito reduzido sobre ácaros predadores (como os fitoseídeos, que recuperam rapidamente as suas populações) e outros auxiliares.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Cultura	Praga	Dose (L/ha)	Época / Condições de aplicação	I.S. (dias)
Macieira	Aranhinho vermelho (<i>Panonychus ulmi</i>)	1,2	Tratar em presença da praga. Desde a floração (50% de flores abertas) até ao início da maturação (BBCH 65-83). Volume de calda: 1200 a 1700 L/ha.	28
Laranjeira, limoeiro, tangerineira (inclui clementina e outros híbridos)	Aranhinho-vermelho dos-citrinos (<i>Panonychus ulmi</i>)	1,2	Tratar em presença da praga. Desde a floração até ao início da maturação (BBCH 65-83). Volume de calda: 1000-2500 L/ha.	14
Videira (uvas de mesa e vinificação)	Aranhinho-amarelo (<i>Tetranychus urticae</i>)	1,2	Tratar em presença da praga. Desde o surgimento da inflorescência até ao início da maturação (BBCH 53-81). Volume de calda: 800-1200 L/ha.	28
Tomateiro, beringela	Aranhinho-amarelo (<i>Tetranychus urticae</i>)	1,2	Tratar em presença da praga. Desde o desenvolvimento das folhas até à colheita (BBCH 14-89). Volume de calda: 500-1000 L/ha.	7

OBSERVAÇÕES: Para evitar o risco de desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou qualquer outro que contenha METI mais de uma vez por ano ou ciclo cultural.

Mitacid[®] plus



CICLO REPRODUTIVO DOS ÁCAROS FITÓFAGOS

Detentor da Autorização



NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH.
Berliner Allee 42 - 40212 Dusseldorf - Alemanha
Tel. +49-211-13066860 - Fax. +49-211-328231

Rua da Logística, N.º1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 400 050. Fax: 263 400 059
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt
www.sipcam.pt

SIPCAM
PORTUGAL