

TOP[®]

**Sequra[®]
Top**



SEQURA TOP[®]

INSETICIDA BIOLÓGICO
EFICAZ, FIÁVEL E CONSISTENTE



- AÇÃO ESPECÍFICA SOBRE LEPIDÓPTEROS
- ISENTO DE INTERVALO DE SEGURANÇA
Pode ser aplicado em qualquer fase de desenvolvimento da cultura
- AUTORIZADO EM MODO DE PRODUÇÃO BIOLÓGICO
- APRESENTA UM BAIXO IMPACTO NA ENTOMOFAUNA BENÉFICA

Growing attitude


SIPCAM
PORTUGAL


Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar. Ter em atenção as frases de advertência e os símbolos constantes no rótulo do produto.

SEQURA® TOP É UM INSETICIDA BIOLÓGICO CONSTITUÍDO POR CRISTAIS DE ENDOTOXINAS E ESPOROS VIÁVEIS DE *BACILLUS THURINGIENSIS*, SUBESPÉCIE *KURSTAKI*, SERÓTIPO 3A, 3B, ESTIRPE HD-1, ESPECÍFICO PARA O CONTROLO DE ESTADOS LARVARES DE ALGUMAS ESPÉCIES DE LEPIDÓPTEROS.

Pertence ao grupo 11 (IRAC) dos disruptores microbianos das membranas intestinais dos insetos.

MODO DE AÇÃO

Após a ingestão, as endotoxinas vão provocar a destruição do trato gastro-intestinal e os esporos vão dar origem a uma infeção generalizada no organismo do hospedeiro. A combinação destas ações conduz à paragem rápida do processo de alimentação e à destruição das larvas.



CULTURA	PRAGA	CONCENTRAÇÃO (DOSE)	INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES
Couve-ornamental, Couve-flor, Couve-brócolo, Couve-de-Bruxelas, Couve-galega, Couve-de-Pequim, Couve-portuguesa, Couve-repolho (ar livre)	lagarta (<i>Pieris</i> sp.)	20 a 30 g/hL (200-300 g/ha)	Máximo 8 aplicações
Tomateiro (ar livre e estufa)	lagarta (<i>Helicoverpa</i> sp.)	25 a 50 g/hL (250-500 g/ha)	
Morangueiro (ar livre e estufa)	lagartas (<i>Helicoverpa</i> spp.) e nóctuas (<i>Agrotis</i> spp.)	25 a 50 g/hL (250-500 g/ha)	
Macieira e Pereira	bichado da fruta (<i>Cydia pomonella</i>)	50 g/hL (500 g/ha)	
Batateira	traça (<i>Phthorimaea operculella</i>)	50 a 75 g/hL (500-750 g/ha)	
Videira	traça-dos-cachos (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>)	50 g/hL Adicionar 1 kg de açúcar/hL. (500 g/ha)	Máximo 2 aplicações
Oliveira	Traça-da-oliveira (<i>Prays oleae</i>)	20 a 30 g/hL (200-300 g/ha)	
Pinheiro-bravo	processionária (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	25 a 50 g/hL (250-500 g/ha)	Máximo 5 aplicações
Sobreiro	Limântria (<i>Lymantria dispar</i>)	25 a 50 g/hL (250-500 g/ha)	-

ÉPOCA DE APLICAÇÃO - Tratar ao aparecimento da praga. Molhar bem toda a vegetação de forma a atingir todos os órgãos a proteger. Utilizar as doses mais elevadas no caso de maior infestação. As aplicações devem ser feitas, de preferência, ao início da manhã ou ao final da tarde. Intervalo mínimo entre aplicações é de 7 dias.

NOVIDADE

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO MENOR:

CULTURA	PRAGA	CONCENTRAÇÃO (DOSE)	INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES
Amora, Mirtilo	Lagarta (<i>Helicoverpa armigera</i>)	50 g/hL (500 g/ha)	Máximo 8 aplicações
Limeira, Limoeiro, Tangerineira (e seus híbridos)	Traça do limoeiro (<i>Prays citri</i>)	25 a 50 g/hL (250-500 g/ha)	-
Pastagens	Lagarta das pastagens (<i>Mythimna unipuncta</i>)	75 a 100 g/hL (750-1000 g/ha)	-

A eficácia e fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

SUMITOMO CHEMICAL EUROPE



SIPCAM
PORTUGAL

Rua da Logística, N.º1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 400 050
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt
www.sipcam.pt

SEQURA® TOP - Pó molhável (WP) com 6,4% (p/p) de *Bacillus thuringiensis* subespécie *kurstaki*, serótipo 3a, 3b, estirpe HD-1; potência 32.000 U.I./mg. Autorização de Venda n.º 3799 concedida pela DGAV