




# TRIKA<sup>®</sup> expert




TRIKA EXPERT<sup>®</sup>

## INSECTICIDA-FERTILIZANTE MICROGRANULADO



- Fluxo regular;
- Sem influência da humidade ou temperatura
- Correta dosagem
- Grânulos homogêneos
- Distribuição perfeita do inseticida



*Growing attitude*



**SIPCAM**  
PORTUGAL



TRIKA<sup>®</sup> expert é formulado com a tecnologia G PLUS, que atua como protetora do inseticida e moduladora da sua libertação. A esta tecnologia junta-se a base organo-mineral (de tecnologia UMO SLOW), obtendo - se a fusão de tecnologia: G PLUS + UMO SLOW.



Rápida e longa duração da atividade inseticida (até 60 dias);

Alta estabilidade da lambda-cialotrina devida à persistência dos grânulos no solo e à sua libertação controlada;

Os grânulos “não se movem”, nem no caso de fortes chuvas nem por regas, pelo que permanecem ativos próximo da semente, onde podem realizar a sua ação inseticida e ajudar à implantação da cultura por ação dos seus nutrientes (efeito starter).

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Composição         | lambda-cialotrina 0,4 %<br>Coformulantes contendo NP (7.35) |
| Tipo de Formulação | Grânulos (GR)                                               |
| Aspeto Físico      | Microgrânulos escuros                                       |
| Densidade          | 0.930 g/cm <sup>3</sup>                                     |



| Cultura                                                             | Doses<br>( Kg/ha) | Época e modo de aplicação                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milho                                                               | 10 - 15           | Localizado na linha de sementeira                                                        |
| Alface e similares (chicória, endívia, rúcula, agrião, espinafre)   | 10 - 15           | Localizado na linha de transplantação ou aplicação direta ao solo durante a plantação    |
| Aboborinha (courgette), Pepino                                      | 10 - 15           | Localizado na linha de transplantação                                                    |
| Batateira                                                           | 10 - 15           | Localizado na linha de sementeira ou distribuído enterrado na linha na altura da amontoa |
| Cenoura                                                             | 10 - 15           | Localizado na linha de sementeira                                                        |
| Couve de cabeça (couve-de-repolho, couve-lombarda, couve coração)   | 10 - 15           | Localizado na linha de transplantação ou aplicação direta ao solo durante a plantação    |
| Couves de inflorescência (couve-brócolo, couve-flor, grelo de nabo) | 10 - 15           | Localizado na linha de transplantação ou aplicação direta ao solo durante a plantação    |
| Abóbora, Melancia e Meloeiro                                        | 10 - 15           | Localizado na linha de transplantação                                                    |
| Tomateiro, Pimenteiro e Beringela                                   | 10 - 15           | Localizado na linha de transplantação                                                    |
| Girassol                                                            | 10 - 15           | Localizado na linha de sementeira                                                        |
| Colza                                                               | 10 - 15           | Localizado na linha de sementeira                                                        |
| Sorgo                                                               | 10 - 15           | Localizado na linha de sementeira                                                        |
| Tabaco                                                              | 10 - 15           | Localizado na linha de sementeira ou transplantação                                      |