

MID

Cyflamid[®]



CYFLAMID[®]

FUNGICIDA ANTI-OÍDIO PARA VIDEIRA E MACIEIRA

- Elevada ação preventiva e boa acção curativa na fase inicial da doença
- Alta proteção de folhas e frutos
- Grande persistência de ação
- Elevada selectividade de culturas

Growing attitude



SIPCAM
PORTUGAL

CYFLAMID® é um fungicida penetrante, com mobilidade translaminar e ação de vapor para o controlo do oídio da videira e macieira à base de uma substância activa nova, a ciflufenamida.

CYFLAMID® apresenta uma elevada actividade preventiva conjugada com uma actividade curativa nas fases iniciais da doença.

Ciflufenamida: é o primeiro fungicida de uma família química nova - fenil-acetamidas.



- Não apresenta resistência cruzada com outros anti-oidios existentes no mercado uma vez que apresenta um modo de ação diferente
- Actua inibindo o crescimento do micélio, na formação dos austórios e na diferenciação dos esporos
- Apresenta elevada eficácia e persistência de ação contra o oídio da videira e da macieira
- Tem um perfil toxicológico e ecotoxicológico favorável
- É perfeitamente selectivo para as culturas

A ciflufenamida tem limites máximos de resíduos harmonizados na UE e obteve uma "Import Tolerance" nos Estados Unidos da América.

ANTI-OÍDIO COM MECANISMO DE AÇÃO ÚNICO


Actividade penetrante/translaminar

CYFLAMID® após ser aplicado, é rapidamente absorvido (cerca de 2 horas) através das ceras de folhas e frutos, com as seguintes vantagens:

- Elevada eficácia independente da temperatura
- Elevada resistência à lavagem
- Alta protecção dos frutos em forte crescimento imediatamente após o vingamento

Ação de Vapor

O **CYFLAMID®** possui uma elevada capacidade para se redistribuir sob a forma de vapor em torno dos pontos de aplicação, protegendo, desta forma, também a área adjacente a esta, dentro de um raio de 4-5 cm. A ação de vapor é particularmente importante para garantir uma óptima protecção de toda a planta o que muitas vezes não é alcançada de forma adequada pela maioria dos tratamentos.



A ação de vapor do **CYFLAMID®** nas folhas de pepino:

- Na folha da direita foram colocados dois pedaços de alumínio, nos quais foram depositadas gotas contendo **CYFLAMID®** antes da inoculação com oídio.
- A porção da folha saudável demonstra a capacidade do produto em se redistribuir sob a forma de vapor e proteger áreas adjacentes aquelas onde a gota foi aplicada.



Utilizações, doses, época e condições de aplicação

Videira	Oídio (<i>Erysiphe necator</i>)
Dose : 500 mL/ha (50 mL/hL)	Iniciar as aplicações após a floração. Os tratamentos devem ser preventivos. A partir do "bago de chumbo" as aplicações devem dirigir-se aos cachos. Efectuar no máximo 2 aplicações. Intervalo de segurança - 21 dias.
Macieira	Oídio (<i>Podosphaera leucotricha</i>)
Dose : 500 mL/ha (50 mL/hL)	Tratar do abrolhamento até ao fim do crescimento dos rebentos. Os tratamentos devem ser preventivos. Efectuar no máximo 2 aplicações. Intervalo de segurança - 14 dias.

Composição

51,3 g/L de ciflufenamida

Formulação

Emulsão de óleo em água

Autorização

Autorização de venda nº 0327 concedida pela DGAV

Embalagens

50 mL; 1L

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.
Ter em atenção as frases de advertência e os símbolos constantes no rótulo do produto.

Rua da Logística, N.º 1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 400 050 . Fax: 263 400 059
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt
www.sipcam.pt

