




Lieto®



LIETO®

A FERRAMENTA MAIS FIÁVEL



- Forte protecção em todas as condições
- Máxima flexibilidade de uso para resultados consistentes
- Formulação moderna
- A solução alternativa, eficácia duradoura

Growing attitude



SIPCAM
PORTUGAL

O novo antimídio que protege os cachos de uvas.

O **LIETO®** é um fungicida penetrante com actividade preventiva e curativa. Contém cimoxanil (grupo acetamida-oxima) que inibe a formação das paredes celulares, mecanismo(s) de acção desconhecido e zoxamida (grupo benzamida) que inibe a mitose e a divisão celular, actuando na β -tubulina.

FORTE PROTECÇÃO em todas as condições

LIETO®, devido à combinação original de cimoxanil e zoxamida protege os cachos e a vegetação por dentro e por fora. O cimoxanil penetra rapidamente nos tecidos.

Zoxamida cobre todas as superfícies das plantas e é resistente à lavagem por água. É uma ferramenta estratégica para a gestão das resistências.




MÁXIMA FLEXIBILIDADE para resultados consistentes

LIETO® sempre garante o controlo do míldio.

Utilizado preventivamente com intervalos de 7-10 dias, previne a infecção.

Em situações difíceis de intervenção, controla a infecção no início do período de incubação.



FORMULAÇÃO MODERNA

LIETO® com a sua formulação em grânulos, dispersa-se rapidamente na água sem produzir espuma. Perfeitamente selectivo nas culturas autorizadas.

Não mancha os cachos.



Aspecto da Formulação



Posicionamento em videira

Devido às suas características, LIETO® pode ser usado desde à época de botões florais separados até o fecho dos cachos.

Folhas livres	Cachos visíveis	Cachos separados	Botões florais separados	Floração	Alimpa	Bago de Ervilha	Pré-fecho dos cachos	Fecho dos cachos	Pintor

CARACTERÍSTICAS

Alta flexibilidade de aplicação, mesmo em condições difíceis de intervenção

Acção penetrante e alta resistência à lavagem por água

Eficácia duradoura devido à sinergia de dois mecanismos de acção únicos

Bom perfil ecotoxicológico e de tolerância de importação nos principais países do mundo

BENEFÍCIOS

Garante resultados consistentes

Máxima segurança da protecção

Solução alternativa

Cumprir as exigências em termos de protocolos de produção e exportação do vinho



Lieto

Composição

cimoxanil 33% (p/p) - zoxamida 33% (p/p)

Formulação

Grânulos dispersíveis em água (WG)

Autorização

Autorização de venda nº 0684 concedida pela DGA

Embalagens

40 g, 1 Kg, 5 Kg



Concentrações/doses e intervalos de segurança

Cultura	Doença	Doses	Intervalo de Segurança
Videira	Míldio (<i>Plasmopara viticola</i>)	350 - 400 g/ha (35-40 g/hL)	28 dias
Batateira	Míldio (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 - 450 g/ha (40-45 g/hL)	7 dias
Tomateiro	Míldio (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 - 450 g/ha (40-45 g/hL)	3 dias

Época de aplicação

Videira: Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na falta deste tratar a partir das 7 folhas (BBCH 17), em condições favoráveis à doença. A persistência biológica será de 7 a 10 dias ou 10 a 12 dias, consoante a pressão da doença e desenvolvimento vegetativo.

Batateira: Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na falta deste, tratar durante o período de crescimento activo da cultura quando o tempo decorra húmido e chuvoso (desde BBCH 21). A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias.

Tomateiro: Tratar em local definitivo, após a crise de transplantação, em condições favoráveis à doença (desde BBCH 13/14). A persistência biológica do produto é de 7 a 10 dias.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Ter em atenção as frases de advertência e os símbolos constantes no rótulo do produto.

Detentor da autorização:



OXON ITALIA, S.p.A.
Via Sempione, 195
20016 Pero (Mi) - Itália
Tel. +3902353781
Fax +39023390275

Distribuído por:

SIPCAM PORTUGAL
Rua da Logística, 1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Telef.: 263 400 050
Fax.: 263 400 059
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt

Rua da Logística, Nº1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 400 050 . Fax: 263 400 059
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt
www.sipcam.pt

SIPCAM
PORTUGAL