

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 2,85% (p/p) de cimoxanil, 30% (p/p) de fosetil-alumínio e 16% de cobre (sobre a forma de oxicloreto)

Fungicida anti-míldio para videira, batateira e tomateiro.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

CARACTERÍSTICAS

Fungicida penetrante, sistémico e de contacto com atividade preventiva e curativa. Contém cimoxanil (grupo acetamida-oxima) que inibe a formação das paredes celulares, mecanismos de ação desconhecido; foseetil-alumínio (fosfanato) que ativa as defesas das plantas interferindo no mecanismo fosfatado e o cobre (inorgânico) que inibe vários processos metabólicos atuando em diversas enzimas.

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Videira – Míldio (*Plasmopara vitícola*): 4 – 4,5 kg/ha (400 – 450 g/hL).

Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na falta deste, iniciar as aplicações imediatamente após o aparecimento dos primeiros focos na região ou na sua ausência, realizar o primeiro tratamento no estado de 7-8 folhas. A persistência biológica é de 10 - 12 dias. Efetuar no máximo 4 aplicações por ano.

Batateira – Míldio (*Phytophthora infestans* e **Alternariose** (*Alternaria solani*): 4 – 4,5 kg/ha (400 – 450 g/hL).

Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na falta deste, as aplicações devem ser feitas durante o período de crescimento ativo da cultura, quando o tempo decorra húmido e chuvoso e a temperatura seja favorável às infeções. A persistência biológica é de 10 - 12 dias. Efetuar no máximo 4 aplicações por ano.

Tomateiro – Míldio (*Phytophthora infestans* e **Alternariose** (*Alternaria solani*): 4 – 4,5 kg/ha (400 – 450 g/hL).

Tratar quando em condições de humidade elevada. A persistência biológica é de 10 - 12 dias. Efetuar no máximo 4 aplicações por ano.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não misturar com óleos ou com formulações oleosas e adubos foliares azotados. No caso de pretender misturar com adubos foliares, realizar um ensaio preliminar sobre uma pequena superfície para testar a compatibilidade. Em videira não aplicar durante a floração e em castas de folhagem sensível (ex. Moscatel) efetuar no máximo 3 aplicações por ano.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações/doses indicadas. Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda com a concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



Atenção

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.



Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.
SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.
Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de voltar a usar.

Recolher o produto derramado.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

Para protecção dos organismos aquáticos, não aplicar em terrenos adjacentes a águas de superfície.

Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado.

Intervalo de segurança – 20 dias em batateira e tomateiro; 40 dias em videira.

A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito.



NOTA – Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE
UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS – LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Detentor da autorização:

OXON ITALIA S.p.A

Via Sempione, 195 20016 Pero (Mi) Itália
Tel. 003902353781 – Fax. 0039023390275

Autorização de venda n.º 0679 concedida pela DGAV

Distribuidor:

Sipcam Portugal – Agroquímica e Biotecnologia, Lda

Rua da Logística, 1 2050 Vila Nova da Rainha

Tlf.: 263 400 050 – Fax: 263 400 059

E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt