

®

MIZUKI



MIZUKI®



MIZUKI®

A EVOLUÇÃO NA DESSECAÇÃO EM TODAS AS BATATAS



NOVIDADE

- **NOVO HERBICIDA DE AMPLO ESPETRO**
sobre infestantes de folha larga
- **DESSECANTE DE CONTACTO**
sem translocação dentro da planta
- **DESSECA POR COMPLETO**
as folhas e os caules
- **FACILITA A COLHEITA**

Growing attitude



SIPCAM
PORTUGAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

MIZUKI® é um herbicida à base de **piraflofena-etilo** que atua por contato, pertencente ao grupo químico dos Fenilpirazóis (**Grupo HRAC 14**).


MIZUKI® é um inovador dessecante de contato para a cultura da batateira, que é absorvido rapidamente pelas folhas e caules, sem translocação, provocando uma rápida necrose ou dessecação dos mesmos.

MIZUKI® Elimina eficazmente um grande número de infestantes dicotiledóneas em olival, vinha e pomares, incluindo algumas das mais resistentes e de difícil controlo, assim como controla lançamentos basais/ramos ladrões nestas culturas.

ESPETRO DE AÇÃO

MIZUKI® inibe a enzima **PPO** ou **PROTOX**, precursora da síntese da clorofila. Esta atividade biológica provoca uma acumulação de radicais oxidantes altamente reativos dentro da célula vegetal. Isto resulta numa desintegração da clorofila e dos carotenos das membranas celulares, e por fim de toda a célula.


BATATA	Dessecante Dose recomendada 2 L/ha	Dessecação de caules e folhas antes da colheita, rápida e eficaz
	Herbicida Dose recomendada 1 L/ha	Produto não sistémico. Sem translocação da substância ativa para os tubérculos Ideal para aplicações integradas com operações mecânicas de trituração/corte



ÉPOCAS E CONDIÇÕES

Dessecante: Para facilitar a colheita, aplicar o produto em senescência das plantas (quando as folhas inferiores começam a amarelecer) e os tubérculos tenham atingido o desenvolvimento conveniente. Para cultivares particularmente vigorosas ou aplicações antes da senescência, pode ser preciso repetir o tratamento da mesma forma, depois de 5 dias.

Herbicida: Aplicar sobre as infestantes em pré-emergência ou ao início da pós-emergência da cultura (máximo 5% das plantas visíveis).



NICHINO EUROPE CO., LTD.

Rua da Logística, N.º 1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 400 050 . Fax: 263 400 059
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt
www.sipcam.pt

SIPCAM
PORTUGAL



PIRAFLUFENA-ETILO

=
INIBIDOR DA ENZIMA PPO
(precursor da enzima da clorofila)

