

Suspensão de cápsulas (CS) com 365 g/L ou 31,7% (p/p) de pendimetalina

Herbicida

CARACTERÍSTICAS



MOST MICRO é um herbicida contendo pendimetalina (dinitroanilinas - K1), apresentado na forma de suspensão de cápsulas com a tecnologia Microplus desenvolvida nos laboratórios da Sipcam.

É um herbicida residual e de contacto, com absorção radicular e pelas gemas em desenvolvimento. Inibe a divisão celular ao nível da mitose.

Está indicado para o controlo de infestantes anuais gramíneas e dicotiledóneas em numerosas culturas hortícolas, industriais, fruteiras, vinha e relvados.


A formulação de alta qualidade com um baixo conteúdo de solventes garante excelente miscibilidade com outros herbicidas e fácil limpeza do equipamento

Suspensão aquosa de microcápsulas, em cada microcápsula contém a substância activa no seu interior.



As microcápsulas são constituídas por um núcleo central com a substância activa, rodeado por um revestimento de membrana polimérica.

Após a aplicação de MOST MICRO, a substância activa é libertada desde o interior das microcápsulas de uma forma homogênea.



UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

MOST MICRO destina-se a ser utilizado nas seguintes condições:

Alface: Aplicar 1,5-2 L/ha em pré-transplantação;

Alho: Aplicar 1,7-2,5 L/ha em pré-emergência ou pós-emergência precoce (2 folhas);

Arroz (apenas em sementeira a seco e enterrada): Aplicar 2-3 L/ha em pré-emergência;

Batateira, Ervilheira, Faveira, Trigo, Cevada, Centeio: Aplicar 1,7-3 L/ha em pré-emergência;

Cebola: Aplicar 1-2,5 L/ha em pré-emergência ou pós-transplantação;

Cenoura: Aplicar 1,25-3 L/ha em pré-emergência;

Couves de repolho, couve-flor, brócolo: Aplicar 2-3 L/ha em pré-transplantação;

Espargo (apenas em espargueiras já implantadas): Aplicar 2,5-3 L/ha em pré-rebentação;

Feijoeiro: Aplicar 1,7-2,5 L/ha em pré-emergência;

Milho e Girassol: Aplicar 2-3 L/ha em pré-emergência;

Tomateiro, Beringela e Pimenteiro: Aplicar 1,25-2,2 L/ha em pré-transplantação;

Soja: Aplicar 2-2,5 L/ha em pré-emergência;

Macieira, Pereira, Pessegueiro, Damasqueiro, Amendoeira e Videira: Aplicar 2,5-3 L/ha no repouso vegetativo;

Laranjeira, limoeiro, tangerineira (clementina e híbridos): Aplicar 2,5-3 L/ha desde a colheita até ao vingamento dos frutos. Não atingir ramos e folhas;

Ornamentais (incluindo em Viveiro): Aplicar 2,5-3 L/ha antes da rebentação;

Marachas dos arrozais: Aplicar 2,5-3 L/ha em pré-sementeira e pré-emergência da cultura.

Relvados: o produto é selectivo para relvados bem implantados, a partir do 2º ano, constituídos por *Lolium perenne*, *Poa pratensis*, *Festuca spp.* e *Agrostis stolonifera* (esta última mantida a uma altura de corte superior a 1,5 cm).

Aplicar 2,5-3 L/ha (a dose mais elevada em terrenos ricos em matéria orgânica) numa única aplicação ou 1,5 L/ha em duas aplicações separadas por 45-60 dias. Intervalo de reentrada: 24 horas. Impedir o acesso de animais domésticos às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

Em todas as culturas só deve ser feito um tratamento por época. O produto deve ser aplicado antes da emergência das infestantes.

Fazer uma boa preparação da cama de sementeira de modo a aplicar num terreno perfeitamente nivelado, sem torrões, procedendo igualmente a uma rega se não ocorrer uma chuva dentro de 7-10 dias após o tratamento.

Realizar a sementeira de maneira uniforme e regular a uma profundidade de, pelo menos, 3 cm para cenoura, cebola e de 4 cm para as outras culturas, tendo o cuidado de evitar que algumas sementes fiquem a descoberto.

No caso de culturas transplantadas (couves, beringela, pimenteiro, tomateiro) efectuar o tratamento no terreno bem preparado e efectuando de imediato uma ligeira rega e esperando 7-8 dias antes de realizar a transplantação, depois da qual deve ser feita uma outra rega ligeira: em nenhum caso se deve fazer amontoa antes de passarem pelo menos 30 dias do tratamento.

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Gramíneas: azevém (*Lolium multiflorum*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), milhãs (*Setaria spp.*), poa (*Poa spp.*), *Panicum dichotomiflorum*, rabo-de-raposa (*Alopecurus myosuroides*), sorgo-bravo (*Sorghum halepense*).

Dicotiledóneas: amor-de-hortelão (*Galium aparine*), beldroega (*Portulaca oleracea*), bolsa-de-pastor (*Capsella bursa-pastoris*), catassol (*Chenopodium album*), coriola-bastarda (*Fallopia convolvulus*), erva-moira (*Solanum nigrum*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), esparguta (*Spergula arvensis*), falsa-verónica (*Linaria spuria*), lâmio-roxo (*Lamium purpureum*), margaça (*Matricaria chamomilla*), moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), morrião (*Anagallis arvensis*), morugem-branca (*Stellaria media*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), serralhas (*Sonchus sp.*), tasneirinha (*Senecio vulgaris*), urtiga-menor (*Urtica urens*), urtiga-morta (*Mercurialis annua*), veronica-da-Pérsia (*Veronica persica*).

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Durante a aplicação não atingir as culturas e os terrenos vizinhos.

Não instalar qualquer outra cultura antes de decorridos pelo menos três meses após a aplicação deste produto e efetuar uma lavoura antes da sementeira ou plantação. Não utilizar em estufa.

Para todas as culturas usar as doses mais baixas em solos leves, permeáveis e pedregosos.

A aplicação repetida de herbicidas com o mesmo modo de acção, pode provocar o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas infestantes indicadas no rótulo como susceptíveis. Recomenda-se proceder, sempre que possível, à rotação de culturas e à alternância com herbicidas de diferente modo de acção.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

No recipiente onde se prepara a calda, deitar metade da água necessária. Agitar bem a embalagem até o produto ficar homogéneo. Deitar a quantidade de produto a utilizar e completar o volume de água, agitando sempre.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por hectare, de acordo com o débito do pulverizador (L/m), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição da calda. A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e/ou usar bicos anti-arrastamento.

Volume de calda a utilizar: 200 a 400 L/ha.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS



Atenção

Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.



Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes. Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico. Lavar a roupa contaminada antes de voltar a usar.

Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície. Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.

Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma faixa com vegetação de 10 metros em relação às águas de superfície.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de informação Antiveneno. Telef: 800 250 250.

A embalagem deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.



NOTA – Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL
PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS – LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Detentor da autorização:

Sipcam Portugal – Agroquímica e Biotecnologia, Lda

Rua da Logística, 1 2050-542 Vila Nova da Rainha

Tlf.: 263 400 050 – Fax: 263 400 059

E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt

Autorização de venda n.º 0979 concedida pela DGAV