



REXXAR®

A TECNOLOGIA **NECESSÁRIA**



- **EFICAZ** no controlo das principais infestantes gramíneas e dicotiledóneas
- **TECNOLOGIA SIPCAM MICROPLUS®:**
Ação herbicida no momento necessário
- **FLEXÍVEL**
Aplicação desde o outono à primavera
- **BOA PERSISTÊNCIA** no solo, ideal contra infestantes com emergência escalonada
- **MISCÍVEL** com outros herbicidas


Growing attitude



Rexxar®

O que é?

Formulação inovadora e patenteada
MICROPLUS TECHNOLOGY desenvolvida pela
SIPCAM OXON



Membrana polimérica

CLOMAZONA

**MÁXIMA EFICIÊNCIA HERBICIDA E
SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO**

Espectro de acção

INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Gramíneas: milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), milhete (*Panicum dichotomiflorum*), setarias (*Setaria spp.*), cabelo-de-cão (*Poa annua*).

Dicotiledóneas: malvão (*Abutilon theophrasti*), catassol (*Chenopodium album*), erva-moira (*Solanum nigrum*), beldroega (*Portulaca oleracea*), erva-vaqueira (*Calendula arvensis*), lâmio (*Lamium amplexicaule*), mostarda-branca (*Sinapis alba*), morugem-branca (*Stellaria media*).

Onde se aplica?

CULTURA	DOSES	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Videira (uvas de mesa e vinificação)	0,4—0,5 L/ha	Aplicar durante o repouso vegetativo, no outono (BBCH 90-99) ou no inverno/primavera (BBCH 00-07)
Macieira, pereira, marmeleiro, nespereira, nespereira-da-europa		
Pessegueiro (inclui nectarina), damasqueiro, ameixeira, cerejeira e ginjeira		
Amendoeira, aveleira, castanheiro, noqueira		
Actínídea (Kiwi)	0,4—0,5 L/ha	Aplicar durante o repouso vegetativo, no inverno/primavera (BBCH 00-07)
Oliveira		
Laranjeira, limoeiro, lima, tangerineira (inclui clementina e híbridos), toranjeira		

Aplicar em pulverização dirigida ao solo, na linha da cultura, ocupando no máximo 30% do terreno, utilizando barras com campânulas e bicos anti-deriva. Aplicar sempre antes da germinação das infestantes que se pretende controlar. Usar a dose mais baixa em solos leves, permeáveis e pedregosos. Máximo de um tratamento por época.

Como atua?

Herbicida **residual** e **sistémico** com absorção radicular e translocação por via sistémica no xilema em sentido acropétalo.

A **clomazona** pertence à família química das isoxazolidinonas (grupo HRAC 13), **inibe a biossíntese da clorofila e carotenóides, através da interferência da atividade da DXP** (Deoxy-D-Xyulose Phosphate Synthase).



Rexxar® Suspensão de cápsulas (CS) com 360 g/L ou 30,9% (p/p) de clomazona. Autorização de Venda n.º 2300 concedida pela DGAV

Rua da Logística, N.º1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 400 050
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt
www.sipcam.pt

SIPCAM
PORTUGAL