

REDCAL

Redcal



REDCAL

BIOATIVO, EFICAZ E FIÁVEL GRANDES RESULTADOS NOS FRUTOS

- **BIOATIVO**

Garante a máxima absorção do cálcio mesmo nas condições ambientais mais desfavoráveis

- **EFICAZ**

Aplicado antes da floração e logo após a mesma, previne e reduz acarência de cálcio

- **FIÁVEL**

Compatível com fitofármacos e produtos nutricionais e seletivo para a cultura



SIPCAM
PORTUGAL

Redcal

incrementa a transpiração das plantas nas fases fisiológicas em que as plantas absorvem e enviam o cálcio para os frutos.


A aplicação do Redcal deve ser feita no momento de máxima absorção do cálcio permitindo à cultura aumentar o teor do Cálcio nos tecidos com rápida divisão celular.

Composição:

Óxido de cálcio (CaO), solúvel em água 5%
Manganês (Mn): 1.5 %
Zinco (Zn): 0,5 %
pH: 4,25 ± 0,5
Condutividade (solução a 10% a 25°C): 30 mS/cm
Gravidade específica: 1.410 kg/L

Absorção do cálcio

Resultados da Investigação da Sipcarn Itália



Resultados do Redcal

O Redcal graças a sua formulação especial, Bioestimulante e Nutricional demonstrou:

Ação Qualitativa e Quantitativa

- Incremento do cálcio absorvido nas folhas e nos frutos
- Aumento da matéria seca
- Melhoria da cor dos frutos
- Redução do rachamento fisiológico

Ação Fisiológica

- Aumento da Fotossíntese Total
- Incremento da condutividade dos estomas
- Maior tolerância ao stress hídrico

Cultura	Dose L/ha	Época	Nº aplicações	Intervalo
FOLIAR				
Pomóideas e prunóideas	3-5	Da pré-floração ao crescimento dos frutos	3-4	7 - 10 dias
Macieira	4-5	Da pré-floração ao crescimento dos frutos	4-5	7 - 10 dias
Cerejeira	4-5	Da pré-floração ao crescimento dos frutos	4-5	7 - 10 dias
Actinidia (kiwi)	4-6	Da pré-floração ao crescimento dos frutos	3-5	7 - 10 dias
Videira (uva de vinho)	3-4	Da pré-floração ao início do fecho do cacho	3-5	7 - 10 dias
Videira (uva de mesa)	4-6	Da pré-floração ao início do fecho do cacho	3-5	7 - 10 dias
Tomateiro	4-5	Da segunda fase de floração	4-5	7 - 10 dias
Morangueiro	4-5	Floração	4-5	7 - 10 dias
Oliveira e Citrinos	3-4	Da floração ao crescimento dos frutos	2-3	7 - 10 dias
Aveleira	4-6	Da floração (Fêmea) ao aumento dos frutos	3-4	7 - 10 dias
Frutos vermelhos	3-5	Da floração ao crescimento dos frutos	3-5	7 - 10 dias
Hortícolas de folha	0,7-1,5	Pós-transplante	2-3	7 - 10 dias
Hortícolas em estufas	3-4	Da pré-floração ao crescimento dos frutos	3-5	7 - 10 dias
Relvados, plantas ornamentais	1-2	Durante o ciclo vegetativo	4-5	14 dias
Todas as culturas	3-5	Em caso de deficiência nutricional específica	3-5	5 - 7 dias
Redução das fisiopatias relacionadas com o cálcio	4	Do crescimento dos frutos à colheita	3-5	10 dias
RADICULAR (REGA)				
Todas as culturas	4-6	Intervenções repetidas Da floração ao crescimento dos frutos	2-3	10 dias
Redução das fisiopatias relacionadas com o cálcio	5	Do crescimento dos frutos à colheita	4-5	10 - 14 dias

Utilizar somente no caso de necessidade reconhecida. Não ultrapassar as doses adequadas.

NOTA: A utilizar apenas para as utilizações e nas condições indicadas no presente rótulo. O utilizador do produto é responsável por quaisquer danos resultantes do uso indevido da preparação. O cumprimento de todas as indicações contidas neste rótulo é uma condição essencial para garantir a eficácia do tratamento e evitar danos às plantas, pessoas e animais. Para evitar riscos para os seres humanos e para o ambiente, siga as instruções de utilização. **ADVERTÊNCIAS DE PERIGO** - H302-Nocivo por ingestão. H318-Provoca lesões oculares graves. H412-Nocivo para organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH208- Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona. Pode produzir uma reação alérgica. Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV), telef: 800 250 250. Siga sempre as informações constantes do rótulo do produto.



PERIGO



SIPCARN
PORTUGAL