

Helitox Pro®



HELITOX PRO®

MAIOR E MAIS RÁPIDO CONTROLO DE CARACÓIS
E LESMAS PARA UM **ALTO RENDIMENTO**



- Moluscicida peletizado em forma de isco pronto a usar
- Atua por contacto e ingestão
- Maior eficácia com menor dose
- Altamente resistente à humidade
- Efeito de longa duração
- Com amargante e repelente para os animais de estimação


Growing attitude



SIPCAM
PORTUGAL

Características principais

O **HELITOX PRO®** é um moluscicida peletizado em forma de isco pronto a usar, com 30 g/kg ou 3% (p/p) de metaldeído pertencente ao grupo químico dos aldeídos. Induz a segregação de grandes quantidades de muco, sendo as células que produzem muco irremediavelmente destruídas, conduzindo à desidratação e morte. Actua por contacto e ingestão. Após a ingestão, as lesmas ficam imobilizadas. A morte resulta da destruição do tecido mucoso, assim como resultado da perda de água.



Helitox Pro®



Padrão

Porquê usar HELITOX PRO® ?

- Actua muito rapidamente: efeito imediato, 30 % mais rápido do que com grânulos convencionais.
- Mais apetecível para caracóis e lesmas.
- Mais resistente à humidade.
- As lesmas passam quase o dobro do tempo a comer grânulos de **HELITOX PRO®**: consomem uma dose fatal de metaldeído mais rapidamente.
- O tamanho e uniformidade dos grânulos permite um espalhamento mais homogêneo e um maior número de grânulos numa determinada área.
- Funciona em condições de frio e humidade.
- Funciona com todas as espécies de caracóis e lesmas.

Utilizações e Condições de aplicação

O produto pode ser aplicado de modo uniforme, diretamente no solo, com recurso a um distribuidor de grânulos ou de adubo. No caso de se pretender aplicar em áreas pequenas, a distribuição dos grânulos pode ser feita manualmente. Calibrar previamente o equipamento a utilizar na aplicação do produto. O enchimento do equipamento, assim como a sua limpeza devem ser efetuados em pleno campo e nunca em quintais ou jardins.

Cultura	Doses e utilizações	Número de aplicações
Batateira	7 kg/ha. Distribuir os grânulos diretamente no solo, até a maturação do tubérculo quando este atingiu cerca de metade do tamanho final.	Máximo de 3 aplicações, com intervalos mínimos de 14 dias.
Beterraba	7 kg/ha. Distribuir os grânulos diretamente no solo, até as 9 folhas expandidas.	Máximo de 3 aplicações, com intervalos mínimos de 14 dias.
Aveia, centeio, cevada, trigo e tritcale.	7 kg/ha. Distribuir os grânulos diretamente no solo, até ao fim do afilhamento.	Máximo de 3 aplicações, com intervalos mínimos de 14 dias.
Colza, linhaça, sementes de mostarda e sementes de papoila.	7 kg/ha. Distribuir os grânulos diretamente no solo, até ao fim do desenvolvimento dos rebentos laterais, sendo visíveis 9 ou mais rebentos laterais.	Máximo de 3 aplicações, com intervalos mínimos de 14 dias.

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar. Ter em atenção as frases de advertência e os símbolos constantes no rótulo do produto.

Autorização de venda n.º 0851 concedida pela DGAV

Detentor da autorização:

Lonza
Lonza Cologne GmbH
Nattenmannallee 1,
50829 Colônia, Alemanha

meta
The Green Standard

Marcas registradas por: Lonza Ltd.



SIPCAM
PORTUGAL

Rua da Logística, N.º1
2050-542 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 400 050 . Fax: 263 400 059
E-mail: sipcamportugal@sipcam.pt
www.sipcam.pt