

®

NA

Cortina®



CORTINA®

A NOVA REFERÊNCIA



- **EFICÁCIA SUPERIOR**
- **FORMULAÇÃO ÚNICA**
- **ELEVADA SISTEMIA**
- **EXCELENTE SINERGIA**

Growing attitude


SIPCAM
PORTUGAL

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS




Cortina® é um novo fungicida à base da substância ativa protioconazol, com elevada atividade sistémica e que utiliza uma formulação única para oferecer o melhor controlo da mancha-ocre da amendoeira.

O protioconazol tem como modo de ação a inibição da biossíntese dos esteróis das membranas celulares do fungo (**DMI**) (grupo 3 FRAC), sendo a única substância ativa pertencente ao grupo químico *Triazolinione*.

FORMULAÇÃO

PROTIOCONAZOL



Alta teor de substância ativa

Não está dependente da solubilidade máxima no solvente

Sem fitotoxicidade

Baixo impacto dos coformulantes na toxicidade do produto final

Alta mixibilidade

Alta compatibilidade em mistura com outros produtos



DOSE E MODO DE APLICAÇÃO

CULTURA	DOENÇAS	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	DOSE
Cevada	FERRUGEM (<i>Puccinia hordei</i>)	Iniciar os tratamentos preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas das doenças de modo a manter sãs as duas folhas superiores. Em anos muito favoráveis ao desenvolvimento das doenças realizar outro tratamento, entre o início do encanamento e o fim do espigamento (BBCH 29-69). Na fusariose, aplicar preventivamente desde o início até ao fim da floração. A persistência de ação é de 14 a 21 dias. Realizar no máximo 1 aplicação, por campanha, no conjunto das doenças.	400-500 mL/ha
	HELMINTOSPORIOSE (<i>Pyrenophora teres</i>)		
	RINCOSPORIOSE (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		
Trigo mole, trigo-duro, triticale, centeio	FERRUGEM (<i>Puccinia sp.</i>)	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 39-49). A persistência de ação é de 14 dias. Realizar no máximo 2 aplicações, por campanha, no conjunto das doenças.	300-400 mL/ha
	OÍDIO (<i>Blumeria graminis</i>)		
	SEPTORIOSE (<i>Septoria sp.</i>)		
	FUSARIOSE (<i>Fusarium sp.</i>)		
Beterraba sacarina	CERCOSPORIOSE (<i>Cercospora beticola</i>)	Aplicar preventivamente em pós-floração (BBCH >69). Realizar no máximo 1 aplicação, por campanha.	30-40 mL/hL (max. 400 mL/ha)
	OÍDIO (<i>Erysiphe betae</i>)		
Amendoeira	MANCHA-OCRE (<i>Polystigma ochraceum</i>)		

Intervalo de Segurança: 3 dias em amendoeira; 28 dias em beterraba sacarina; 35 dias em centeio, cevada, trigo-mole, trigo-duro e triticale.

Volume de calda: 500-1000 L/ha em amendoeira e 200-600 L/ha nas restantes culturas.

- ✓ **Formulação única**
- ✓ **Alto teor de substância activa**
- ✓ **Seletivo e eficaz**