

®

E
ZThe logo for Frutene, featuring a stylized blue and white graphic element to the left of the word "Frutene" in a bold, black, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

FRUTENE®

O "OUTSIDER"

EM POMÓIDEAS, PRUNÓIDEAS E OLIVAL

- **AUTORIZADO EM DIVERSAS CULTURAS**
- **EFICAZ** num amplo espectro de doenças
- Efeito **PREVENTIVO E CURATIVO**
- **MODO DE AÇÃO ÚNICO**
- Movimento **TRANSLAMINAR**
RESISTENTE à lavagem

Growing attitudeThe SIPCAM logo, featuring a stylized green tree icon above the text "SIPCAM" in a bold, black, sans-serif font, with "PORTUGAL" in a smaller font below it.

SIPCAM
PORTUGAL



O QUE É?

Frutene® é um fungicida à base de dodina, pertencendo ao grupo químico das guanidinas, Código FRAC - U 12.

COMO ATUA?

Frutene® possui atividade preventiva, assim como curativa, quando aplicado no início da infeção (18 a 24 horas após a contaminação). Interfere com as membranas celulares conduzindo ao seu rompimento e à morte das células do fungo. Não é sistémico mas penetra na cutícula, atingindo o micélio subcuticular.

CARATERÍSTICAS:

**AUTORIZADO PARA
DIVERSAS CULTURAS**

**EFICAZ NUM AMPLO
ESPECTRO DE DOENÇAS**

**EFEITO
PREVENTIVO E CURATIVO**

MODO DE AÇÃO ÚNICO

MOVIMENTO TRANSLAMINAR

RESISTENTE À LAVAGEM



UTILIZAÇÕES, DOSE, ÉPOCAS

CULTURA	DOENÇAS	DOSE (MIN-MÁX)	ÉPOCA DE APLICAÇÃO	I. DE SEG. (DIAS)
Amendoeira	Mancha-ocre	1,18 - 1,32 L/ha	Realizar um tratamento preventivamente desde o vingamento dos frutos até estes terem metade do tamanho final (BBCH 71-75).	-
	Lepra	1,18 - 1,32 L/ha	Realizar o tratamento preventivamente, do entumescimento dos gomos ao início da floração (BBCH 00-60) OU um tratamento de outono, após 50% das folhas terem caído (BBCH 95)	
Oliveira	Olho-de-pavão	1,32 - 1,76 L/ha	Realizar um tratamento na Primavera (BBCH 11-55) OU um tratamento no Outono-Inverno (até BBCH 89).	22
	Gafa	1,32 - 1,76 L/ha	Realizar um tratamento no Outono-Inverno (até BBCH 89)	
Macieira	Pedrado	1,32 L/ha	Realizar um tratamento desde o aparecimento da ponta verde das folhas até 60 dias antes da colheita quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento das doenças.	60
Marmeleiro				
Nespereira				
Nespereira-da-europa				
Pereira	Septoriose	1,32 L/ha		
	Estenfiliose			
	Pedrado			
Cerejeira	Moniliose	1,76 L/ha	Realizar o tratamento preventivamente, do entumescimento dos gomos ao início da floração (BBCH 00-60) OU um tratamento de outono, após 50% das folhas terem caído (BBCH 95)	22
	Lepra			
Pessegueiro (inclui nectarina)	Moniliose	1,76 L/ha		75
	Lepra			

OBSERVAÇÕES:

O produto confere proteção durante 1 a 2 semanas.

Realizar no máximo 1 tratamento com este produto.

O produto não deve ser aplicado durante o período de floração (BBCH 60-69) de forma a evitar resíduos no mel.

Para evitar o desenvolvimento de resistência, realizar no máximo 2 tratamentos no conjunto dos produtos que contêm dodina.