




Εντομοκτόνο - Ακαρεοκτόνο επαφής

BIOLID UP

Δοκιμασμένο και αξιόπιστο!



Panonychus citri



Xanthomonas citri

Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακμαίων, προνυμφών και αυγών).



SIPCAM
HELLAS

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Α.Α.Δ.Α.: 14799/07-04-2022

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος & χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Μηλοειδή, Μηλιά, Αχλαδιά	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiolus perniciosus</i>)	1500-3000	1500-2000	150	Με την έναρξη του ανοίγματος των οφθαλμών έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης - χρωματισμού των καρπών (BBCH 7-85)	1
		2500	2500	100		1-2/15
Κυδωνιά* Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ψευδόκοκκος (<i>Planococcus citri</i>), Ψώρα (<i>Eriococcus lagerstroemiae</i>)	1500-3000	1500-2000	150	Με την έναρξη του ανοίγματος των οφθαλμών έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης - χρωματισμού των καρπών (BBCH 7-85)	1
		2500	2500	100		2/15
Πυρηνόκαρπα, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βερικοκιά	Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiolus perniciosus</i>)	1000-2250	1000-1500	150	Με την έναρξη του ανοίγματος των οφθαλμών έως το στάδιο της προχωρημένης ωρίμανσης - χρωματισμού των καρπών (BBCH 7-85)	1
		1000	1000	100		1-2/20
Εσπεριδοειδή, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά	Τετράνυχος (<i>Panonychus citri</i>), Κοκκοειδή (Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες) (<i>Aonidiella aurantii</i>), Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiolus perniciosus</i>)	1000-2250	1000-1500	200	Από το άνοιγμα των οφθαλμών μέχρι την προχωρημένη ωρίμανση (BBCH 1-85)	1
		740-1500	370-750			1-2/15
Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά	Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes</i> sp.)	1200-1800	1200-1800	100	Εφαρμόζεται Άνοιξη (με την έναρξη της βλάστησης). Καλοκαίρι - Φθινόπωρο. Χειμώνα (BBCH 1-89)	1-2/15
Ακρόδρυα, Φουντουκιά, Καρυδιά, Αμυγδαλιά	Κοκκοειδή (Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες) (<i>Aonidiella aurantii</i>), Τετράνυχος (<i>Panonychus ulmi</i>)	1000-2250	1000-1500	150	Από την πτώση των σπάλων έως την έναρξη χρωματισμού των καρπών (BBCH 7-85)	1
		1000	1000	100		1-2/20
Φιστικιά* Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κοκκοειδή (ψώρες) (<i>Parthenolecanium prunosum</i> , <i>Parthenolecanium corni</i> , <i>Coccus hesperidum</i> , <i>Lepidosaphes pistaciae</i> , <i>Anaripulvinaria pistaciae</i> , <i>Melanaspis inopinata</i>), Λεκάριο (<i>Saissetia oleae</i>), Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes rusci</i>), Ψύλλα (<i>Agonoscena pistaciae</i>)	1000-2250	1000-1500	150	Από το άνοιγμα των φυλλοφόρων οφθαλμών μέχρι το 50% να έχει ωριμάσει (BBCH 07-85)	1
		1000	1000	100		2/20
Καστανιά* Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Καρπόκαψα (<i>Laspeyresia splendana</i>), Βαλάνιος της καστανιάς (<i>Curculio elephas</i>)	1000-2250	1000-1500	150	Από το άνοιγμα των φυλλοφόρων οφθαλμών μέχρι να έχει ανοίξει τουλάχιστον το 50% των εχινωδών περιβλημάτων (BBCH 07-85)	1
		1000	1000	100		2/20
Ακτινιδιά, Συκιά, Λωτός	Κοκκοειδή (Κόκκινη ψώρα και άλλες ψώρες) (<i>Aonidiella aurantii</i>), Ψώρα Σαν Ζοζέ (<i>Quadraspidiolus perniciosus</i>)	1000-2000	1000-2000	100	Από το στάδιο των μπουμπουκιών έως το περικάρπιο γίνεται διαφανές και χρυσοκίτρινο (BBCH 7-85)	1
		1000-1500	1000-1500			1-2/30
Αμπέλι (οινοποιήσιμες & επιτραπέζιες ποικιλίες)	*Χρήσεις ήσσονος σημασίας: <i>Pulvinaria vitis</i> , <i>Ψευδόκοκκος</i> (<i>Planococcus citri</i> , <i>Planococcus ficus</i>), <i>Ερίνωση</i> (<i>Eriophyes vitis</i>), <i>Κίτρινος Τετράνυχος</i> (<i>Tetranychus urticae</i>), <i>Μετκάλα</i> (<i>Metcalfa pruinosa</i>), <i>Θρίπας</i> (<i>Frankliniella occidentalis</i>), <i>Δροσόφιλα</i> (<i>Drosophila suzukii</i>)	1000-1500	1000-1500	100	Από την έναρξη της διόγκωσης των φυλλοφόρων οφθαλμών μέχρι το μαλάκωμα των ραγών (BBCH 01-85)	1
Ελιά (επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες ποικιλίες)	*Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Κοκκοειδή (ψώρες) (<i>Leucaspis riccae</i> , <i>Chrysomphalus dictyospermi</i>), Παρλατόρια (<i>Parlatoria oleae</i>), Λεκάριο (<i>Saissetia oleae</i>), Πολλίνια (<i>Pollinia pollini</i>), Άσπρη ψώρα (<i>Aspidiotus nerii</i>), Μυτιλόμορφη ψώρα (<i>Lepidosaphes ulmi</i>), Βαμβάκαδα (<i>Eurhyllura olivine</i>), Μετκάλα (<i>Metcalfa pruinosa</i>), Ακάρεα (<i>Eriophyes oleae</i> , <i>Tegolophus hassani</i> , <i>Oxyzenus maxwelli</i> , <i>Eotetranychus carpini</i>)	1200-3000	1000-1500	150	Από το άνοιγμα των φυλλοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει έντονα το χαρακτηριστικό χρώμα της ποικιλίας (BBCH 01-85)	1
		600-1500	400-1000			2/15
Ροδιά* Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ακάρεα (<i>Eriophyes grannati</i>), Κίτρινος τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>), Κόκκινος τετράνυχος (<i>Tenuipalpus ruginiae</i>), Κοκκοειδή (<i>Planococcus citri</i>), Λεκάριο (<i>Saissetia oleae</i>), Κηροπλάστης (<i>Ceroplastes sinensis</i> , <i>Lorria formosa</i>), Αφίδες (<i>Aphis gossypii</i> , <i>Aphis fabae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Myzus persicae</i>), Άλευρώδεις (<i>Aleurothrixus floccosus</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i> , <i>Bemisia tabaci</i>), Θρίπες (<i>Thrips</i> sp)	1000-2000	1000-2000	100	Από το άνοιγμα των φυλλοφόρων οφθαλμών μέχρι το περικάρπιο να γίνει χρυσοκίτρινο και καφεκίτρινο με κοκκινωπά τμήματα (BBCH 07-85)	1
		1000-1500	1000-1500			2/30
Αβοκάντο* Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Τετράνυχος, Μύγα Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>), Ψευδόκοκοι, Αφίδες, Θρίπες, Θρίπας των θερμοκηπίων (<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i>)	1000-2000	1000-2000	100	Από το άνοιγμα των φυλλοφόρων οφθαλμών και μέχρι οι καρποί να είναι έτοιμοι για συγκομιδή (≥90% του τελικού μεγέθους του καρπού) (BBCH 07-79)	1
		1000-1500	1000-1500			2/30

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες κυδωνιάς, φιστικιάς, καστανιάς, αμπελιού, ελιάς, ροδιάς και αβοκάντο από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

Τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή:

Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά: Δεν ορίζεται

Ακτινιδιά, Συκιά, Λωτός, Φουντουκιά, Καρυδιά, Αμυγδαλιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά, Βερικοκιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Κυδωνιά, Αμπέλι, Ελιά, Αβοκάντο, Ροδιά: 20 ημέρες



SIPCAM
HELLAS

SIPCAM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΑΕ | e-mail: info@sipcam.gr | www.sipcam.gr

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.