

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Πλυθείτε σχολαστικά μετά τον χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

Υπαίθριες καλλιέργειες:

- Κατά τη χρήση ψεκαστικών μέσων χειρός στις δένδρικές καλλιέργειες, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή και προστασία για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

- Η εφαρμογή με εκκυστήρα στις δένδρικές καλλιέργειες να γίνεται μόνο με κλειστή καμπίνα.

- Στις καλλιέργειες κηπευτικών, πατάτας και βαμβάκι φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή και προστασία για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

- Στις καλλιέργειες αταριού και σόγιας, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και προστασία για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

- Στην καλλιέργεια της φράουλας, φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για την αναπνοή και προστασία για τα μάτια/πρόσωπο κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

- Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

Θεριοκτιπικές καλλιέργειες:

• Φοράτε αδιαπέραστη ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση και την εφαρμογή.

• Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΔΕΞΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός/ Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, κάντε τεχνητή αναπνοή. Διατηρείστε τον παθόντα ξεστό. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή πλάγια θέση για μεταφορά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε καλά.

Αντιδοτό: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

Epik® 200SL

Διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου κατά μασητικών και μυζητικών εντόμων

Πυκνό διάλυμα (SL)

Εγγυημένη σύνθεση: acetamiprid 20% β/ο

Βοηθητικές ουσίες: 82,17% β/β

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: DJDG-JSHW-641J-FRDA

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις.

Περιεχόμενο:
300cc

Αρ. Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
14922/10.07.2025

Κάτοχος της άδειας
SIPCAM OXON S.p.A., Via Sempione, 195,
20016 Pero (MI), Italia
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον.Α.Ε.
Βασιλικό Κωνσταντίνου 32, 15700,
Κορυμπή, Αττικής Τηλ.: 210 2223834,
e-mail: info@sipcam.gr

SIPCAM

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

300cc

**ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσων συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρώσεις επιφανείας και τους δρόμους.)

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην εφαρμόζετε σε αμμόδη εδάφη στην καλλιέργεια του λάχανου. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς μην εφαρμόζετε σε στραγγιζόμενα εδάφη στην καλλιέργεια της αγκινάρας.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφιέρωτε από τα επιφανειακά ύδατα:

- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** στις καλλιέργειες πατάτας και σόγιας
- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** ή χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 50%** στις καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριές, κολοκυθίου, φράουλας, ανθοκομικών / καλλωπιστικών φυτών και φυτωρίων ανθοκομικών / καλλωπιστικών φυτών
- μια αψέκαστη ζώνη προστασίας **20 μέτρων** στις καλλιέργειες δέντρων, λάχανου, φασολιού, οσπρίων, βοτάνων και βρώσιμων ανθέων, καλλωπιστικών φυτών, φυτωρίων εσπεριδοειδών και ψηλών καλλωπιστικών φυτών.

Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφιέρωτε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας:

- **10 μέτρων ή 5 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 75%** σε οπωριές,
- **20 μέτρων ή 10 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 25%** ή **5 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 75%** σε καλλιέργειες και φυτώρια εσπεριδοειδών.
- **10 μέτρων ή 5 μέτρων** με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους **κατά 50%** σε καλλιέργειες κηπευτικών και καλλωπιστικών με ύψος φυτών μεγαλύτερο από 50 εκ.
- **5 μέτρων** σε καλλιέργειες κηπευτικών και καλλωπιστικών με ύψος φυτών μικρότερο από 50 εκ.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

• Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία acetamiprid η οποία ανήκει στην ομάδα 4A κατά IRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά

Καθορισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάζετε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό ξεπλέσιμο ή γίνεται τριπλό ξεπλέμμα (τα νερά του ξεπλέμματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εγκαταστάθηκαν σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

ΕΠΙΚ 200SL

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό εντομοκτόνο, επαφής και στομάχου κατά μασητικών και μυζητικών εντόμων. Δρα δεσμεύοντας τους μετασυναπτικούς (νικατινικούς) υποδοχείς της ακετυλοχολίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας υπερδιέγερση, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο υπό ανάδραση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδραση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής-Στόχος-Δόσεις σκευάσματος-Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά: Για Πράσινη αφίδα, Αφίδα βαμβακιού, Μαύρη αφίδα, Αλευρώδεις, Βρωμούσα, Κόκκινη ψώρα, Φυλλοκνίστης. Μύγα της Μεσογείου, Ασιατική μύγα με δόση: 25-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5-50 κ.εκ./στρ.) Με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη της καρπώσεως μέχρι την ωρίμαση των καρπών (BBCH 70-85). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 100-150.

Κυδωνιά, Μουσομουλιά: Για Βρωμούσα, Οπλοκάμψη, Ματόψευρα, Ρόδινη αφίδα με δόση: 25-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5 κ.εκ./στρ.). Από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών (BBCH 71-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 100-150.

Κεράσια: Για Αφίδες, Βρωμούσα, Μύγα Μεσογείου, Ραγολέτιδα κερασιάς, Δροσόφιλα, Ασιατική μύγα με δόση: 25-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5 κ.εκ./στρ.). Από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών (BBCH 71-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 100-150.

Ελιά: Για Δάκο της ελιάς, *Philaena spumariolus* (φορέας του *Xylella fastidiosa*), Βρωμούσα με δόση: 30-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (30 κ.εκ./στρ.). Με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων σφαιλαμίων μέχρι την ωρίμαση των καρπών (BBCH 50-85). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 80-100.

Φράουλα (Υ+Θ): Για Δροσόφιλα, Αφίδες, Αλευρώδεις με δόση: 31,25-39 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (31,25 κ.εκ./στρ.). Με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη της καρπώσεως μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών (BBCH 70-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 80-100.

Τομάτα (Υ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Καλόκορις με δόση: 50-83,3 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5-50 κ.εκ./στρ.). Με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση της πρώτης τοξάνθιας μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών (BBCH 51-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Μελιτζάνα (Υ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Καλόκορις με δόση: 50-83,3 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5-50 κ.εκ./στρ.). Με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης μέχρι και τη συγκομιδή (BBCH 70-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Πιπεριά (Υ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις, Καλόκορις με δόση: 50-83,3 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5-50 κ.εκ./στρ.). Με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών (BBCH 70-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Κολοκύθι (Υ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις με δόση: 50-83,3 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5-50 κ.εκ./στρ.). Με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης μέχρι και τη συγκομιδή (BBCH 70-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Πεπόνι (Θ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις με δόση: 50-83,3 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5-50 κ.εκ./στρ.). Με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών (BBCH 70-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Λάχανο: Για Αφίδες με δόση: 32,5-54,2 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (32,5 κ.εκ./στρ.). Από την ολοκλήρωση εμφάνισης των φύλλων έως την έναρξη ανάπτυξης της κεφαλής (BBCH 21-40). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Φασόλι φρέσκο (με λοβό και χωρίς λοβό), Σπέρμα (Φασόλι, Κουκί): Για Αφίδες με δόση: 37,5-62,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5 κ.εκ./στρ.). Από την έναρξη ανάπτυξης των λοβών μέχρι να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 70-79). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Αγκινάρα: Για Αφίδες, Αλευρώδεις με δόση: 37,5-62,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5 κ.εκ./στρ.). Από την έναρξη ανάπτυξης της φυλλικής μάζας μέχρι την πλήρη ανάπτυξης της (BBCH 40-49). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Πατάτα: Για Αφίδες με δόση: 50,6-54,2 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (32,5 κ.εκ./στρ.). Από την έναρξη ανάπτυξης των πλευρικών βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των κορυδών (BBCH 20-49). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-80.

Στάρι χειμερινό: Για Αφίδες με δόση: 31,3 - 50 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25 κ.εκ./στρ.). Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της ωρίμασης (στάδιο μαλακής ζυμής) (BBCH 30-83). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 50-80.

Βαμβάκι: Για Αφίδες, Αλευρώδεις με δόση: 32,5 - 54,2 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (32,5 κ.εκ./στρ.). Από την έναρξη ανάπτυξης των καρυδίων και μέχρι το 90% αυτών αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος (BBCH 70-79). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Ανθοκομικά, Καλλιωπιστικά (Υ+Θ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις με δόση: 50-83,3 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών μετά το τέλος της άνθησης (BBCH 70-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Φυτώρια Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά: Για Πράσινη αφίδα, Αφίδα βαμβακιού, Μαύρη αφίδα, Αλευρώδεις, Βρωμούσα, Κόκκινη ψώρα, Φυλλοκνίστης. Μύγα της Μεσογείου, Ασιατική μύγα με δόση: 25-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5 κ.εκ./στρ.). Με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη της καρπώσεως μέχρι την ωρίμαση των καρπών (BBCH 70-85). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 100-150.

Φυτώρια Ανθοκομικά, Καλλιωπιστικά (Υ+Θ): Για Αφίδες, Αλευρώδεις με δόση: 50-83,3 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (50 κ.εκ./στρ.). Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών μετά το τέλος της άνθησης (BBCH 70-89). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-100.

Συμπουκιά: Για Αφίδες, Βρωμούσα, Σκουλήκι της φουντουκιάς με δόση: 25-37,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (37,5 κ.εκ./στρ.). Από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm μέχρι την ωρίμαση των καρπών (BBCH 71-85). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 100-150.

Σόγια: Για Βρωμούσα με δόση: 21,7-32,5 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (32,5 κ.εκ./στρ.). Από την πλήρη ανάπτυξη του 1ου λοβού μέχρι την ωρίμασή του (BBCH 70-80). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 100-150.

Βότανα και βρώσιμα άνηθ, Φραγκομαϊντανός, Σχινόπρασσο, Φύλλα σέλιου, Μαϊντανός, Φασκόμηλο, Δενδρόλιβανο, Θυμαρί, Βασιλικός, Δάφνη/δαφνόφυλλα, Εστραγκόν: Για Αφίδες με δόση: 31,3-41,7 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού (25 κ.εκ./στρ.). Από την ανάπτυξη του 10ου φύλλου μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της συγκομιζόμενης φυλλικής επιφανείας (BBCH 21-49). Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): 60-80.

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει την χρήση στη νεραντζιά και στο περγαμόντο.
2. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει τη χρήση στην κλημεντίνη.
3. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη χρήση στη βυσσινιά.
4. Η χρήση στο λάχανο περιλαμβάνει τη χρήση στο κόκκινο λάχανο, το σαβό λάχανο και το λευκό λάχανο.
5. Να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή στην ποικιλία ελιάς Κορινθίικη. Στην ποικιλία αυτή δεν είναι αποδεξιμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
6. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος στα ανθοκομικά και καλλιωπιστικά να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
7. Το εύρος των δόσεων σχετίζεται με την πυκνότητα του πληθυσμού του εχθρού.
8. Η δόση στο εκατόλιτρο και ο όγκος ψεκαστικού υγρού να συνδυάζονται έτσι ώστε να εφαρμόζεται η εγκεκριμένη δόση σκευάσματος στο στόχεμα.

Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιερ. περίοδο/ μεσοδιάστημα (ημέρες): Στάρι χειμερινό: 2/30, Λοιπές καλλιέργειες: 1.

Τελευταία επίμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Σόγια: 35, Βαμβάκι: 34, Ελιά, Σπέρμα: Φασόλι-Κουκί, Στάρι: 28, Πορτοκαλιά-Νεραντζιά-Περγαμόντο, Λεμονιά, Μανταρινιά-Κλημεντίνη, Κυδωνιά, Μουσομουλιά, Κερασιά -Βυσσινιά, Πεπόνι, Λάχανο-Κόκκινο Λάχανο-Λάχανο σαβό-Λευκό λάχανο, Φασόλι με λοβό, Φασόλι χωρίς λοβό, Πατάτα, Φουντουκιά, Φυτώρια εσπεριδοειδών: 14, Βασιλικός: 10, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκύθι, Αγκινάρα: 7, Φραγκομαϊντανός, Σχινόπρασσο, Φύλλα σέλιου, Μαϊντανός, Φασκόμηλο, Δενδρόλιβανο, Θυμαρί, Δάφνη/ Δαφνόφυλλα, Δρακόντιο/Εστραγκόν: 5, Φράουλα (Υ+Θ): 3, Ανθοκομικά και καλλιωπιστικά, Φυτώρια ανθοκομικών και καλλιωπιστικών: Μη εφαρμόσιμα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.