


Epik[®]



ΕΠΙΚ[®] 200SL

ΚΑΝΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ

Εγγυημένη σύνθεση:
acetamiprid 20% β/ο

Διασυστηματικό εντομοκτόνο,
επαφής και στομάχου κατά
μασητικών και μυζητικών εντόμων

SIPCAM
HELLAS



Toxoptera aurantii




Aonidiella aurantii



Myzus persicae



Bactrocera oleae



Phyllocnistis citrella



Προϊόν παραγωγής των εταιρειών Sipcam Oxon και Nirron Soda.



Έγκριση σε πλήθος καλλιεργειών.



Διασυστηματικό εντομοκτόνο με ψεκασμό φυλλώματος.



Δράση επαφής και στομάχου.



Ανήκει στα νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα.



Προκαλεί υπερδιέγερση, παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.



Εύκολη εφαρμογή (SL)



Ανήκει στην ομάδα 4A κατά IRAC.

Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/στρ.		
Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά	Πράσινη Αφίδα (<i>Aphis spiraecola</i>), Αφίδα βαμβακιού (<i>Aphis gossypii</i>), Μαύρη αφίδα (<i>Toxoptera aurantii</i>), Αλευρώδεις (<i>Aleurothrixus</i> sp.), Βρωμούσα (<i>Halyomorpha halys</i>), Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>), Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i>), Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>), Ασιατική μύγα (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	37,5-50	25-37,5	100-150	Με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη της καρπώσεως μέχρι την ωρίμαση των καρπών.	1
Κυδωνιά, Μουσμουλιά	Βρωμούσα (<i>Halyomorpha halys</i>), Οπλοκάμνη (<i>Hoplocampa brevis</i>), Ματόψειρα (<i>Eriosoma lanigerum</i>), Ρόδινη αφίδα (<i>Dysaphis plantaginea</i>)	37,5	25-37,5	100-150	Από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών.	1

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/στρ.		
Κερασιά	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus persicae</i>), Βρωμούσα (<i>Hanlyomorpha halys</i>), Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>), Ραγολέτιδα κερασιάς (<i>Rhagoletis cerasi</i>), Δροσόφιλα (<i>Drosophila suzukii</i>), Ασιατική μύγα (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	37,5	25-37,5	100-150	Από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών.	1
Ελιά	Δάκος της ελιάς (<i>Bactrocera oleae</i>), <i>Philaenus spumarius</i> (φορέας του <i>Xylella fastidiosa</i>), Βρωμούσα (<i>Halyomorpha halys</i>)	30	30-37,5	80-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από το φούσκωμα των ανθοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμαση των καρπών.	1
Φράουλα (Υ+Θ)	Δροσόφιλα (<i>Drosophila suzukii</i>), Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	31,25	31,25-39	80-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών.	1
Τομάτα (Υ)	Αφίδες (<i>Aphis spiraeicola</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Καλόκορις (<i>Calocoris sp.</i>)	37,5-50	50-83,3	60-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από την εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών.	1
Μελιτζάνα (Υ)	Αφίδες (<i>Aphis spiraeicola</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Καλόκορις (<i>Calocoris sp.</i>)	37,5-50	50-83,3	60-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης μέχρι και τη συγκομιδή.	1
Πιπεριά (Υ)	Αφίδες (<i>Aphis spiraeicola</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Aphis gossypii</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>), Καλόκορις (<i>Calocoris sp.</i>)	37,5-50	50-83,3	60-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών.	1
Κολοκύθι (Υ)	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	37,5-50	50-83,3	60-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης μέχρι και τη συγκομιδή.	1
Πεπόνι (Θ)	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	37,5-50	50-83,3	60-100	Με την εμφάνιση των προσβολών από το τέλος της άνθησης μέχρι την πλήρη ωρίμαση των καρπών.	1
Λάχανο	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>)	32,5	32,5-54,2	60-100	Από την ολοκλήρωση εμφάνισης των φύλλων έως την έναρξη ανάπτυξης της κεφαλής.	1
Φασόλι φρέσκο (με λοβό και χωρίς λοβό)	Αφίδες (<i>Aphis fabae</i>)	37,5	37,5-62,5	60-100	Από την έναρξη ανάπτυξης των λοβών μέχρι να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.	1
Όσπρια: Φασόλι, Κουκί	Αφίδες (<i>Aphis fabae</i>)	37,5	37,5-62,5	60-100	Από την έναρξη ανάπτυξης των λοβών μέχρι να αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος.	1
Αγκινάρα	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	37,5	37,5-62,5	60-100	Από την έναρξη ανάπτυξης της φυλλικής μάζας μέχρι την πλήρη ανάπτυξή της.	1
Πατάτα	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>)	32,5	40,6-54,2	60-80	Από την έναρξη ανάπτυξης των πλευρικών βλαστών μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των κονδύλων.	1

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/στρ.		
Σιτάρι χειμερινό	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>)	25	31,3-50	50-80	Από το στάδιο καλαμώματος μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης (στάδιο μαλακής ζύμης).	2/30
Βαμβάκι	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	32,5	32,5-54,2	60-100	Από την έναρξη ανάπτυξης των καρυδιών και μέχρι το 90% αυτών αποκτήσουν το τελικό μέγεθος.	1
Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά (Υ+Θ)	Αφίδες (<i>Aphis spiraeola</i> , <i>Myzus persicae</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50	50-83,3	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών μετά το τέλος της άνθησης.	1
Φυτώρια Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά	Πράσινη Αφίδα (<i>Aphis spiraeola</i>), Αφίδα βαμβακιού (<i>Aphis gossypii</i>), Μαύρη αφίδα (<i>Toxoptera aurantii</i>), Αλευρώδεις (<i>Aleurothrixus sp.</i>), Βρωμούσα (<i>Halyomorpha halys</i>), Κόκκινη ψώρα (<i>Aonidiella aurantii</i>), Φυλλοκνίστης (<i>Phyllocnistis citrella</i>), Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i>), Ασιατική μύγα (<i>Bactrocera dorsalis</i>)	37,5	25-37,5	100-150	Με την εμφάνιση των προσβολών από την έναρξη της καρπόδεσης μέχρι την ωρίμαση των καρπών.	1
Φυτώρια Ανθοκομικά, Καλλωπιστικά (Υ+Θ)	Αφίδες (<i>Aphis spiraeola</i> , <i>Myzus persicae</i>), Αλευρώδεις (<i>Bemisia tabaci</i>)	50	50-83,3	60-100	Ψεκασμοί φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών μετά το τέλος της άνθησης.	1
Φουντουκιά	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>), Βρωμούσα (<i>Halyomorpha halys</i>), Σκουλήκι της φουντουκιάς (<i>Curculio nucum</i>)	37,5	25-37,5	100-150	Από το στάδιο σχηματισμένων καρπών διαμέτρου 10mm μέχρι την ωρίμαση των καρπών.	1
Σόγια	Βρωμούσα (<i>Halyomorpha halys</i>)	32,5	21,7-32,5	100-150	Από την πλήρη ανάπτυξη του 1 ^{ου} λοβού μέχρι την ωρίμασή του.	1
Βότανα και βρώσιμα άνθη, Φραγκομαϊντανός, Σχοινόπρασο, Φύλλα σέλινου, Μαϊντανός, Φασκόμυλο, Δενδrolίβανο, Θυμαρί, Βασιλικός, Δάφνη/ Δαφνό-φυλλα, Εστραγκόν	Αφίδες (<i>Aphis sp.</i>)	25	31,3-41,7	60-80	Από την ανάπτυξη του 10 ^{ου} φύλλου μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της συγκομιζόμενης φυλλικής επιφάνειας.	1

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

- Σόγια: **35 ημέρες**
- Βαμβάκι: **34 ημέρες**
- Ελιά, Όσπρια: Φασόλι-Κουκί, Σιτάρι: **28 ημέρες**
- Πορτοκαλιά-Νεραντζιά-Περγαμόντο, Μανταρινιά-Κλημεντίνη, Λεμονιά, Κυδωνιά, Μουσμouλιά, Κερασιά-Βυσσινιά, Πεπόνι, Λάχανο-Κόκκινο λάχανο- Λάχανο σαβόι-Λευκό λάχανο, Φασόλι με λοβό, Φασόλι χωρίς λοβό, Πατάτα, Φουντουκιά, Φυτώρια εσπεριδοειδών: **14 ημέρες**
- Βασιλικός: **10 ημέρες**
- Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Κολοκύθι, Αγκινάρα: **7 ημέρες**
- Φραγκομαϊντανός, Σχοινόπρασο, Φύλλα σέλινου, Μαϊντανός, Φασκόμυλο, Δενδrolίβανο, Θυμαρί, Δάφνη/Δαφνόφυλλα, Δρακόντιο/Εστραγκόν: **5 ημέρες**
- Φράουλα (Υ+Θ): **3 ημέρες**
- Ανθοκομικά και καλλωπιστικά, Φυτώρια ανθοκομικών και καλλωπιστικών: **Μη εφαρμόσιμο**

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.p.A

Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:



SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.

e-mail: info@sipcam.gr | www.sipcam.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.

