



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις στο περιβάλλον.

UFI: E6Q5-E0YT-UC09-CMYM

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ σπινθηρίων/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΑ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Απευθυνθείτε σε γιατρό. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλύνετε καλά με νερό. Απορροφούμενο από σαπούνι και τέλος πάλι σαπούνι. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το Τεχνικό Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

(Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλον και των δρόμων).

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

Η δραστική ουσία του σκευάσματος είναι πολύ τοξική για τα ωφέλιμα αρθροπόδα. Επικινδύνo για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικινδύνo μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες ουλλέγουν.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν ανέκααστη ζώνη προστασίας από επιφανειακά ύδατα 15 μέτρων για σπάρη, κριθάρι 20 μέτρων για αραβόσιτο 30 μέτρων για εσπεριδοειδή, ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, φουντουκιά. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή με τριπλό ζεπίλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανακρίση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Συνδιαστικότητα:-

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε Φιάλη



Zippy® 10CS

Lambda-cyhalothrin (λάμδα-σισαλοθρίν)
Μικροκάψουλες σε αιώρημα (CS)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

lambda- cyhalothrin: 10% β/ο (ή 9,53 % β/β)

Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 90,07 % β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

Περιεχόμενο:
1 Lt

Κάτοχος της άδειας:
SIPCAM OXON S.P.A., Via Sempione,
195, 20016 Pero (MI), Italia

Αρ. Αδείας
Διάθεσης στην
αγορά:
14662/12-9-2013

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην
αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Mon-EDIE
Βασιλέως Κωνσταντίνου 37, 19400,
Κορίνθι, Αττικής Τηλ.: 210 5223834,
e-mail: info@sipcam.gr

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

1Lt



SIPCAM

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. **Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίζετε το ψεκαστικό δοχείο με τη μισή ποσότητα νερού από την απαιτούμενη. Αραιώνετε την απαιτούμενη δόση σκευάσματος με μία μικρή ποσότητα νερού αναδεύοντας και κατόπιν ρίχνετε το διάλυμα στο ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε τρεις φορές τα κενά συσκευασίας. Ρίξτε το νερό στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώμετε με το υπόλοιπο νερό ενώ αναδεύετε συνεχώς. **Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και διά στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ: Σιτάρι (μαλακό & σκληρό), Κριθάρι (Αιθίοξ, Σκαθόρι στο σπάρσιου): 15-20 κ.ε.κ./στρ., με την εμφάνιση έντονων προσβολών από τέλος του οδεψώματος μέχρι στο γάλο του καρπού. Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 40-80. Αραβόσιτος (Πυραλίδα, Σποντόπτερα): 10-25 κ.ε.κ./στρ., με την εμφάνιση έντονων προσβολών από την προβόλη της αρσενικής ταξιανθίας (φροντάς) μέχρι του σταδίου της αρχής σκληρότητας των σπάρων. Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 20-100. Πατάτα (Δορυφόρος): 15-25 κ.ε.κ./στρ., με την έναρξη της προσβολής και το ξεδιπλάσιμο των πρώτων φύλλων μέχρι την ωρίμανση. Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 50-100. Πιπεριά Τομάτα, Μελιτζάνα, (Υ) (Πράσινο σκουλήκι): 10-25 κ.ε.κ./στρ. Για τις ανδρικές ανθές με την αύξηση του πληθυσμού τους. Για τους λοιπούς εχθρούς πριν το πρόβλημα καταστεί έντονο. Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 50-100. Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιτ φρούτ) (Αιθίοξ, Μύγα Μεσογείου): 20-40 κ.ε.κ./στρ., με την εμφάνιση των προσβολών μετά την άνθιση μέχρι και την ωρίμανση των καρπών. Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 150-200. Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά) (Μύγα Μεσογείου, Καρποκόψα, Ανδροσά): 10-18 κ.ε.κ./στρ., με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι το στάδιο του αναπαισμένου μεθυστικού καρπού. Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 100-150. Δαμασκηνιά (Μύγα Μεσογείου, Καρποκόψα, Ανδροσά): 10-25 κ.ε.κ./στρ., με την εμφάνιση της προσβολής από το στάδιο της καρπόδεσης μέχρι το μέσον του αναπαισμένου μεθυστικού καρπού. Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 100-150. Ακρόδρυα (Φουντουκιά) (Βρωμύουσα) (Χρήση ήσσονος σημασίας Καψέ Βρωμύουσα) (Halyomorpha halys): 10-15 κ.ε.κ./στρ., με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο του καρπού μέχρι την πλήρη ωρίμανση. Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 70-100. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. Να μην υποβιβάζεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση. 2. Η μεγαλύτερη συνιστώμενη δόση να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έντονων προσβολών. 3. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Ελάχιστο διάστημα μεταξύ των εφαρμογών: Σιτάρι (μαλακό & σκληρό), Κριθάρι, Πατάτα: 2/14, Αραβόσιτος, Ακρόδρυα (Φουντουκιά): 2/10, Πιπεριά Τομάτα, Μελιτζάνα, (Υ): 2/7, Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Γκρέιτ φρούτ): 3/7, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά): 2/10, Δαμασκηνιά: 3/10

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογυμνίας ή περιβαντολογικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. - Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. - Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιομορφική κάλυψη της φυλλικής επιφανείας με το ψεκαστικό υγρό. - Να αποφευχθούν οι διαδοχικές εφαρμογές με το **ZIPPY® 10CS**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. - Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. **Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην μπαίνετε στις ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή. - Για γεωργικές εργασίες μεταξύ των 24 και 48 ωρών από την εφαρμογή, να φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό ώστε να αποφευχθεί η επαφή με το δέρμα. - Να εμποδίζετε την πρόσβαση των σκευασμένων ζώων στις περιοχές που έχουν υποστεί πρόσφατη εφαρμογή του σκευάσματος. **Τελευταία επεξεργασία πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασολלקτικές χρήσεις:** Σιτάρι / Κριθάρι: 28 ημέρες. Αραβόσιτος: 15 ημέρες. Πιπεριά, Τομάτα, Μελιτζάνα: 3 ημέρες. Εσπεριδοειδή, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Φουντουκιά: 7 ημέρες. Πατάτα: 14 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.