



ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: JJD8-30Q0-X60V-QQHN

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/ φόρτωσης και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος. Να εφαρμόζεται μόνο με τρακτέρ.

• **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικές πληροφορίες: Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν. Ζητήστε ιατρική βοήθεια. **Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμεινουν. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Εάν τα συμπτώματα επιμεινουν συμβουλευθείτε γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- Μη μολύνετε νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη (Μην ξεπλένετε τα μηχανήματα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση μέσω στραγγιστικών οδών από τους αγρούς ή τους δρόμους).
- Περιέχει νάφθα (αρωματικός διαλύτης πετρελαίου).

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) αφού καταστραφούν προηγούμενως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το κενό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.


Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.

Αρ. Παρτίδας: 11111111111111111111
ημ. Παρασκευής: 11/11/2022



SIPCAM

ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ



zippy Ultra GR

Lambda-cyhalothrin (λάμδα-σιαλοθρίν)
Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη Σύνθεση

lambda-cyhalothrin: 0.4 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,59% β/β

Περιεχόμενο: 10kg

Αρ. Άδειας Διάθεσης
στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
14648/ 09-03-2018

Κάτοχος της άδειας:
SIPCAM OXON S.p.A.
Via Sempione 195,
20016 Pero (MI), Ιταλία

Υπεύθυνος επικοινωνίας και
διάθεσης στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32,
Κορωπί 19400,
Τηλ.: 210 5223834,
e-mail: info@sipcam.gr



SIPCAM

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

10KG
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευ-
ρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και
διά στομάχου με προληπτική και
κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο
μυζητικών και μασητικών εντόμων σε
διάφορες καλλιέργειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Απ' ευθείας εφαρμογή στο έδαφος.
Τρόπος δράσης: Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΣΟΡΓΟ, ΚΕΧΡΙ: α) **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Μπλολόνη, Σιδηροσκούληκα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

β) **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.2-1.5 Χλμ/στρέμμα. Στα 5-8 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών.

ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΒΑΜΒΑΚΙ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΚΑΡΟΤΟ, ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΟ, ΣΠΟΡΟΙ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑΣ, ΣΠΟΡΟΙ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ, ΣΟΠΙΑ:

Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Μπλολόνη, Σιδηροσκούληκα, Pronύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΑΠΝΟΣ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ/ΚΑΛΩΠΙΣΤΙΚΑ: Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Μπλολόνη, Σιδηροσκούληκα, Pronύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης

ΠΑΤΑΤΑ: Αγρότιδες (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Μπλολόνη, Σιδηροσκούληκα, Pronύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. α) Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης, β) Στα 4-6 φύλλα κατά το αυλάκωμα/παράχωμα.

ΑΙΤΟΥΡΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΙ, ΠΕΠΟΝΙ, ΚΑΡΠΟΥΖΙ, ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΜΑΡΟΥΛΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ, ΣΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΟΜΟΙΑ, ΚΕΦΑΛΩΤΕΣ ΚΡΑΜΒΕΣ, ΑΝΘΟΚΡΑΜΒΕΣ: **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Μπλολόνη, Σιδηροσκούληκα, Pronύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρέμμα. Κατά την μεταφύτευση στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

ΦΥΤΩΡΙΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΑ ΔΕΝΔΡΑ: **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Μπλολόνη, Σιδηροσκούληκα, Pronύμφες Διαβρώτικα:** 1.0-1.5 Χλμ/στρ. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

***αΓια τις ανωτέρω χρήσεις ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του κρεμμυδιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος*.**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αραβόσιτος, Σόργο, Κεχρί, Γλυκό Καλαμπόκι: 2 εφαρμογές ανά 45 ημέρες, Πατάτα: 2 εφαρμογές ανά 30 ημέρες, Λοιπές καλλιέργειες: 1 εφαρμογή.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη εφαρμοσίμο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κατανομή του στο έδαφος στα σημεία εφαρμογής του.

- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το **ZIPPY ULTRA GR**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.

- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

- Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.