

zipper

ULTRA

• Κερδίζει •
• την •
• Παρτίδα! •



SIPCAM
HELLAS

Τεχνολογία GPlus

Παγκόσμια πρωτοπορία στα εντομοκτόνα εδάφους. Το Zippy Ultra είναι σε μορφή μικρόκοκκων ευγενούς ορυκτού γύψου, ειδικής επεξεργασίας με την τεχνολογία **GPlus** της **Sipcam**, που είναι επενδεδυμένοι με την εντομοκτόνο δραστική ουσία λ-cyhalothrin.



Το αποτελεσματικό εντομοκτόνο σποράς με εφαρμογή στο έδαφος, για φυτείες απαλλαγμένες από προσβολές σιδηροσκούληκων, αγρότιδας (καραφατμέ, κοφτοσκούληκα), διαβρώτικα και μολολόνθη.



Lambda cyhalothrin

Το **λ-cyhalothrin** είναι πυρεθρίνη νέας γενιάς με δράση επαφής και στομάχου. Καταπολεμά τα κυριότερα και πιο επιβλαβή έντομα εδάφους. Διαθέτει επίσης ισχυρή απωθητική δράση, ακόμη και σε χαμηλές δόσεις.

Εξασφαλισμένη αποτελεσματικότητα

Με την δραστική ουσία **λ-cyhalothrin**, η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης τόσο των σιδηροσκούληκων όσο και της αγρότιδας για τις καλλιέργειες που συνιστάται, είναι εξασφαλισμένη και με διάρκεια.



Σιδηροσκούληκα



Κοφτοσκούληκα/Καραφατμέ



Μικρόκοκκοι GPlus

Οι μικρόκοκκοι **GPlus** έχουν επιθυμητό μέγεθος, άριστη ροή και σταθερή πυκνότητα χωρίς σκόνη. Δεν είναι υγροσκοπικοί και δε σβολιάζουν. Μετά την ενσωμάτωση στο έδαφος, παραμένουν σταθεροί για μεγάλο χρονικό διάστημα και αποδεσμεύουν σταδιακά τη δραστική ουσία.



Ομοιόμορφη κατανομή και προστασία

Με τους μικρόκοκκους **GPlus**, επιτυγχάνεται εύκολα η ομοιόμορφη κατανομή του φαρμάκου και διασφαλίζεται η προστασία της φυτείας για μεγάλο διάστημα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΔΟΣΗ κιλά/ στρ.	ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Αραβόσιτος, Σόργο, Κεχρί	1.0-1.5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς	2 ανά 45 ημέρες
	1.2-1.5	Για προνύμφες διαβρώτικα στα 5-8 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών.	
Γλυκό καλαμπόκι	1.0-1.5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.	2 ανά 45 ημέρες
Βαμβάκι, Ηλίανθος, Καρότο, Ζαχαρότευτλο, Σπόροι παπαρούνας, Σπόροι Ελαιοκράμβης, Σόγια	1.0-1.5	Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.	1
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά, Καπνός, Λουλούδια/ Καλλωπιστικά	1.0-1.5	Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης	1
Πατάτα	1.0-1.5	α) Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης. β) Στα 4-6 φύλλα κατά το αυλάκωμα/παράκωμα.	2 ανά 30 ημέρες
Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Μαρούλι και όμοια, Σπανάκι και όμοια, Κεφαλωτές κράμβες, Ανθοκράμβες	1.0-1.5	Κατά την μεταφύτευση στο βάθος μεταφύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.	1
Φυτώρια οπωροφόρων δένδρων και νεαρά δένδρα	1.0-1.5	Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης.	1
Από τις ανωτέρω ετήσιες καλλιέργειες όταν αυτές προορίζονται για σποροπαραγωγή		Η δοσολογία και η χρήση όπως αναφέρεται για την κάθε ετήσια καλλιέργεια ανωτέρω.	1



SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μov. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Κορωπί 19400
Τηλ.: 210 5223834 • e-mail: info@sipcam.gr
www.sipcam.gr

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.P.A
Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14648/9-3-2018

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν
πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα
και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της
ετικέτας οδηγίες χρήσης.