



ΠΡΟΣΟΧΗ

UFF: 30C2-F0XU-N00Q-3FR2

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
 - Πολύ τοξικά για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
 - Περιέχει 1,2-βενζιζισθιαζόλ-3-(2H)-όνε (CAS 2634-33-5).
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, εάν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφύγετε να αναπνεύσετε αναθυμιάσεις / αέρια / συμπυκνωμένα ατμοσφαιρικά / ατμούς / εκκρίσματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα αποθήκευσης προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διαβάστε περιεχόμενο/περίληψη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενο χώρο».

«Φοράτε ολοσώμη προστατευτική ενδυμασία, μέσα αποθήκευσης προστασίας για τα μάτια, γάντια και μπότες κατά την αναμίξη/φόρτιση του ψεκαστικού υγρού και κατά την εφαρμογή σε **υπαίθριες** καλλιέργειες».

«Κατά την εφαρμογή σε δεινδρωδείς καλλιέργειες να χρησιμοποιείτε τράκτερ με κλειστή καμπίνα».

«Φοράτε ολοσώμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα αποθήκευσης προστασίας για το πρόσωπο (μάσκα) και μάτια κατά την αναμίξη/φόρτιση του ψεκαστικού υγρού και κατά την εφαρμογή σε **θερμοκηπιακές** καλλιέργειες».

“Οι εργάτες κατά τις εργασίες τους στις ψεκασμένες καλλιέργειες να φορούν μακρύ παντόνι, μακρύ μανικό ποικύμιο και κατάλληλα γάντια”.

“Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό, φοράτε γάντια, μακρύ παντόνι και μακρύ μανικό ποικύμιο.”

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΤΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΠΙΦΑΝΣΙΑΣ ΜΕΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΤΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό νερό για 15 λεπτά. Ζητείστε ιατρική συμβουλή, εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός. Συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΗΝΤΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. Ξεπλύνετε το στομάχι. Μην προκαλέσετε εμετό.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε οπτιματιστική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777

«Για να αποφευχθεί το **κινδύνος** για την **αγροτική υγεία** και το **περιβάλλον**, ακολουθήστε τις **οδηγίες χρήσης**».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΤΕΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ.

[Να μην πλένεται το εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιβοστρώσεις επιφανείας και τους δρόμους].

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε να αφησκάσει ζώνη προστασίας πλάτους **40 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα εκ των οποίων **20 μέτρα** να είναι φυτική ζώνη με αυτοφυή ή τεχνητή βλάστηση και να χρησιμοποιήσετε ακρόσυνη χειρ/ία διασποράς 95%.

Για να προστατέψετε τα αρρότητα μη-στόχους, να αφήσετε μια αφησκάσει ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοζωικής ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική **fenprosiminate**, η οποία ανήκει στην ομάδα 14 κατά IRAC.

Συνιστάται: η εναλλαγή με εντομοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Να μη χρησιμοποιούνται στην ίδια καλλιέργεια και καλλιεργητική περίοδο σκευάσματα που έχουν **περίεχουν δραστικές τις ίδιες ομάδες**.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό διάλυμα.

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής: Ελέγξτε φιάλη



Kendo um[®] 5.12 SC

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

ΔΡΑ ΔΙΑ ΕΠΙΦΑΝΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΣ



ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

fenprosiminate (φενπροσιμινάτε): 5.12% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 94.83% (β/β)

Περιεχόμενο: 1 L
Κάτοχος της αδειας: Nichino Europe Co Ltd
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge-CB24 9PT, Hn. Βασιλεία
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Ε.Π.Ε.
Βασιλείω Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ.19400 Κωφωίτη Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr



ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

1L

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος δράσης: Το fenprosiminate δρα παρεμποδίζοντας την μεταφορά ηλεκτρονίων στην μεταχονδριακή αλυσίδα (MET). Παρεμποδίζει μιτοκονδριακή λειτουργία του συμπλόκου I, αναστέλλοντας τη μιτοχονδριακή αναπνοή των κυττάρων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος αναδύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδύση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλά, Μανταρίνια, Κλημεντίνες, Λεμόνια, Γκρέιπ φρουτ, Κίτρινα, Περγαμόνι, Νεράτζι, Μοσχολέμονο, Κουμπκούτι, Θράπα): **Για Κίτρινο τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο των εσπεριδοειδών με δόση:** 100 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-200 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-200. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 11-85. **Μηλόειδη** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιούνια, Μουσαουλιά): **Για Κίτρινο τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο με δόση:** 100-125 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-200 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-160. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 51-85. **Πυρηνόκαρπα** (Ροδακινιά, Δαμασκηνιά): **Για Κίτρινο τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο με δόση:** 100-125 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-150 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-120. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 51-85. **Αμύγδα (επιπαιρησικές και επιπαιρησικές ποικιλίες εκτός από κορινθιακή σταφίδα και σουτανιάνα): Για Κίτρινο τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο, Τζιγκάκι με δόση:** 80-100 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-200 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-120. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 11-85. **Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Πεπόνια (Θ): Για Κίτρινο τετράνυχο με δόση:** 100-125 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-200 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-160. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 11-89. **Φασολάκια πράσινα (με λωβό) (Υ): Για Κίτρινο τετράνυχο με δόση:** 150-200 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-200 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 80-100. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 11-89. **Φασολάκια πράσινα (με λωβό) (Θ): Για Κίτρινο τετράνυχο με δόση:** 100-125 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-200 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-160. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 11-89. **Φράουλα (Υ+Θ): Για Κίτρινο τετράνυχο, Κόκκινο τετράνυχο με δόση:** 100-125 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-200 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-200. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 11-81. **Καλλωπιστικά: Ανθοκομικά φυτά και Δεινδρωδή καλλωπιστικά (Υ+Θ): Για Κίτρινο τετράνυχο με δόση:** 100-125 κ.εκ./100l ψεκ. Υγρού (100-200 κ.εκ./στρ.), **Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-160. Ψεκάσμος φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών (όταν παρτηρούνται 2-3 κινητές μορφές ανά φύλλο), BBCH 11-89.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Για όλες τις καλλιέργειες 1 εφαρμογή. **Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Εσπεριδοειδή, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Δαμασκηνιά): **14 ημέρες**, Μηλόειδη (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιούνια, Μουσαουλιά): **21 ημέρες**, Αμύγδα (επιπαιρησικές και ονοισοειδείς ποικιλίες εκτός από κορινθιακή σταφίδα και σουτανιάνα): **28 ημέρες**, Τομάτες (Υ), Μελιτζάνες (Υ), Πεπόνια (Θ), Αγγούρι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Φράουλες (Υ+Θ): **7 ημέρες**, Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πράσινα Φασολάκια (με λωβό) (Υ+Θ): **10 ημέρες**.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Στα καλλωπιστικά συστήματα να γίνεται μία δοκιμαστική εφαρμογή για τον έλεγχο φυτοτοξικότητας.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλυ με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνετε υπό πίεση ή γίνεται ρυθικό ξέλυμα (τα νερά του ξελίσματος τα ρίχνουμε στο δοχείο ψεκασμού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: --
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από άμεσο ηλιακό φως.