



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

UFI: UYMU-QWRC-N60G-XXRT

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνευρώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Σε φήλες καλλιέργειας στο θερμοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την ανάμειξη/φύρτωση και αδιαπέρραστη ενδυμασία κατά την εφαρμογή. Σε φήλες καλλιέργειας στην ύπαιθρο, φοράτε γάντια κατά την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ -ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες: Σε περίπτωση ατυχήματος, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα ή/και το δελτίο δεδομένων ασφαλείας).

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Αραιώστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Εάν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε έναν γιατρό. Εάν παρατηρήσει ερεθισμό του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλεφαρά ανοιχτά. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Πίνετε άφθονο νερό. Ζητείστε άμεσα ιατρική φροντίδα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Να ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλείτε εμετό, εφαρμόστε πλύση στομάχου αποφεύγοντας την εισπνοή, χορηγήστε ενεργό άνθρακα και αλατούχο καθαριστικό. Εάν κριθεί απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

Αντένδειξη: Μην χορηγείτε γάλα και λίπη.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Μην ρυπαίνεται το νερό με το προϊόν ή την συσκευασία του.

(Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις καθόριστες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών μην εφαρμόζεται σε τεχνητά σπργανζόμενα εδάφη για τις καλλιέργειες ανθοκομικών και καλλυπτικών.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήνεται μισή φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα ως εξής:

-**20 μέτρων** για τις καλλιέργειες αμπελιού, καρπού, φρούλας, ανθοκομικών και καλλυπτικών φυτών, μαρούλι, σκαρδάς, φύλλων σέλιου και ρόκα.

-**10 μέτρων** για τις καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, αγγουριού, καλοκαιθίου, πεπονιού, καρπουζιού, κολοκύθας και ιμπίδας.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μισή αφέκαστη ζώνη ασφαλείας **5 μέτρων** από μη καλλιεργούμενη γη για τις καλλιέργειες αμπελιού, ανθοκομικών και καλλυπτικών φυτών.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Ξεπλύνετε το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φωτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρίψιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος σκοτεινό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, και σε θερμοκρασία μικρότερη των 35°C. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για ένα (1) χρόνο από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

Oikos® EC

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Υγρό γαλακτωματοποίησης (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Azadirachtin A

Βοηθητικές ουσίες:

2.6 % β/ο

78.72 % β/β

Περιεχόμενο:
1 L

Αρ. Αδείας
Διάθεσης
στην αγορά:
14671/10.08.2018

Κάτοχος της άδειας:
SIPCAM OXON S.p.A.
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Ιταλία

Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400, Κορωπί, Αττικής
Τηλ.: 210 5223834, e-mail: info@sipcam.gr



SIPCAM

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

1L

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος δράσης: Η δραστική του ουσία είναι προϊόν εκχύλισης των σπόρων του τροπικού φυτού (*Azadirachta indica*), δέντρο του Νημ (Neem). Δρα μέσω επαφής και κατάποσης ως ρυθμιστής ανάπτυξης, παρεμβαίνοντας στην εξέλιξη των εντόμων στα ατελή στάδια. Παράλληλα, παρεμποδίζει την σύνθεση εκδυσόνης (ορμόνη που ελέγχει την έκδυση). Έχει επίσης αντιτροφικές και απωθητικές ιδιότητες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακατέψτε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος σε ποσοστό 30-50%. Προσθέστε στο ψεκαστικό την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε με νερό αναθερμαίνοντας συνεχώς. Για καλύτερα αποτελέσματα, το pH του ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να διατηρείται όξινο (pH 4,5-6). Η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού και υπό συνεχή αναδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ:

Για όλες τις καλλιέργειες ψεκασμός φυλλώματος με την εμφάνιση της προσβολής.

Αμπέλι (Τσίτσικα - *Empoasca vitis*, *Scaphioideus titanus*): 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Φράουλα (Υ) (Θρίπες - *Frankliniella occidentalis*): 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού) **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Φράουλα (Θ) (Αλευρώδης - *Bemisia tabaci*): 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού) **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά (Θ) (Αλευρώδης - *Trioletrodes variorum*, Λιριόμυζα - *Liriomyza* spp., Θρίπες - *Frankliniella occidentalis*, Αφίδες - *Aphis* sp., *Myzus persicae*): 150 κ.εκ./στρ. (100-150 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 100.

Αγγούρι, Κολοκυθάκι, Πεπόνι, Κολοκύθα, Καρπούζι (Θ) (Αφίδες - *Aphis gossypii*, *Aphis* spp., Αλευρώδης - *Trioletrodes variorum*, Λιριόμυζα - *Liriomyza* spp.): 150 κ.εκ./στρ. (100-150 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 100.

Καρότο (Σπιντόπτερα - *Sporodoptera exiguat*): 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Πατάτα (Δορυφόρος της πατάτας - *Lepidoptera decemlineata*): 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Ανθοκομικά, Καλλυπτικά (Θ) (Χρυάνθεμο & Ζέρμερο) (Αφίδες - *Aphis* sp., *Myzus persicae*, Λιριόμυζα - *Liriomyza* spp., Θρίπες - *Frankliniella occidentalis*): 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Μπάμια (Υ) Χρήση Ησοονος Σημιάσας (Νηματούδης - *Meloidogyne* sp., *Meloidogyne incognita*): 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Μαρούλι (Υ+Θ), **Σκαρδά** * (Υ+Θ) Χρήσης Ησοονος Σημιάσας: (Θρίπες - *Frankliniella occidentalis*, Αλευρώδης - *Trioletrodes variorum*, *Bemisia tabaci*, Νηματούδης - *Meloidogyne* sp.): 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Φύλλα σέλιου (Υ), **Ρόκα** * (Υ) Χρήσης Ησοονος Σημιάσας: (Θρίπες - *Thrips* sp., Νηματούδης - *Meloidogyne* sp.) 150 κ.εκ./στρ. (100-180 κ.εκ./100 λτ. ψεκ. υγρού). **Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: Αμπέλι: 2, Φράουλα: 2, Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ), Ανθοκομικά-Καλλυπτικά (Θ): 5, Καρότο, Πατάτα: 3, Μπάμια, Μαρούλι (Υ+Θ), Σκαρδά (Υ+Θ), Φύλλα σέλιου, Ρόκα: 3/7-10 ημέρες

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Λόγω του τρόπου δράσης του **ΟΙΚΟΣ**, οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται προληπτικά ή στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των εντόμων.

2. Οι εφαρμογές να γίνονται κατά τις δροσερές και σκιερές ώρες της ημέρας (κατά προτίμηση αργά το απόγευμα).

3. Να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη του φυλλώματος.

4. Να αποφεύγεται η απορροή.

5. Επαναλάβετε κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την καλλιέργεια & τον βιολογικό κύκλο των εντόμων.

6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεχόμενη η απουσία φυτοτοξικότητας.

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της μπάμιας, του μαρουλιού, της σκαρδάς, των φύλλων σέλιου και της ρόκας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Τομάτα (Θ), Αγγούρι (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Πεπόνι (Θ), Καρπούζι (Θ), Κολοκύθα (Θ), Αμπέλι, Καρότο, Πατάτα, Μπάμια: **3 ημέρες**.

Φράουλα (Υ+Θ), Πιπεριά (Θ), Μαρούλι (Υ+Θ), Σκαρδά (Υ+Θ), Φύλλα σέλιου, Ρόκα: **7 ημέρες**

Ανθοκομικά - Καλλυπτικά (Θ): **Μη εφαρμόσιμο**

Αρ. Περιόδου:
Ημ. Παρασκευής: Βλέπε φύλλο
Ημ. Λήξης:

