

Tiazox® 25sc

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

hexythiazox 25.13 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 75.41 % β/β

ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ (ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΧΟΥ

Περιεχόμενο:
250cc (κ.εκ.)

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά (ΥΠΑΑΤ):
2207/26-03-2025

Κάτοχος της άδειας: LAINCO, S.A.
Polígono Industrial Can Jardí, Avda. Bizet, 8-12, 08191
Rubí (Barcelona), Ισπανία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κων/νου 32, 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834, E-mail: info@sipcam.gr



ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

250cc

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μη τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε κατάλληλα γάντια κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτωσης και εφαρμογής. Να φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό οι εργάτες πρέπει να φοράνε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Σε περίπτωση έκθεσης ή αδιαθεσίας καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

UFI: M7A0-40E9-E00C-J1EA

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

8 μέτρων σε καλλιέργεια εσπεριδοειδών, 25 μέτρων σε καλλιέργεια Μηλοειδών - πρώιμη εφαρμογή,

15 μέτρων σε καλλιέργεια Μηλοειδών - όψιμη εφαρμογή, 7 μέτρων σε καλλιέργεια αμπελιού (όψιμη εφαρμογή)

Περιέχει Hexahydro-1,3,5-tris(hydroxyl-ethyl)-s-triazine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε Φιάλη

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:



ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

TIAZOX® 255C

Τρόπος δράσης: Το TIAZOX 25 SC παρεμποδίζει την εξέλιξη των ωών και των άλλων ατελών σταδίων των ακάρεων καθώς και τη γονιμότητα των θηλυκών ατόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά το δοχείο πριν την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώστε την συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού και προσθέστε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής- Στόχος- Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Εσπεριδοειδή: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρεϊπ φρούτ, Κιτριά, Λάιμ, Νερατζιά, Περγαμόντο, Φράπα : α) Κόκκινος τετράνυχος, Κίτρινος τετράνυχος: 6-15 κ.εκ./στρ. με 6 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Με την εμφάνιση της προσβολής. β) *Eutetranychus sp.* 4-15 κ.εκ./στρ. με 4-6 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Με την εμφάνιση της προσβολής. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 100-250.

Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδόμηλα: Κίτρινος τετράνυχος: 16 -30 κ.εκ./στρ. με 20-30 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Με την εμφάνιση της προσβολής. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 80-100.

GR01/4-25/B

Αμπέλι (Επιτραπέζια & οινοποίηση σταφύλια): Κίτρινος τετράνυχος: 10 – 30 κ.εκ./στρ. με 20-30 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Με την εμφάνιση της προσβολής. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 50-100

Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ): Κίτρινος τετράνυχος: 6-15 κ.εκ./στρ. με 20-30 κ.εκ./ 100 λίτρα νερό. Με την εμφάνιση της προσβολής. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 30-50

Μέγιστος αριθ. εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή σε όλες τις καλλιεργείες.

Παρατήρηση: Έχει μακρά υπολειμματική διάρκεια, δύο μηνών, και δεν απαιτείται περισσότερο από μια εφαρμογή το χρόνο.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Εσπεριδοειδή: 14 ημέρες, Μηλοειδή: 28 ημέρες, Αμπέλι (επιτραπέζιο & οινοποίηση): 21 ημέρες, Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ): 3 ημέρες.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών (καλλιεργητικές μέθοδοι, βιολογικά μέσα, κ.λπ.), όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή με ακαρεοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε ακαρεοκτόνο με δραστική ουσία clofentezine ή και το αντίθετο, στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

12 ημέρες σε καλλιέργεια αμπελιού.

Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Διατηρείται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία >0°C και μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, να εναποτεθούν σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: -