



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

• Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικούς οδούς.

UFI: 858K-16RR-Y005-VT2U

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Διάθεση του περιεχομένου/ περιεκτική σύμψηνα με την εθνική νομοθεσία.
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλείτε έμετο.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Απομακρύνετε τα βρεγμένα ρούχα και παπούτσια. Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Σε περίπτωση έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις προϊόντος ή ατμών, φάλαξ ή ψεκατικό υγρού απομακρύνετε άμεσα το παθόντα από την περιοχή έκθεσης, διατηρείστε τον ζωστό και αφήστε τον να ξεκουραστεί.

Προστασία για τους παραγόντες πρώτες βοήθειες: Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

*Για να αποφευχete κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λυθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφηστέ με απέκαστη ζώνη από τα επιφανειακά ύδατα 15 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές στις δένδρυνες καλλιέργειες.
Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Να μην εφαρμόζεται κατά την άνθηση/ όταν οι μέλισσες είναι ενεργές/ όταν υπάρχουν ανθισμένα ζώδια.

Καθαρισμός ψεκατικών μηχανημάτων: Τα ψεκατικά μηχανήματα εφαρμογής πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές με νερό και τα νερά του ξεπλύματος μπορούν να χρησιμοποιούνται για την επίμεση εφαρμογή. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του ψεκατοστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπο πίδαξη ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκατικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καθαρίσουμε προηγουμένως με τριπλή, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε οπήσση συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Προφυλάξεις για τους χειριστές: Χρησιμοποιείτε ατομικά μέσα προστασίας. Να αποφευχθεί η παρουσία προϊόντων που δεν είναι απαραίτητα κατά την εφαρμογή του. Αποφύγετε όλους τους πιθανούς τρόπους αναφλεξης (κάπνισμα, δημιουργία σπινθήρων - φλόγες) στην άμεση γεινιάζουσα περιοχή χειρισμού του προϊόντος). Μην αγγίζετε ή περπατάτε πάνω σε χυμένο προϊόν.

Συνδυαστικότητα:
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

- Να μη γίνεται ψεκασμός αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 5°C ή πάνω από 30°C, ή η σχετική υγρασία είναι κάτω από 30%.
- Να μη γίνεται εφαρμογή σε δένδρα εξασθενημένα λόγω ασθενειών, ξηράς, ξηρών ανέμων ή που έχουν υποστεί υψηλή αέριση λίπανση.
- Να μη γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή βελου ή διασποράς.
- Στα μηλοειδή και ελκεία στο κυρτάλλι να μην προηγηθεί ή έλπει εφαρμογή carptan, folpet, δινιτραιναιόυ-εν σε διάστημα τουλάχιστον 1 εβδομάδας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκατικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις και στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Χρονικές αποθηκεύσεις, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλιματική συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προστατευμένο από ακραίες θερμοκρασίες και άμεσο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αρ. Πρωτόκολλο:

Ημ. Παρασκευής: Ελένη Φιλή

ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΗΡΗΣΗ



Treenol® ες

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ - ΑΚΑΡΕΟΚΤΟΝΟ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΥΣ, ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ & ΑΦΙΔΕΣ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

paraffin oil

96.9 % β/β

(Cas N°: 64742-46-7)

Βοηθητικές ουσίες:

3.1 % β/β

Περιεχόμενο:
I L

Αρ.Άδειας
Κατάθεσης στην
Αγορά (ΑΑΔΑ):
I4784-24-II-2021

Κάτοχος της άδειας -
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση, στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ. Βασιλέως Κων/νου 32,
19400 Κορωπί, Τηλ.: 210 5223 834
Fax: 210 5223 139,
E-mail: info@sipcam.gr

1L

ΦΥΛΑΙΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τρόπος δράσης: Έχει εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση. Χρησιμοποιείται ενάντια σε τετράνυχους, κοκκοειδή και αφίδες. Δρα με φυσικό τρόπο δημιουργώντας ένα φιλμ το οποίο προκαλεί ασφυξία των εντόμων στόχων (ακαμιών, προνυμφιών και αυγών).

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλλιεργειών.

Τρόπος παρασκευής ψεκατικού υγρού: Γεμίστε το ψεκατικό δοχείο με νερό μέχρι την μισή και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος. Αναδεύετε και απογεινίζετε το δοχείο με νερό.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΤΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ. ΠΕΡ.

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά*, Μουσμουλιά*, Αχλαδομηλιά*: Ψώρα Σαν Ζοζέ, Παρτάτορια, Βαμπακάδα, Μυτιλάμορφη ψώρα, Σταχτιά ψώρα, Φυλλοδέστες, Τετράνυχους, Ψύλλα, Αφίδες, Ματώμενη, Χρήσιμες **Ήσσονος Σημείας:** Ψευδοκοκκός*, Ψύρες*. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Βερικοκιά, Κερασιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά: Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμπακάδα, Σφαρηλοκάνο, Παρτάτορια, Μυτιλάμορφη ψώρα, Αφίδες, Φυλλοδέστες, Ακάρεα, Προνύμφες αφίδων και άλλων εντόμων. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Γκρέιφρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Φράπα: Κόκκινη ψώρα, Ψευδοκοκκός, Λεκανίο, Άσπρη ψώρα, Παρτάτορια, Μυτιλάμορφη ψώρα, Άλλα κοκκοειδή, Αφίδες, Ακαρεοειδείς. Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Αμπέλι: Χειμερινά αυγά του Κόκκινου τετράνυχου, Κοκκοειδή, *Pulvinaria vitis**, Ψευδοκοκκός*, Ερίνωση*, Κίτρινο Τετράνυχος*, Μετάλλαξη*, Θρίπες*, Δροσόφουλα*. Μια εφαρμογή στα χειμερινά στάδια της καλλιέργειας με δόση: 1800 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1080 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 60.

Αμυγδαλιά: Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμπακάδα ή Διάσπες, Λεκανίο, Παρτάτορια, Μυτιλάμορφη ψώρα, Κόκκινη Ψύλλα, Κηροπλάστης, Ψώρα, Κίτρινο τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Παρομορφισμοί ακάρεα, Ακάρεα, Αφίδες, Φυλλοδέστες Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Φουντουκιά*: Βαμπακάδα, Κίτρινο Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Ακάρεα Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Φιγιά: Κίτρινο Τετράνυχος, Λεκανίο, Ψώρα, Κηροπλάστης Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Καρδιά*: Κόκκινος τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Ψώρα, Ψώρα Σαν Ζοζέ, Ακάρεα Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Καστανιά*: Καρποκόκκος Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.
Ελιά: Παρτάτορια, Λεκανίο*, Παλλάνο*, Άσπρη ψώρα*, Μυτιλάμορφη ψώρα*, Ψύρες*, Ακάρεα*, Βαμπακάδα*. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Ροδιά*: Τετράνυχος, Κόκκινος τετράνυχος, Ακάρεα, Κοκκοειδή, Λεκανίο, Κηροπλάστης, Αφίδες, Αλευρώδεις, Θρίπες Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Συκιά*: Κίτρινο Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Ακάρεα, Αφίδες, Μαύρη μύγα των ούλων, Ψύλλα της συκιάς Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Ακτινιδιά*: Κίτρινο Τετράνυχος, Κόκκινος Τετράνυχος, Ψώρα Σαν Ζοζέ, Βαμπακάδα ή Διάσπες, Κηροπλάστης, Μετάλλαξη, Βαμπακάδα Μια εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (500 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 50.

Μαστίχα Χίου*: Κόκκοειδή, Λεπιδόπτερα, Ημιτετρα Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Αβκόκκιντο*: Τετράνυχος, Μύγα Μεσογείας, Ψευδοκοκκός, Αφίδες, Θρίπες, Ερίπας των θερμοκηπίων*: Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής, πριν την άνθηση με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150.

Ιμποφαές*: Αφίδες, Ακάρεα, Λεπιδόπτερα Μπορεί να εφαρμοσθεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με δόση: 1000-2000 κ.εκ./100 λίτρα. Ψεκ. Υγρού (1000-3000 κ.εκ./στρ.). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 100-150. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιέργεια περίοδο/ Μεσοδιάστημα:** Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα: 2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή), Εσπεριδοειδή: 2/60 ημέρες (μία χειμερινή και μία καλοκαιρινή). Για *Aleurothrips floccosus* μπορεί να γίνει και μία ακόμα φθινοπωρινή εφαρμογή επίσης, με 60 ημέρες μεσοδιάστημα, **Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά, Ελιά, Ροδιά, Συκιά, Μαστίχα Χίου, Αβκόκκιντο, Ιμποφαές:** 2/60 ημέρες, **Αμπέλι, Ακτινιδιά:** 1 εφαρμογή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητά και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Αχλαδομηλιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καρυδιά, Καστανιά, Ελιά, Ροδιά, Συκιά, Ακτινιδιά, Μαστίχα Χίου, Αβκόκκιντο και Ιμποφαές καθώς και για την αποτελεσματικότητά κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις ακόλουθες χρήσεις ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητά ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Όλες οι καλλιέργειες -.