



ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

Γενικές πληροφορίες:
Απομακρύνετε αμέσως τα ενδύματα που μολύνθηκαν με το προϊόν.

Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν τα συμπτώματα επιμεινουν.Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό διατηρώντας ανοικτά τα βλέφαρα για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Εάν τα συμπτώματα επιμεινουν συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777



Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνδυαστικότητα: ---

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας (σακούλες, σακίδια) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας. Το κενό συσκευασίας δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Ο συνιστώμενος μέγιστος χρόνος αποθήκευσης του σκευάσματος, κλειστό στην αρχική του συσκευασία και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι δύο χρόνια.



Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής:



lambda-cyhalothrin (λάμδα-σιαλοθρίν)

Κοκκώδες (GR)

Εγγυημένη σύνθεση: lambda-cyhalothrin 0.4 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: μέχρι 95,83 % β/β

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο, ευρέως φάσματος, δρα δι' επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για τον έλεγχο μυζητικών και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

• Μη μολύνετε νερά με το προϊόν ή τον περιέκτη (Μην ξεπλύνετε τα μηχανήματα εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε την μόλυνση μέσω στραγγιστικών οδών από τους αγρούς ή τους δρόμους).

• Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν

• Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

• Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Μην αναπνέετε σκόνη. Να μην έλθει σε επαφή με τα μάτια. Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Κατά την διάρκεια εφαρμογής του σκευάσματος είτε με τη χρήση μέσων εφαρμογής φερόμενων σε τρακτέρ είτε μέσω φορητών συσκευών, οι χειριστές θα πρέπει να φοράνε κατάλληλα γάντια κατά το γέμισμα των μέσων αυτών και κατά την εφαρμογή

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: JJD8-30QQ-X60V-QQHN

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): 14486/23-7-2014
Κάτοχος της έγκρισης : SIPCAM OXON S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Italy
Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε. Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400 Κορωπί.
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr

Περιεχόμενο: **10Kg**



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ — ΣΤΟΧΟΙ – ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος δράσης: Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na⁺ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μυώνιων, που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Τρόπος εφαρμογής: Απ' ευθείας εφαρμογή στο έδαφος. **ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ**

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ, ΣΟΡΓΟ, ΚΕΧΡΙ: α) **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Σιδηροσκούληκα:** 1.0-1.5 Χλμα/στρέμμα. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

β) **Προνύμφες Διαβρώτικα:** 1.2-1.5 Χλμα/στρέμμα. Στα 5-9 φύλλα κατά το αυλάκωμα κατά μήκος των σειρών.

ΒΑΜΒΑΚΙ: **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Σιδηροσκούληκα:** 1.0-1.5 Χλμα/στρέμμα. Κατά τη σπορά στο βάθος σποράς κατά μήκος της γραμμής σποράς.

ΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Αγρός): **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Σιδηροσκούληκα:** 1.0-1.5 Χλμα/στρέμμα. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

ΠΑΤΑΤΑ: **Αγρότιδες** (Καραφατμέ, Κοφτοσκούληκο), **Σιδηροσκούληκα:** 1.0-1.5 Χλμα/στρέμμα. Κατά τη φύτευση στο βάθος φύτευσης κατά μήκος της γραμμής φύτευσης.

Παρατηρήσεις:

1. Να μην υπερβαίνεται η μέγιστη συνιστώμενη δόση.
2. Να μην εφαρμόζεται στη φάση της ανθοφορίας και κατά τις περιόδους δραστηριοποίησης των μελισσών.
3. Εφαρμόζετε το προϊόν απουσία ανέμου

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή σε όλες τις καλλιέργειες.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μη εφαρμόσιμο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβατολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας-

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.

- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.

- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κατανομή του στο έδαφος στα σημεία εφαρμογής του.

-Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με το **TRIKA EXPERT**. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.

-Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/ στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπισθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.