

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Περιέχει Disodium maleate.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

UFI: WUY2-G06E-K004-FPDV

ΔΕΛΤΑΙΣΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Όταν φοράτε προστατευτικά γάντια, μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάβαστε τον περιγραφόμενο/περιεκτικό σύμφωνο με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γυαλιά ή μάσκα προσώπου κατά τη διάρκεια της ανάμιξης/φόρτισης.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Φοράτε γάντια και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ με καμπίνα. Φοράτε γάντια και γυαλιά ή μάσκα προσώπου εάν η εφαρμογή γίνεται με τρακτέρ χωρίς καμπίνα. Φοράτε γάντια, γυαλιά ή μάσκα προσώπου και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία εάν η εφαρμογή γίνεται με ψεκαστήρα πλάτης ή αυλό.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού ψεκασμού.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία.»

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ:** Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγήσετε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:** Ξεπλύνετε τις περιοχές του δέρματος στις οποίες έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα στα οποία έπεσε σκεύασμα ή ψεκαστικό υγρό. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΤΑΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777.

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν ψεκαστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο παρουσίας μελισσών.

Καθαρισμός ψεκαστικού μηχανημάτων: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια εφαρμόστε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΚΕΥΗΣ:

Βλέπε Φύλλο



Velmeri® 500WG

Διασυστηματικό εντομοκτόνο κατά των αφίδων

Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

fonicamid 50 % β/β

Βοηθητικές ουσίες: 48.82 % β/β

Περιεχόμενο:
500 gr

Κάτοχος της άδειας:
JT Agro Europe sp z.o.o.
Gate A, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309
Gdańsk, Polska

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά (ΑΔΑΔ):
14912/10.03.2025

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, 19400 Κορινθία
Τηλ: 265 5223 834,
E-mail: info@sipcam.gr



SIPCAM

500gr

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Η δράση του VELMERI 500 WG εντοπίζεται στην εκλεκτική παρεμπόδιση της διατροφικής συμπεριφοράς των αφίδων με αποτέλεσμα τα έντομα να σταματούν αμέσως να τρέφονται και να πεθαίνουν σε 1-3 ημέρες μετά την εφαρμογή.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος ή εφαρμογές με στάγδην άρδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε με την απαιτούμενη ποσότητα του φαρμάκου αναδεύοντας. Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την αναδύση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής- Στόχος- Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
ΕΣΤΕΡΙΔΕΙΔΗ: Πορτοκιά, Λεμόνι, Λεμονιά, Γαρύφαλλο, Κίτρινο, Φράσκα, Νεραντζιά, Περγαμόντο (Αφίδες, Εσπεριδοειδών): 10 γρ./στρ. με 3-5 l νερό / 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 100-300. **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:** Ροδακινιά, Κεράσι, Δαμασκηλιά (Αφίδες): 14 γρ./στρ. με 8-14 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 100-150. **ΜΗΛΟΕΙΔΗ:** Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά - Nashi, Κιδωνιά (Αφίδες): 14 γρ./στρ. με 8-14 γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 100-150. **ΣΟΛΑΝΩΔΗ:** α) Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ) (Αφίδες): 10 γρ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 50-100. β) Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ) (Αφίδες): 10 γρ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾. (Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φυλλών έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα). **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 50-100. γ) Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ) (Αλευρώδεις): 16 γρ./στρ. **Εφαρμογή με στάγδην άρδευση:** Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις: στάγδην άρδευση και μία ολόσωμη. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 200-500. **ΚΟΛΟΚΥΝΟΕΙΔΗ:** Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ) (Αφίδες): 10 γρ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾. (Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φυλλών έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα). **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 50-100. **ΣΙΤΑΡΙ (Αφίδες):** 14 γρ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 20-50. **Καντάρι (Αφίδες):** 14 γρ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 40-60. **Βαμβάκι (Αφίδες):** 7,5 γρ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 50-80. **Καλλωπιστικά φυτά: Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) (Αφίδες):** 14 γρ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών ⁽¹⁾. (Ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φυλλών έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα). **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 50-100. **Καλλωπιστικά δέντρα και Καλλωπιστικό θάμνοι (Αφίδες):** 14 γρ./στρ. Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 50-100.

Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Εσπεριδοειδών, Καντάρι: 2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Πυρηνόκαρπα, Σίταρο:** 2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Μηλοειδή:** 3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Σολανώδη (Υ), Κολοκυθοειδή (Θ):** 3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Σολανώδη Θερμοκήπια και θερμοκήπια με στάγδην άρδευση:** 3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Βαμβάκι:** 2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Καλλωπιστικά φυτά: Τριανταφυλλιά (Υ+Θ), Καλλωπιστικά δέντρα και Καλλωπιστικό θάμνοι:** 3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται. **Παρατηρήσεις:**

- 1) Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
- 2) Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- 3) Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
- 4) Η χρήση στη ροδακινιά (PRNF5) περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά (PRNFN).
- 5) Τα ελάνια επεμβαίνονται πριν τη συγκοπή: 75 ημέρες πριν στην Πορτοκιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Μανταρινιά, Λεμόνι, Κίτρινο, Γαρύφαλλο, Φράσκα: 60 ημέρες. Σίταρο: 28 ημέρες. Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά Nashi, Κιδωνιά: 21 ημέρες. Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηλιά, Κεράσι: 14 ημέρες. Καντάρι: 7 ημέρες. Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ): 1 ημέρα.

Ειδικές συνθήκες γενικής, φυτολογίας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των ωφέλιμων αρθρόποδων, ώστε να περιοριστούν οι επεμβάσεις στις απολύτως απαραίτητες.
- Επεμβάσεις με το προϊόν χωρίς, όταν ο πληθυσμός των αφίδων είναι σε χαμηλά επίπεδα.
- Οι εφαρμογές θα πρέπει να γίνονται στις συνιστώμενες δόσεις και μεσοδιαστήματα και να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.
- Επιτρέπεται η χρήση κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας (μία μόνο εφαρμογή) και κατά την περίοδο παραγωγής μελιτωμάτων (που περιλαμβάνουν της εφαρμογής) σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι ενεργές.
- Διαχείριση ανθεκτικότητας:** Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. fonicamid, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά IRAC.
- Να αποφευχθούν οι διαδοχικές εφαρμογές με το προϊόν. Το σκεύασμα μπορεί να εναλλαχθεί με εντομοκτόνα άλλων χημικών ομάδων που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με το fonicamid.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: 6 ώρες στον αγρό και 8 ώρες στο θερμοκήπιο.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τα οποία:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.