

Velmeri®



VELMERI® 500WG

ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Εγγυημένη σύνθεση:
flonicamid 50% B/B

- ✓ Εξελιγμένο και καινοτόμο!
- ✓ Διασυστηματικό εντομοκτόνο για εφαρμογές από φύλλωμα και από εδάφους.



SIPCAM
HELLAS

Flonicamid

- Έχει διασυστηματική δράση και ικανή υπολειμματική διάρκεια¹.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την περίοδο της ανθοφορίας, σε ώρες που οι μέλισσες δεν είναι δραστήριες.
- Εφαρμόζεται από φύλλωμα και από εδάφους με στάγδην άρδευση, ανάλογα με την καλλιέργεια.
- Δεν έχει τοξική δράση σε ωφέλιμα αρθρόποδα¹.
- Ανήκει στην ομάδα Group 29 κατά IRAC³.
- Ανήκει στα πυριδινοκαρβοξαμιδικά εντομοκτόνα³.




Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./στρ.	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρ.		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά	Αφίδες: <i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus pruni</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i> , <i>Brachycaudus schwartzi</i>	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Κερασιά	Αφίδες: <i>Myzus cerasi</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Hyalopterus pruni</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i> , <i>Brachycaudus schwartzi</i>	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Δαμασκηνιά	Αφίδες: <i>Hyalopterus pruni</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Brachycaudus helichrysi</i> , <i>Brachycaudus schwartzi</i>	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά	Αφίδες: <i>Dysaphis plantaginea</i> , <i>Dysaphis pyri</i> , <i>Eriosoma lanigerum</i> , <i>Aphis pomi</i>	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Αχλαδιά, Αχλαδιά - NASHI, Κυδωνιά	Αφίδες: <i>Dysaphis pyri</i> , <i>Eriosoma lanigerum</i>	14	8-14	100-150	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	3 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΗ: Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκυθάκι (Θ)	Αφίδες: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Macrosiphum sp.</i> , <i>Aphis fabae</i>	10	-	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1). (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ: Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέιπφρουτ, Κίτριά, Φράπα, Νεραντζιά, Περγαμόντο	Αφίδες εσπεριδοειδών: <i>Aphis citricola</i> , <i>Toxoptera auranti</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>	10	3,5-100	100-300	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		γρ./στρ.	γρ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρ.		
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα (Υ), Μελιτζάνα (Υ)	Αφίδες: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Macrosiphum sp.</i> , <i>Aphis fabae</i>	10	-	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1)	3 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ)	Αφίδες: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Macrosiphum sp.</i> , <i>Aphis fabae</i>	10	-	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών (1). (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
ΣΟΛΑΝΩΔΗ: Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ) (εφαρμογή με στάγδην άρδευση)	Αλευρώδεις: <i>Bemisia tabaci</i> , <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	16	-	200-500	Η πρώτη εφαρμογή γίνεται στα φύλλα ενάντια στις αφίδες. Σε αυτή την περίπτωση ο αριθμός εφαρμογών είναι max 3 με δύο επεμβάσεις στάγδην άρδευση και μία φυλλώματος	3 εφαρμογές max (1 φυλλώματος, 2 με στάγδην άρδευση) ανά 10-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Σιτάρι	Αφίδες: <i>Aphis nasturtii</i> , <i>Macrosiphum avenae</i> , <i>Macrosiphum dirhodum</i> , <i>Metopolophium dirhodum</i> , <i>Rhopalosiphum padi</i>	14	-	20-50	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καπνός	Αφίδες: <i>Myzus sp.</i>	14	-	40-60	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Βαμβάκι	Αφίδες: <i>Aphis gossypii</i>	7,5	-	50-80	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	2 εφαρμογές ανά 7-14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καλλωπιστικά φυτά, Τριανταφυλλιές (Υ+Θ)	Αφίδες: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum sp.</i> , <i>Aphis fabae</i>	14	-	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών-εντόμων (1). (ιδιαίτερα στο θερμοκήπιο όταν το 5% των φύλλων έχει προσβληθεί από 1 ή περισσότερα έντομα)	3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καλλωπιστικά δέντρα, Καλλωπιστικοί θάμνοι	Αφίδες: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , <i>Macrosiphum sp.</i> , <i>Aphis fabae</i>	14	-	50-100	Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής χωρίς την παρουσία μελισσών	3 εφαρμογές ανά 14-21 ημέρες εφόσον απαιτείται

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η μία εφαρμογή μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας.
2. Σε περιοχές με υψηλά ποσοστά προσβολής ακολουθήστε πρόγραμμα ψεκασμών το οποίο να προβλέπει εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
3. Για καλύτερα αποτελέσματα πρέπει να γίνεται καλή και ομοιόμορφη διαβροχή των φυτών.
4. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και τη νεκταρινιά.



Myzus persicae

Hyalopterus pruni

Myzus cerasi

Dysaphis plantaginea

Eriosoma lanigerum

Aphis pomi

Macrosiphum euphorbiae

Bemisia tabaci

Trialeurodes vaporariorum

1. Ελέγχει πολλά είδη αφίδων και αλευρωδών².

2. Είναι αποτελεσματικό στις αφίδες ανεξάρτητα από το είδος, το στάδιο ή τη μορφή τους².

3. Σταματάει τη διατροφή των αφίδων μέσα σε 30 λεπτά από την εφαρμογή, χωρίς ορατά συμπτώματα άμεσα στα έντομα².



Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Βαμβάκι	75 ημέρες
Πορτοκαλιά, Νεραντζιά, Περγαμόντο, Μανταρινιά, Λεμονιά, Κιτριά, Γκρέϊπφρουτ, Φράπα	60 ημέρες
Σιτάρι	28 ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά, Αχλαδιά Nashi, Κυδωνιά	21 ημέρες
Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά	14 ημέρες
Καπνός	7 ημέρες
Αγγούρι (Θ), Αγγουράκι (Θ), Κολοκύθι (Θ), Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ)	1 ημέρα

Βιβλιογραφία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ:

1-Βασίλειος Ζιώγας, Αναστάσιος Μαρκόγλου, (2017). Γεωργική Φαρμακολογία, Βιοχημεία. Φυσιολογία, Μηχανισμοί Δράσης και Χρήσεις των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων. (3η έκδοση), Αθήνα, 846 σελ., σελ. 405.

ΞΕΝΗ:

2-Morita, M., Ueda, T., Yoneda, T., Koyanagi, T. and Haga, T. (2007), Flonicamid, a novel insecticide with a rapid inhibitory effect on aphid feeding. Pest. Manag. Sci., 63: 969-973.
<https://doi.org/10.1002/ps.1423>
 3-https://irac-online.org/content/uploads/MoA_Group_29-1.pdf, accessed 10/12/2025

Κάτοχος της άδειας: JT Agro Europe sp z.o.o.

Υπεύθυνος διάθεσης στην αγορά:



SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.

e-mail: info@sipcam.gr | www.sipcam.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την επικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της επικέτας οδηγίες χρήσης.