



ΠΡΟΣΟΧΗ

UFI: 4RCS-GVUM-A40Y-7Q5E

• Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. - Περιέχει cytochanil και 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. - Ήπιοτα για πρόκληση βλάβης στη γυναικότητα και στο έμβρυο. - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα, θύμος αδένας και μάτια) ύστερα από παρατεταμένη ή επαναληπτική έκθεση. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια/ ατμούς/ενκυσήματα. Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πινείτε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικό γάντι/ προστατευτική ενδυμασία / μέσο ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Ανάθεση του περιεχομένου/περιεχόμενου με την εθνική νομοθεσία. «Φοράτε ολοσώμιο φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάλυση, φέρση και εφαρμογή του σκευάσματος». «Για εφαρμογές με υποβοηθούμενο αέρα χρήση ακροφυσίων μείωσης του ψεκαστικού νέφους κατά 50%». «Για τις θερμοκηπτικές καλλιέργειες με πυκνό φύλλωμα φοράτε ολοσώμιο φόρμα εργασίας, γάντια και προστασία κατά την ανάλυση, φέρση και επλήρωση των παρώνων αδιάφορο σάκων και παντελόνι κατά την εφαρμογή του σκευάσματος». «Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακριά παντελόνι και γάντια».

«Οι χειρωνακτικές εργασίες στο αμπέλι να πραγματοποιούνται τουλάχιστον **μία ημέρα** μετά την εφαρμογή». «Για την **προστασία των κατοίκων ή των παρευρισκόμενων** να αφαιρεθεί αψεκαστική ζώνη προστασίας **10 μέτρων στην καλλιέργεια αμπέλου με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς κατά 50%**».

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξανθοφορέσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Η ΠΕΝΑΝΤΙΣΤΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση αλυσίδας των αι- θησιών, μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση για μεταφορά. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε τα μάτια αμέσως για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμε- νο νερό, μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα και μετά με κατάλληλο οφθαλμικό διάλυμα. Ζητεί- στε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, μεταφερθείτε αμέσως σε νοσοκομείο. Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα χωρίς να καταπιείτε. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

«Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση με- τω των συστημάτων από τις λιθοστρώσεις επιφανείας και τους δρόμους. Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, για την **καλλιέργεια αμπέλου** να αφαιρεθεί μια αψεκαστική ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- 10 μέτρων ή

- 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξοφανιστούν πλήρως ο σπρος και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (δοχεία/φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τριπλή για την διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύ- κλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Βιοδιασπορά: Δεν έχει ελεγχθεί η βιοδιασπορά με άλλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

Βλέπε Φιάλη

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:



Academic®

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΟΝΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥΣ
(ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΩΜΥΚΗΤΩΝ)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

cytochanil 15 % β/ο + ametoctradin 30 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 57,66 % β/β

Περιεχόμενο: 1 Lt

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM ΟΧΟΝ SPA
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italia

Υπευθύνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον.Α.Ε.

Βασιλείας Κων/νου 32, 19400 Κορυμ-
νήλη, Τηλ.: 210 5223 834, E-mail: info@aicam.gr

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά (ΑΑΔΑ):
61208/12.06.2025

GR02/T2-25



SIPCAM

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

1Lt

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλονται σε περονόσπορους (παθόγωνα της κλάσης των ωμυκήτων). Είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, του ametoctradin και του cytochanil. Το ametoctradin είναι μυκητοκτόνο επαφής που παρεμποδίζοντας το σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας των μυ- κήτων, αναστέλλει την διαφοροποίηση και απελευθέρωση των ζωοσπορίων. Το cytochanil έχει προστατευτική και με- ραπειντική δράση, κινείται διελασματικά και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλλιεύσεως φυλλώματος υψηλού όγκου.

Τρόπος παρασκευής φυσεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχι- ζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής- Στόχος- Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Αμπέλι (επιτραπέζιο - οινοποίησης): Για **Περονόσπορο** (*Plasmopara viticola*): με δόση: 80-100 κ.ε.κ./στρ. Από την εμφάνιση της ταξιανθίας έως την αρχή του υαλομάτας (BBCH 53-81). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 15-100 **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1. Τομάτα, Μελιτζάνα (Υ+Θ): Για **Περονόσπορο** (*Phytophthora infestans*): με δόση: 80 κ.ε.κ./στρ. Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών (BBCH 21-89). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 50-100 **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/7-10. Πατάτα: Για **Περονό- σπορο** (*Phytophthora infestans*): με δόση: 80 κ.ε.κ./στρ. Από το στάδιο της έκπτυξης του 1^{ου} Πλευρικού βλαστού (5 εκ) έως πριν την έναρξη κτηριασμού των φύλλων (BBCH 21-89). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 50-100 **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/5-10 κάθε 2^ο χρόνο. Αγγούρι, Κο- λοκύθι (Υ+Θ): Για **Περονόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*): με δόση: 80 κ.ε.κ./στρ. Από τον πλάγιο σχηματισμό βλαστών / ανάδυση πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 41-89). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λί- τρα/στρ.):** 50-100 **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/7-10. Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα (Υ): Για **Περονόσπορο** (*Pseudoperonospora cubensis*): με δόση: 80 κ.ε.κ./στρ. Από τον πρώτο σχηματισμό βλαστών / ανάδυση πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 41- 89). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 50-100 (Υ). **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/7-10. Μαρούλι, Σκαρόλι/Πλάτυφλλο Αντίδι (Εκτός των καλλιεργειών νεαρών φυλλών): Για **Περονόσπορο** (*Bremia lactucae*): με δόση: 80 κ.ε.κ./στρ. Από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως το στάδιο που έχει αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος (BBCH 41-49). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 30-100 **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 2/7-10. Βασιλικός, Ρόκα, Σπα- νάκι (Εκτός των καλλιεργειών νεαρών φυλλών): Για **Περονόσπορο** (*Peronospora sp.*): με δόση: 80 κ.ε.κ./στρ. Από το στάδιο των 9 φυλλών έως όπου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 20-49). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 30-100 **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλι- εργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1 εφαρμογή κάθε 2^ο χρόνο. Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια: Για **Περονόσπορο** (*Peronospora destructa*): με δόση: 80-100 κ.ε.κ./στρ. Από το στάδιο της πύκνωσης της βάσης των φυλλών μέχρι το στάδιο που έχει αποκτήσει το τυπικό σχή- μα και μέγεθος (BBCH 41-49). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 30-100 **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιέργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1 εφαρμογή κάθε 2^ο χρόνο. Βασιλικός: Για **Περονόσπορο** (*Bremia lactucae*, *Peronospora sp.*): με δόση: 80 κ.ε.κ./στρ. Από το στάδιο των 9 φυλλών έως όπου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή (BBCH 20-49). **Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** 30-100 **Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλι- εργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες:** 1 εφαρμογή κάθε 2^ο χρόνο.

Παρατηρήσεις:

1. Αφαιρέστε τυχόν μολυσμένους καρπούς καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
2. Εξασφαλίστε καλό αερισμό της καλλιέργειας.
3. Η χρήση στη υπαίθριο καλλιέργεια τομάτας, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθιού περιλαμβάνει και προσωρι- νές κατασκευές τύπου τουνέλ.
4. Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Λυκοτρίβωλο, Ρόκα και Μελιτζάνα από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Να προηγηθεί δοκιμα- στική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι (επιτραπέζιο - οινοποίησης): 35 ημέρες, Τομάτα (Υ+Θ), Με- λιτζάνα (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθα (Υ+Θ): 3 ημέρες, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Μαρούλι, Σκαρόλι/Πλάτυφλλο Αντίδι, Ρόκα, Λυκοτρίβωλο, Σπανάκι, Βασιλικός: 7 ημέρες. **Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Αποθηκεύεται στην αρχική του απορροβίσι- τη ουσία σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρό- νια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογυγίας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησι- μοποιηθεί ή να αποκαταστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες :

- cytochanil που ανήκει στην ομάδα 27 κατά FRAC (αντιόξυμο μηχανισμού δράσης) και
- ametoctradin που ανήκει στην ομάδα 45 κατά FRAC (παρεμβολιστής του συμπλόκου III της αναπνευστικής αλυσί-δας- Qioi-Sulfide).

Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:
- Μην εισέρχεται στο πεδίο εφαρμογής πριν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό, 1 ημέρα για την καλλιέργεια του αμπέλιου.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρένέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν αναμένεται να παρουσιάσει φυτοτοξικότητα όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.