

Academic[®]



ACADEMIC[®] SC

ΔΙΠΛΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εγγυημένη σύνθεση:
cytoxinil 15% B/o
ametoctradin 30% B/o

Μυκητοκτόνο για την
καταπολέμηση του
περονοσπόρου σε πλήθος
καλλιεργειών



SIPCAM
HELLAS






ΜΙΓΜΑ ΔΥΟ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Cymoxanil 15% β/ο

- Έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση
- Κινείται διελασματικά και παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων
- Ανήκει στην ομάδα Group 27 κατά FRAC

Ametoctradin 30% β/ο

- Έχει δράση επαφής
- Παρεμποδίζει το σύμπλοκο III της αναπνευστικής αλυσίδας των μυκήτων
- Αναστέλλει τη διαφοροποίηση και απελευθέρωση των ζωοσπορίων
- Ανήκει στην ομάδα Group 48 κατά FRAC



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

→ **Αποτελεσματικός έλεγχος** περionoσπόρου σε πολλές καλλιέργειες

→ **Ευκολία χρήσης** χάρη στη μορφή του σκευάσματος

→ **Διαχείριση ανθεκτικότητας** λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης των δραστικών ουσιών

Φάσμα Δράσης

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόση κ.εκ./στρ.	Όγκος ψεκαστικού υγρού λίτρα/στρ.	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών
Αμπέλι (οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	80-100	15-100	Από την εμφάνιση της ταξιανθίας έως την αρχή του γυαλίσματος.	1
Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora Infestans</i>)	80	50-100	Από την έκπτυξη του πρώτου πλάγιου βλαστού έως το στάδιο της τυπικής πλήρους ωρίμανσης των καρπών.	2/7-10
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora Infestans</i>)	80	50-100	Από το στάδιο της εκπτυξης του 1ου πλευρικού βλαστού (5 εκ) έως πριν την έναρξη κιτρινίσματος των φύλλων.	2 εφαρμογές ανά 5-10 ημέρες κάθε 2 ^ο χρόνο
Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ+Θ)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80	50-100 (Υ+Θ)	Από το πλάγιο σχηματισμό βλαστών / ανάδυση πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.	2/7-10
Πεπόνι (Υ), Καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ)	Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	80	50-100	Από το πλάγιο σχηματισμό βλαστών / ανάδυση πρώτης ταξιανθίας έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών.	2/7-10
Μαρούλι, Σκαρόλα/Πλατύφυλλο Αντίδι (Εκτός των καλλιεργειών νεαρών φύλλων)	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>)	80	30-100	Από την έναρξη σχηματισμού της κεφαλής έως το στάδιο που έχει αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος	2/7-10
Λυκοτρίβολο, Ρόκα, Σπανάκι (Εκτός των καλλιεργειών νεαρών φύλλων)	Περονόσπορος (<i>Peronospora sp.</i>)	80	30-100	Από το στάδιο των 9 φύλλων έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή.	1 εφαρμογή κάθε 2 ^ο χρόνο
Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια	Περονόσπορος (<i>Peronospora destructor</i>)	80-100	30-100	Από το στάδιο της πάχυνσης της βάσης των φύλλων μέχρι το στάδιο που έχει αποκτήσει τυπικό σχήμα και μέγεθος.	1 εφαρμογή κάθε 2 ^ο χρόνο
Βασιλικός	Περονόσπορος (<i>Bremia lactucae</i>), (<i>Peronospora sp.</i>)	80	30-100	Από το στάδιο των 9 φύλλων έως ότου η κεφαλή φθάσει στο τυπικό της μέγεθος και μορφή.	1 εφαρμογή κάθε 2 ^ο χρόνο

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Αφαιρέστε τυχόν μολυσμένους καρπούς καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.
- Εξασφαλίστε καλό αερισμό της καλλιέργειας.
- Η χρήση στις υπαίθριες καλλιέργειες τομάτας, μελιτζάνας, αγγουριού και κολοκυθίου περιλαμβάνει και προσωρινές κατασκευές τύπου τούνελ.
- Δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Λυκοτρίβολο, Ρόκα και Μελιτζάνα από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.





Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Αμπέλι (οινοποιήσιμο και επιτραπέζιο)	35 ημέρες
Τομάτα (Υ+Θ) Μελιτζάνα (Υ+Θ) Αγγούρι (Υ+Θ) Κολοκύθι (Υ+Θ)	3 ημέρες
Πατάτα, Πεπόνι, Καρπούζι, Κολοκύθα, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια, Μαρούλι, Σκαρόλα/ Πλατύφυλλο Αντίδι, Ρόκα, Λυκοτρίβολο, Σπανάκι, Βασιλικός	7 ημέρες



Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.p.A.

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:



SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.

e-mail: info@sipcam.gr | www.sipcam.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.