



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη
- Υποπνο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις



ΔΙΔΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

• Μην αναπνέετε το ψεκαστικό νέφος
• Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά τον χειρισμό • Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν • Να αποφεύγετε η ελευθέρωση του στο περιβάλλον • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο και σταθερά υποδήματα • Μαζέψτε την υμενική ποσότητα.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι λεπτά. Εάν ο ερεθισμός εμμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός παραμένει ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης: Να μην προκληθεί εμετός. Συνομιλήστε πλύνετε στομάχι/ ή/ και λήψη ενεργού άνθρακα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του. Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΗΓΗΤΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνηθισμένες χρήσεις και δόσεις.

Συνδαστακτικότητα: —

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος θα ριχνόμαστε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστροφούν προηγούμενης με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και σε θερμοκρασίες κάτω των 40°C και προστατευόμενο από παγετό. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

UFI: 25NA-W6J3-810N-R4R8

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.


Για την προστασία υδρόβιων οργανισμών θα πρέπει να παραμείνει μια αψέκαστη ζώνη: 20m για σπαράγγια, 20 m για δενδρώδεις καλλιέργειες που μενιούνται στα 10 m εάν χρησιμοποιούνται μπεκ μείωσης διασποράς 10%. 10 m για όλες τις άλλες καλλιέργειες.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

Βλέπε Φιάλη



Altis 25EC

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Tebuconazole	25 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες	74.84% (β/β)



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

1Lt

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΞΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ALTIS 25 EC

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs, (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασidiomύκητες, Ασcomύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιομηχανικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βασιδύμηση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation inhibitors - DMIs).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΤΟΧΟΙ - ΔΟΣΕΙΣ

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε αναδύοντες την αναμειγμένη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό, αναδύοντας συνεχώς. **Στάρι, Σικάλη, Βρώμη, Τριτκάλες:** Ψικάλη, Σκωρίαση, Ρυγχοσπορίωση, Σεπτόρια, Φουζάριο, Πυρροσπορία: 100 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) από το στάδιο που ο δεύτερος κόμβος είναι τουλάχιστον 2 εκ πάνω από τον πρώτο. Μέχρι το τέλος της ανθοφορίας παρόλο που μερικοί αβυδατωμένοι ανθήρες μπορεί να παραμένουν ακούσιο στο στάδι. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 20-40. **Κριθάρι:** Ρυγχοσπορίωση, Ψιδίο, Πυρροσπορία, Σκωρίαση: 100 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) από το στάδιο που ο δεύτερος κόμβος είναι τουλάχιστον 2 εκ πάνω από τον πρώτο. Μέχρι το τέλος της ανθοφορίας παρόλο που μερικοί αβυδατωμένοι ανθήρες μπορεί να παραμένουν ακούσιο. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 20-40. **Χειμερινή ελαιοκράμβη** (φθινοπωρινές εφαρμογές): Φόμα. Γλοισπόριο: 50 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) από το στάδιο των 9 φύλλων μέχρι λίγο πριν την εμφάνιση των πλευρικών βλαστών. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 20-60. **Χειμερινή ελαιοκράμβη** (εαρινές εφαρμογές): Σκληρωτίτινα, φόμα, ιδίο, αλτερνάρια, γλοισπόριο: 100 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) από την αρχή της ανάπτυξης των βλαστών μέχρι και του σταδίου που αρχίζει να φθίνει η άνθιση. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 20-60. **Εαρινή ελαιοκράμβη** (εαρινές εφαρμογές): Σκληρωτίτινα, φόμα, ιδίο, αλτερνάρια, γλοισπόριο: 100 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) από το στάδιο των 9 φύλλων μέχρι και του σταδίου που αρχίζει να φθίνει η άνθιση. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 20-60. **Μηλοειδή (Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά):** Φουζιλκιδίο, ιδίο, στεμφύλιο: 100 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) ή 70-100 κ.εκ/100 Lt ψεκ. υγρού από το άνοιγμα των πρώτων ανθέων έως του σταδίου που τα φρούτα έχουν φθάσει περίπου το 90% του τελικού τους μεγέθους σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 100-150. **Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά - Νεκταρινιά):** Ψιδίο, βοτρυτς: 100 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) ή 70-100 κ.εκ/100 Lt ψεκ. υγρού όταν οι μειονομμένοι ανθοφόροι οφθαλμοί ξεχειλίζουν αλλά είναι ακόμα κλειστοί με τα πράσινα μέρη τους ελαφρώς ανοιχτά έως που τα φρούτα έχουν φθάσει περίπου το 90% του τελικού τους μεγέθους σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μονίλια: 100 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) ή 70-100 κ.εκ/100 Lt ψεκ. υγρού με εφαρμογή για προστασία των ώριμων καρπών πριν από τη συγκομιδή. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 100-150. **Αμπέλι** (Επταρηνία): 40-100. **Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό:** Πεπόνι (Υ), καρπούζι (Υ), Κολοκύθα (Υ): Ψιδίο, βοτρυτς, κλαδοσπορία, σκληρωτίτινα: 50 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 κ.εκ/100 Lt ψεκ. υγρού, από το άνοιγμα των πρώτων ανθέων στο κύριο στέλεχος μέχρι που πλήρως ώριμα φύλλα έχουν το τυπικό χρώμα ωριμότητας. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 50-100. **Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό:** αγγούρι (Υ+Θ), αγγουράκι (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ+Θ): Ψιδίο, βοτρυτς, κλαδοσπορία, σκληρωτίτινα: 50 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 κ.εκ/100 Lt ψεκ. υγρού, από το άνοιγμα των πρώτων ανθέων στο κύριο στέλεχος μέχρι που πλήρως ώριμα φρούτα έχουν το τυπικό χρώμα ωριμότητας. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 50-100. **Τομάτα (Υ+Θ), Μελιτζάνα (Υ+Θ):** Ψιδίο: 50 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) ή 50-100 κ.εκ/100 Lt ψεκ. υγρού, από το άνοιγμα των πρώτων ανθέων στο κύριο στέλεχος μέχρι που πλήρως ώριμα φρούτα έχουν το τυπικό χρώμα ωριμότητας. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 50-100. **Σπαράγγι:** Σκωρίαση, στεμφύλιο, ιδίο: 50 κ.εκ/στρέμμα (μέγιστο) ή 50-60 κ.εκ/100 Lt ψεκ. υγρού με εφαρμογές μετά τη συγκομιδή και στην πλήρη ανάπτυξη του υπέργειου μέρους. **Όγκος ψεκ υγρού Lt/στρέμμα:** 80-100.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Χρήση του ALTIS 25 EC μόνο προληπτικά και σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα κατά προτίμηση επαφής ή μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν στην ομάδα των DMIs ή δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα με εκείνα της ομάδας των DMIs, στην οποία ανήκει και το tebuconazole.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου στο ζώον στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Η είσοδος στις ψεκασθείσες καλλιέργειες γίνεται αφού στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα τους. Σε περίπτωση διάλυμα ενωρίτερα τα ενδύματα πρέπει να καλύπτονται τα χέρια και τα πόδια.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επμβάσεων σε ημέρες: Στάρι, Σικάλη, Βρώμη, Τριτκάλες, Κριθάρι: 2/15. Χειμερινή ελαιοκράμβη (φθινοπωρινές εφαρμογές): Μηλοειδή, Πυρροσπορία: 1. Χειμερινή ελαιοκράμβη (εαρινές εφαρμογές), Εαρινή ελαιοκράμβη: 2/14. Αμπέλι: 3/10. Κολοκυνθοειδή με/χωρίς βρώσιμο φλοιό, Τομάτα, μελιτζάνα, σπαράγγι: 3/7.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Στάρι, Σικάλη, Βρώμη, Τριτκάλες, Κριθάρι: 35. Χειμερινή ελαιοκράμβη (φθινοπωρινές - Εαρινές εφαρμογές) - Εαρινή ελαιοκράμβη (εαρινές εφαρμογές): Καθορίζεται από τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος, Μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, αμπέλι: 14. Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Πεπόνι, καρπούζι, κολοκύθα: 7. Τομάτα, μελιτζάνα, αγγούρι, αγγουράκι, κολοκύθι: 3. Σπαράγγι: Μη εφαρμοσμένο (εφαρμόζεται μετά τη συγκομιδή).