Caldera® 70WG

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση για το φουζικλάδιο

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

dithianon:	70% (β/β)
Βοηθητικές ουσίες:	29.30 % (β/β)

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

500gr

Καθ. Βάρος: 500gr

Αρ. Εγκ. Κυκλ.: 60873/26-6-2019

6R02/06-26

Κάτοχος της άδειας: GLOBACHEM N.V.
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Βέλγιο

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί – Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834, E-mail: info@sipcam.gr

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

SIPCAM

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη. Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από το χώρο εργασίας. Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά τη διάρκεια της εφαρμογής. Επιπλέον αυτών, φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια ανάμιξης/φόρτωσης. Σε περίπτωση επανεισόδου στις ψεκασμένες καλλιέργειες, φοράτε μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο. Συνιστάται η χρήση γαντιών.
Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Ξεπλύντε το στόμα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΓΕΝΙΚΑ: Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατό). ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μετακινείστε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και κρατείστε τον σε ανάπαυση. Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε ιατρική συμβουλή.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης*».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς τηρείται αψέκαστη ζώνη προστασίας **40 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα εκ των οποίων τα 10 μέτρα να είναι φυτική ζώνη ανάσχεσης.



UFI: 0H00-50PG-R00N-TMAF

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
• Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. • Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. • Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ –ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Μηλιά, Αχλαδιά (Φουζικλάδιο): Δόση 50 γρ./στρ. με 50 γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκ. υγρού: 100 λίτρα/στρ. Εφαρμογές μετά το στάδιο της πράσινης κορυφής μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν το 70% του τελικού μεγέθους (BBCH 09- 77) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
Ροδακινιά (Χρήση ήσσονος σημασίας: Κλαδοσπορίωση*): Δόση 50-75 γρ./στρ. με 50 γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. **Οι ψεκασμοί ξεκινούν κατά την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, όταν οι καρποί αρχίζουν να αλλάζουν χρώμα. BBCH 53-81**
Κερασιά* Χρήση ήσσονος σημασίας (Κλαδοσπορίωση): Δόση 50-75 γρ./στρ. με 50 γρ./100 λίτρα νερό. Όγκος ψεκ. υγρού: 100-150 λίτρα/στρ. **Οι ψεκασμοί ξεκινούν κατά την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, όταν οι καρποί αρχίζουν να αλλάζουν χρώμα. BBCH 53-81**
Παρατηρήσεις:
1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».
Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες): Μηλιά, Αχλαδιά: 6/7, Ροδακινιά, Κερασιά: 3/7.
Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Μηλιά, Αχλαδιά: 42 ημέρες. **Ροδακινιά-Νεκταρινιά:** 35 ημέρες, **Κερασιά:** 21 ημέρες.
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής.
Συνδυαστικότητα: –
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Πλύνετε καλά όλα τα μέρη του ψεκαστικού μετά τη χρήση τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: για το φυτοπροστατευτικό προϊόν: αποτέφρωση σε υψηλές θερμοκρασίες σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις. Τα κενά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του όταν αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε επί της συσκευασίας
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΕΣΥΦ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ