

ΠΡΟΣΟΧΗ
- **Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.**
- **Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.**

UFI: 10DA-7ATQ-PT3A-E3U9

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
«Φοράτε κατάλληλη, ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».
«Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε γάντια, μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο».
«Για την προστασία των περιοίκων και των κατοίκων να αφήσετε μία αψέκαστη ζώνη ασφαλείας προστασίας 5 μέτρων με ταυτόχρονη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50 %».
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
Γενικές πληροφορίες: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και απορρίψτε τα με ασφάλεια.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν απαιτείται, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό. Συμβουλευτείτε γιατρό εάν τα συμπτώματα επιμένουν. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων, μεταφέρετε και τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή (πλάγια) θέση για μεταφορά.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με νερό και σαπούνι και στη συνέχεια ξεπλύνετε με νερό.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Πλύνετε τα μάτια αμέσως για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό, μέχρι να εξαφανιστούν τα συμπτώματα και μετά με κατάλληλο οφθαλμικό διάλυμα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση σοβαρού τραυματισμού, μεταφερθείτε αμέσως σε νοσοκομείο.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως γιατρό. Ξεπλύνετε το στόμα χωρίς να καταπιείτε. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 2107793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ. (Να μη καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών
να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης από τα επιφανειακά ύδατα ως εξής:
- Ελαιοκράμβη: 20 μέτρα σε πρώιμες εφαρμογές - στην έναρξη επιμήκυνσης των βλαστών.
- Ελαιοκράμβη: 10 μέτρα σε όψιμες εφαρμογές μέχρι το 10% των λοβών να έχουν φτάσει στο τελικό τους μέγεθος.
- Αμυγδαλιά: 10 μέτρα στην περίπτωση μονής εφαρμογής - στην έναρξη ανάπτυξης ανθοφόρων οφθαλμών.
- Αμυγδαλιά: 20 μέτρα από έναρξη ανάπτυξης ανθοφόρων οφθαλμών (2 εφαρμογές) έως και την αρχή σχισίματος του περικαρπίου.
- Σιτάρι, τριτικάλε, σίκαλη, κριθάρι, ζαχαρότευτλα, φρέσκα μπιζέλια χωρίς λοβό, φρέσκα φασόλια χωρίς λοβό, φρέσκο ρεβίθι χωρίς λοβό, όσπρια (φασόλι, μπιζέλι, ρεβίθι): 20 μέτρα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεχθεί η συνδυαστικότητά του με άλλα σκευάσματα.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ:
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: **Βλέπε Φιάλη**

ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Cortina®

Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

prothioconazole	40 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες	64.87 % β/β

Περιεχόμενο:
1 Lt

Κάτοχος της άδειας:
SIPCAM OXON SPA
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Ιταλία

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):
61166/11.06.2024

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κων/νου 32, 19-100 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834, E-mail: info@sipcam.gr

GR03.106-26

SIPCAM

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

1Lt

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Το prothioconazole ανήκει στην ομάδα των DMIs και σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors-DMIs). Παρουσιάζει πολύ καλή διασυστηματική κίνηση στο φυτό μέσω των αγγείων του ξύλου (ακροπεταλική διασυστηματική κίνηση) προς τα νεαρά αναπτυσσόμενα όργανα..
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.
ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:
Πεδίο Εφαρμογής- Στόχος- Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:
Χειμερινό και Ανοιξιάτικο Σιτάρι μαλακό/σκληρό, Σίκαλη (Σεπτορίωση, Φουζαρίωση, Σκωρίαση): Δόση: 40-50 κ.εκ./στρ. Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι το τέλος της άνθησης με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 29-69).
Χειμερινό και Ανοιξιάτικο Κριθάρι (Ελμινθοσπορίωση/ Δικτυωτή κηλίδωση, Σκωρίαση): Δόση: 40-50 κ.εκ./στρ. Από το στάδιο του καλαμώματος μέχρι την έναρξη της άνθησης με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 29-61).
Ελαιοκράμβη (Σκληρωτίνια): Δόση: 35-45 κ.εκ./στρ. Από την έναρξη επιμήκυνσης των βλαστών μέχρι το 10% των λοβών να έχουν φτάσει στο τελικό τουςμέγεθος, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 30- 71).
Ζαχαρότευτλα (Κερκόσπορα): Δόση: 30-40 κ.εκ./στρ. Όταν το φύλλωμα καλύπτει το 90% του εδάφους μέχρι το ρίζωμα να φθάσει στο μέγεθος συγκομιδής με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και επανάληψη ανάλογα με την ένταση της προσβολής (BBCH 39-49).
Φρέσκα Μπιζέλια χωρίς λοβό, Φρέσκα Φασόλια χωρίς λοβό (Ασκοχύτωση, Σκωρίαση): Δόση: 30-40 κ.εκ./στρ. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως το τέλος της άνθησης, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 51-69).
Όσπρια: Μπιζέλι, Φασόλι (Ασκοχύτωση, Σκωρίαση): Δόση: 30-40 κ.εκ./στρ. Από την εμφάνιση των πρώτων ανθέων έως το τέλος της άνθησης, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων(BBCH 51-69).
Αμυγδαλιά (Πολυστίγμωση): Δόση: 40 κ.εκ./στρ. Από την έναρξη ανάπτυξης ανθοφόρων οφθαλμών έως και την αρχή σχισίματος του περικαρπίου, με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων (BBCH 51-85).
Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: Αμυγδαλιά: 50-150, Λοιπές καλλιέργειες: 20-60
Μεγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: Χειμερινό: Σιτάρι μαλακό, Σιτάρι σκληρό, Σίκαλη, Ανοιξιάτικο: Σιτάρι μαλακό, Σιτάρι σκληρό, Σίκαλη, Χειμερινό και Ανοιξιάτικο Κριθάρι, Ελαιοκράμβη, Ζαχαρότευτλα, Φρέσκα Μπιζέλια χωρίς λοβό, Φρέσκα Φασόλια χωρίς λοβό, Όσπρια (Φασόλια, Μπιζέλια): **2/14**, Αμυγδαλιά: **2/7**
Παρατηρήσεις:
1. Η χρήση στο Χειμερινό και Ανοιξιάτικο Σιτάρι (μαλακό και σκληρό) περιλαμβάνει και το Χειμερινό και Ανοιξιάτικο Τριτικάλε.
2. Η χρήση στο Μαλακό Σιτάρι περιλαμβάνει και το Σίτο Σπέλτα, Μονόκοκκο Σιτάρι, Δίκοκκο Σιτάρι και το Tritordeum .
3. Η χρήση στα Φρέσκα Μπιζέλια χωρίς λοβό περιλαμβάνει και τα Φρέσκα Ρεβίθια χωρίς λοβό.
4. Η χρήση στα Μπιζέλια περιλαμβάνει και τα Ρεβίθια στα όσπρια.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Ελαιοκράμβη: **50**, Σιτάρι (μαλακό, σκληρό), Μονόκοκκο Σιτάρι, Δίκοκκο Σιτάρι, Σιτάρι σπέλτα, Τριτικάλε,Tritordeum, Σίκαλη, Κριθάρι: **35**, Ζαχαρότευτλα: **28**, Όσπρια: Φασόλι, Μπιζέλι, Ρεβίθι: **21**, Φρέσκα Μπιζέλια χωρίς λοβό, Φρέσκα Φασόλια χωρίς λοβό, Φρέσκο ρεβίθι χωρίς λοβό: **14**, Αμυγδαλιά: **3**.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:
-Μην χρησιμοποιείται παράγωγα της καλλιέργειας της ελαιοκράμβης για ζωοτροφή.

Διαχείριση ανθεκτικότητας
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική prothioconazole, η οποία ανήκει στην **ομάδα 3** κατά FRAC. Συνιστάται:
- η εναλλαγή με μυκητοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας,
- σε προγράμματα ψεκασμών να μην πραγματοποιούνται διαδοχικές εφαρμογές με το σκεύασμα.
- να εφαρμόζετε το σκεύασμα προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και να αποφεύγονται θεραπευτικές εφαρμογές.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στον αγρό πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό .
Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.