

Grecale SC



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ



- Προστατευτική και θεραπευτική δράση
- Ευκολία στη χρήση
- Ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση του περονόσπορου στην πατάτα

- Εφαρμόζεται από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης της καλλιέργειας μέχρι λίγο πριν τη συγκομιδή.
- Μεγάλη ευελιξία στο χρόνο εφαρμογής, έως και 6 φορές με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες.
- Ως μίγμα δύο δραστικών ουσιών μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόση σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγ. αριθμός επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	50-60	75-100	20-60	Εφαρμογές από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος μεγαλύτερο από 5 εκ., εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη του παθογόνου, μέχρι την ανάπτυξη των καρπών (BBCH 21-81)	6 / με μεσοδιάστημα 7-10 ημέρες

Τελευταία επέμβαση πριν από τη συγκομιδή

Πατάτα: 7 ημέρες



Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
e-mail: info@sipcam.gr | www.sipcam.gr

Κάτοχος Άδειας	Sipcam Oxon S.p.A.
Σύνθεση	cymoxanil 20 % + fluazinam 30 % β/ο
Μορφή σκευάσματος	Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Αριθμός έγκρισης	60693/03.07.18

Προσοχή στις οδηγίες χρήσης: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.