

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Τοπικά δισυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Δρα διαλύοντας το λιπώκο στρώμα της μεμβράνης των κυττάρων του μύκητα με συνέπεια την αφυδάτωσή τους και τη νέκρωση του μύκητα.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως με χρήση φερόμενα ή συρόμενα ψεκαστικά, εξοπλισμένα με αυλούς ψεκασμού (μάνικες) ή με νεφελοποιηστές ή με ψεκαστήρα πλάτης.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Εμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος, αναδύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. **Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση.**

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής- Στόχος- Δόσεις σκευάσματος- Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:

Μηλιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Ιαπωνική μουσμουλιά (Φουκικλάδιο): 132 κ.εκ./στρ. με 88-330 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) έως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή. **Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.:** 40-150.

Αχλαδιά (Φουκικλάδιο, Στεπτορίωση, Στεμφύλιο): 132 κ.εκ./στρ. με 88-330 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή - BBCH 01) έως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή.

Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 40-150.

Ροδακινιά (Εξώσκαος, Φαιά σήψη): 176 κ.εκ./στρ. με 118-252 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο) ή Από τη διόγκωση των οφθαλμών μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 01-69).

Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 70-150.

Κερασιά (Εξώσκαος, Φαιά σήψη): 176 κ.εκ./στρ. με 176-252 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Αργότερα από το 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο) ή Από τη διόγκωση των οφθαλμών μέχρι την πτώση των πετάλων (BBCH 01-69).

Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 70-100.

Ελιά (Κυκλοκόνο, Πλοισπόριο): 132-176 κ.εκ./στρ. με 132-176 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης (BBCH 11-69) ή Φθινόπωρο-χειμώνα έως την έναρξη πτώσης των καρπών (BBCH 89).

Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 100.

Αμυγδαλιά (Εξώσκαος, Πολυστιγμάτωση): 118-132 κ.εκ./στρ. με 79-264 κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού. Από την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών έως ότου οι καρποί έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού τους μεγέθους (BBCH 01-75).

Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.: 50-150.

Μεν. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες: 1 εφαρμογή σε όλες τις καλλιέργειες.

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη Ροδακινιά (PRNPS) περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά (PRNPN).

2. Η χρήση στη Κερασιά περιλαμβάνει (PRNAV) και τη Βυσσινιά (PRNCE).

3. Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της ανθοφορίας στις καλλιέργειες: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βυσσινιά και Αμυγδαλιά. **Τελειάτα επέμβαση πριν την συγκομιδή:** Ροδακινιά, Νεκταρινιά: **75 ημέρες**, Μηλιά, Αχλαδιά, Μούσμουλια, Κυδωνιά, Ιαπωνικά μούσμουλια: **60 ημέρες**, Ελιά, Κερασιά, Βυσσινιά: **22 ημέρες**, Αμυγδαλιά: **Μη εφαρμόσιμο**.

Ειδικές συνθήκες γεωργικής, φυτογείας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστηρική ουσία dodine, η οποία ανήκει στην ομάδα **U12** κατά FRAC.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Συνιστάται η εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

Ελιά:

- Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φύλλα.

Μηλοειδή: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Ιαπωνική μουσμουλιά:

Εργασίες αναζήτησης, προσέγγισης, συγκομιδής: **35 ημέρες**.

Εργασίες συντήρησης/αραιώματος: **35 ημέρες**.

Πυρηνόκαρπα: Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βυσσινιά:

Εργασίες αναζήτησης, προσέγγισης, συγκομιδής: **22 ημέρες**.

Εργασίες συντήρησης/αραιώματος: **47 ημέρες**.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο προστατευμένο από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

ENODOX®

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ,
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ

Συμπυκνωμένο ελαιώρημα (SC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Dodine

Βοηθητικές ουσίες:

51 % β/ο

49.3 % β/β

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Περιεχόμενο: 1 Lt

Αρ. Άδειας
Διόθεσης στην
Αγορά (ΑΔΔΑ):
61143/26.01.2024

Υπεύθυνος για την τελική διόθεση στην
αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλείας Κων/νου 32, 19400 Καρπύσι
Τηλ: 210 5223 834, E-mail: info@sipcam.gr

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM INAGRA S.A
c/ Profesor Beltrán Bágüena 5, 46009
Valencia, Ispania

1Lt



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ,
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: K550-80PS-T00P-HY7Q

ΔΗΛΩΣΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια και το πρόσωπο κατά την ανάμιξη και φόρτωση.
Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την εφαρμογή του σκευάσματος.»
«Σε περίπτωση επανεξόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρομάνικο πουκάμισο και μακρό παντελόνι και γάντια.»
«Χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την προστασία των κατοίκων ή των περιμευόμενων.»
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Αν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
(Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λειοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους).

Στο 60 το μίγματος περιέχονται συστατικά μη πλήρως γνωστής οξείας δερματικής και αναπνευστικής τοξικότητας.
Επικινδυνότητα για τις μέλισσες: Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήνετε μίαν αψέκαστη ζώνη προστασίας.
Ελιά:
5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή εναλλακτικά χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.
Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βυσσινιά και Αμυγδαλιά:
15 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή **10 μέτρων** σε συνδυασμό ταυτόχρονα με ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος. Τέλος, ξεπλύνετε με 3% υδατικό διάλυμα ακετόνης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Τα κενά υλικά συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται από πίεση ή γίνεται triplo ξεπλύμα (τα νερά που ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενης με τρύπηση, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Συνδυαστικότητα: -

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. Παρασκευής:

