



ENODOX® SC

Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ!

Εγγυημένη σύνθεση:
dodine 51% β/ο

Τοπικά διασθηματικό μυκητοκτόνο
με προληπτική, θεραπευτική
και εξοντωτική δράση



Προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.



- Τοπικά διασυστηματικό.
- Δρα διαλύοντας το λιπιδικό στρώμα της μεμβράνης των κυττάρων του μύκητα με συνέπεια την αφυδάτωσή τους και τη νέκρωση του μύκητα.
- Ανήκει στην ομάδα U12 κατά FRAC, γουανιδίνες.
- Χρήσιμο εργαλείο για διαχείριση ανθεκτικότητας




*Venturia
pyrina*



*Venturia
inaequalis*




*Monilinia
sp.*



*Glomerella
cingulata*



*Venturia
oleagina*



*Taphrina
deformans*



*Polystigma
ochraceum*

Φάσμα δράσης

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα νερό	Όγκος ψεκ. υγρού σε λίτρα/στρ.		
Μηλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	132	88-330	40-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή) έως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή	1
Αχλαδιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>), Σεπτορίωση (<i>Mycosphaerella pyri</i>), Στεμφύλιο (<i>Stemphylium vesicarium</i>)	132	88-330	40-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή) έως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή	1
Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Ιαπωνική μουσμουλιά	Φουζικλάδιο (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	132	88-330	40-150	Από τη διόγκωση των οφθαλμών (πράσινη κορυφή) έως 60 ημέρες πριν τη συγκομιδή	1
Ροδακινιά	Εξώασκος (<i>Taphrina sp.</i>), Φαία σήψη (<i>Monilinia sp.</i>)	176	118-252	70-150	Αργότερα από 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο) ή από τη διόγκωση των οφθαλμών μέχρι την πτώση των πετάλων	1
Κερασιά	Εξώασκος <i>Taphrina sp.</i> , Φαία σήψη <i>Monilinia sp.</i>	176	176-252	70-100	Αργότερα από 50% της πτώσης των φύλλων μέχρι και μετά την πτώση τους (φθινόπωρο) ή από τη διόγκωση των οφθαλμών μέχρι την πτώση των πετάλων	1
Ελιά	Κυκλοκόνιο (<i>Venturia oleagina</i>), Γλοιοσπόριο (<i>Glomerella cingulata</i> / <i>Gloeosporium oleae</i> , <i>Colletotrichum sp.</i>)	132-176	132-176	100	Από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων μέχρι το τέλος της άνθησης ή Φθινόπωρο-χειμώνα έως την έναρξη πτώσης των καρπών	1
Αμυγδαλιά	Εξώασκος (<i>Taphrina sp.</i>), Πολυστιγμάτωση (<i>Polystigma ochraceum</i>)	118-132	79-264	50-150	Από την έναρξη διόγκωσης των οφθαλμών έως ότου οι καρποί έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού τους μεγέθους.	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χρήση στη Ροδακινιά περιλαμβάνει και τη Νεκταρινιά.
2. Η χρήση στην Κερασιά περιλαμβάνει και τη Βυσσινιά.
3. Να μην χρησιμοποιείται κατά την περίοδο της ανθοφορίας στις καλλιέργειες: Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά, Κυδωνιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Κερασιά, Βυσσινιά και Αμυγδαλιά.



Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Ροδακινιά, Νεκταρινιά: **75 Ημέρες**

Μηλιά, Αχλαδιά, Μουσμουλιά,
Κυδωνιά, Ιαπωνική μουσμουλιά: **60 Ημέρες**

Ελιά, Κερασιά, Βυσσινιά: **22 Ημέρες**

Αμυγδαλιά: **Μη εφαρμόσιμο**



Κάτοχος της άδειας: Sipcam Inagra S.A.

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:



SIPCAM
HELLAS

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.

e-mail: info@sipcam.gr | www.sipcam.gr



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.