



Τρόπος δράσης: Το **cymoxanil** συνεισφέρει στο σκεύασμα διευρύνοντας το φάσμα δράσης του ως διασυστηματικό και μυκητοκτόνο επαφής με προληπτική και θεραπευτική δράση. Επιπλέον δρα ανασταλτικά στη δημιουργία σπορίων από τον μύκητα. Το **zoxamide** είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο επαφής το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται πριν την εγκατάσταση της ασθένειας. Δρα εξειδικευμένα εναντίον των ωομυκήτων εμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση σταματώντας την ανάπτυξη των μυκήτων και τη βλάστηση των σπορίων.

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμογές με ψεκασμούς φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος αναδεύοντας συνεχώς. Συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση ακόμα και κατά την εφαρμογή.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής
		γρ.στρ. (max)	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ.	
Πατάτα	Περωνόσπορος	45	20-100	Εφαρμογή από το στάδιο της έκπτυξης του 1 ^{ου} πλευρικού βλαστού (5εκ.) και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 ημέρες με καλό λούσιμο των φυτών.
Τομάτα, Μελιτζάνα	Περωνόσπορος	40-45	50-80	Εφαρμογή από το στάδιο της έκπτυξης του 3 ^{ου} φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 10 ημέρες κατ'ελάχιστο, με καλό λούσιμο των φυτών.
Αμπέλι (επιτραπέζιο - οινοποιήσιμο)	Περωνόσπορος	35-40	20-100	Εφαρμογή από το στάδιο της έκπτυξης του 4 ^{ου} φύλλου και μετά. Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 ημέρες με καλό λούσιμο των φυτών.
Τομάτα *(Θ) (χρήση ήσσονος σημασίας)	Στεμφύλιο	30	80	Εφαρμογή από το στάδιο έκπτυξης του 3 ^{ου} φύλλου και μετά (BBCH 13-89). Ψεκασμοί φυλλώματος κάθε 7-10 ημέρες με καλό λούσιμο των φυτών.

Παρατηρήσεις:

- Καλό είναι να ακολουθούνται οι συστάσεις των Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται.
 - Αυξάνετε τον όγκο του ψεκαστικού καθώς η καλλιέργεια αυξάνει σε φυλλική επιφάνεια.
 - Προσαρμόστε τις δόσεις ανάλογα, έτσι ώστε να μην ξεπεραστεί η μέγιστη δόση ανά στρέμμα.
- * Για την ανωτέρω χρήση ήσσονος σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της τομάτας στο στεμφύλιο από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 3

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Για την αποφυγή ανάπτυξης φαινομένων ανθεκτικότητας χρησιμοποιείστε το προϊόν σύμφωνα με πρόγραμμα επεμβάσεων στο οποίο το LIETO WG θα εναλλάσσεται με μυκητοκτόνα διαφορετικού τρόπου δράσης κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:

- Η είσοδος των ανθρώπων να αποφεύγεται, αν δεν έχει πλήρως στεγνώσει το φύλλωμα των καλλιεργειών.
- Όσο εισέρχονται για εργασία σε καλλιέργειες αμπέλου μετά τον ψεκασμό, να φορούν υποχρεωτικά προστατευτικά γάντια.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ :
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ :
Βλέπε επί της συσκευασίας



Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις: Πατάτες: 7 ημέρες, Τομάτες (Υ+Θ), Μελιτζάνες (Υ) : 3 ημέρες, Σταφύλια (Επιτραπέζια & Οινοποιήσιμα): 28 ημέρες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Φυλάξτε το σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Προστατεύστε το από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (παγετό και >40° C ζέστη). Στις παραπάνω συνθήκες το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το δοχείο του ψεκαστικού. Ξεπλύνετε τα μηχανήματα εξωτερικά με νερό. Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου του ψεκαστικού με καθαρό νερό συμπεριλαμβανομένων των σωληνώσεων και των μπλεκ. Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο με καθαρό νερό κατά το ήμισυ αναδέυστε και αδειάστε τελείως. Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να απομακρυνθούν τα ορατά υπολείμματα και ο αφρός. Φίλτρα και μπλεκ αφαιρούνται και καθαρίζονται ξεχωριστά με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Καύση σε εγκεκριμένες για το σκοπό αυτό εγκαταστάσεις, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Οι κενές συσκευασίες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συνδυαστικότητα: --



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ ΣΕ ΑΜΠΕΛΙΑ, ΠΑΤΑΤΕΣ, ΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

cymoxanil	33% β/β
zoxamide	33% β/β
Βοηθητικές ουσίες	34 % β/β

GR06/02-24

Περιεχόμενο: 450 gr

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (ΑΑΔΑ): 60432/2-12-2014

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Italia
Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε. Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορίνθι

Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr

Παρασκευαστής σκευάσματος: SIPCAM OXON S.p.A.



ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

450gr



UFI: R96W-CT12-V30Y-JGVG

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
- Υποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα. Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα, θύμος αδένας), ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους επιδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με τους κανονισμούς επικίνδυνων αποβλήτων. Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Μη καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη μόλυνση του αγροτικού περιβάλλοντος και των δρόμων). Για όλες τις καλλιέργειες του φάσματος δράσης: Αφήστε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά νερά. Σε περίπτωση χρήσης ακροφυσίων μείωσης αερομεταφοράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%, αφήστε μία αφέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων. Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική θεραπεία. ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777