

Vitene® *Triplo R*



VITENE® TRIPLO R WG

ΤΡΙΠΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!

Εγγυημένη σύνθεση:
cytochanil 2,85% β/β +
fosetyl 30% β/β +
copper oxochloride
(σε χαλκό) 16% β/β

Η καινοτομία στη βάση
της παράδοσης!

Μυκητοκτόνο με προστατευτική και
θεραπευτική δράση για την καταπολέμηση
του περονόσπορου και της αλτερνάριας
σε πατάτα, τομάτα και αμπέλι



SIPCAM
HELLAS



Vitene®
Triplo R

ΑΑΔΑ: 60438/31-12-2014

Μίγμα 3 δραστικών ουσιών:

Cymoxanil 2,85% β/β +
Fosetyl 30% β/β +
Copper oxychloride
(σε χαλκό) 16% β/β

1 CYMOXANIL


- Έχει προστατευτική και θεραπευτική δράση, εναντίον ωομυκήτων¹.
- Τοπικά διασυστηματικό¹.
- Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση του DNA¹.
- Ανήκει στην ομάδα δράσης Group 27 κατά FRAC.

2 FOSETYL

- Έχει προστατευτική δράση και θεραπευτική δράση².
- Διασυστηματικό με αποπλαστική και συμπλαστική κίνηση¹.
- Διπλός τρόπος δράσης, άμεση τοξική δράση και επαγωγή των μηχανισμών άμυνας του φυτού¹.
- Ανήκει στην ομάδα δράσης Group P 07 κατά FRAC.

3 ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

- Έχει προστατευτική δράση εναντίον μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών².
- Ανήκει στην ομάδα δράσης Group M 01.



Πλεονεκτήματα συνδυασμού των δ.ο.

- ✓ Αποτελεσματικός έλεγχος του περονόσπορου και της αλτερνάριας στις εγκεκριμένες καλλιέργειες.
- ✓ Διαχείριση ανθεκτικότητας λόγω του διαφορετικού τρόπου δράσης των δραστικών ουσιών.
- ✓ Προστατευτική και θεραπευτική δράση.
- ✓ Κάλυψη της νέας βλάστησης που αναπτύσσεται μετά τον ψεκασμό.



Φάσμα Δράσης

Καλλιέργεια	Στόχος	Δόση γρ/στρ. (max)	Όγκος ψεκαστικού υγρού L/στρ.	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Αμπέλι (επιτραπέζιο-οινοποιήσιμο)	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	400-450	40-100	Μετά το πλήρες ξεδίπλωμα του 1 ^{ου} φύλλου. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10-12 ημέρες μέχρι την αρχή του γυαλίσματος.	3-4 ανά 10 με 12 ημέρες
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>), Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>)		60-80	Με το ξεδίπλωμα του 1 ^{ου} φύλλου του κύριου στελέχους (> 4 cm). Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10-12 ημέρες μέχρι το τέλος της ανθοφορίας της πρώτης ταξιανθίας.	4 ανά 10 με 12 ημέρες
Τομάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>), Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>)			Όταν το 1 ^ο αληθινό φύλλο στον κύριο βλαστό είναι τελείως ξετυλιγμένο. Ο ψεκασμός επαναλαμβάνεται ανά 10-12 ημέρες μέχρις ότου το 10% των καρπών παρουσιάζουν ώριμο χρώμα.	

Βιβλιογραφία

- 1 - Ζιώγας Β., Μαρκόγλου Α., Γεωργική Φαρμακολογία, Αθήνα 2007, σελ. 167, 228
2 - Παπαδοπούλου-Μουρκίδου Ε., Γεωργικά Φάρμακα, Εκδόσεις Μέθεξς 2008, σελ. 303, 395

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή


Καλλιέργεια	Ημέρες
Αμπέλι	40
Τομάτα	20
Πατάτα	20



Vitene® Triplo R

- 1 ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ** και αποτελεσματικό μυκητοκτόνο
- 2 Ευέλικτο** στους χρόνους εφαρμογής
- 3 Απαραίτητος** σύμμαχος του παραγωγού

ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2025



SIPCAM
HELLAS

Υπεύθυνος επικοινωνίας και διάθεσης στην αγορά:

SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΕ

e-mail: info@sipcam.gr

www.sipcam.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο φυλλάδιο έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες επί της ετικέτας οδηγίες χρήσης.