

Axion Combi

ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ (ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ).

Μίγμα εναιωρήματος μικροκαψουλών και συμπυκνωμένου αιωρήματος (ΖC)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Terbuthylazine	12.50 % (β/ο)
Pendimethalin	25.00 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες:	65.09 % (β/β)

Περιεχόμενο:
5 L

Αρ. εγκρ. κυκλ.:
70195 / 30.01.2017

Κάτοχος της άδειας - Παρασκευαστής:
SIPCAM OXON SpA,
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italy

Υπεύθυνος επικοινωνίας και τελικής διάθεσης στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.

Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400

Τηλ.: 210 5223834, Fax: 210 5223139, E-mail: info@sipcam.gr



ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

5L

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



Axion Combi

Τρόπος δράσης: Είναι μίγμα των δραστικών ουσιών terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των τριαζινών και pendimethalin που ανήκει στην ομάδα των δινιτροανιλινών. Η terbuthylazine απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μεταφέρεται στα φύλλα όπου παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση. Η pendimethalin παρεμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων στους μεριστωματικούς ιστούς.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με μπάρα ψεκασμού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά το σκεύασμα μέσα στη κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε την υπόλοιπη ποσότητα νερού συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΔΟΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια, δόση 400 κ.εκ./στρέμμα. **Βαμβάκι:** Ετήσια ζιζάνια (αγρωστώδη, πλατύφυλλα) και πολυετή (βέλιουρας, αγριάδα) σε δόση από 400 – 600 κ.εκ./στρέμμα. Μεγαλύτερες δόσεις για τα μετρίως ευαίσθητα* ζιζάνια (αγριάδα, αγριοβαμβάκι, βέλιουρα). **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** Για όλες τις καλλιέργειες 20-50 λίτρα/στρέμμα. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανα καλλιεργητική περίοδο: 1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό.

Παρατηρήσεις: 1. Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Καλαμπόκι: Πολύ Ευαίσθητα: *Polygonum aviculare* (Πολυκόμμι), *Polygonum convolvulus* (Πολύμυνο), *Portulaca oleracea* (Αντράκλα), *Veronica persicaria* (Βερνίκια). Ευαίσθητα: *Amaranthus retroflexus* (Τραχύ Βλήτο), *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Datura stramonium* (Τάτουλας), *Echinochloa crus galli* (Μουχρίτσα), *Polygonum persicaria* (Αγριοπιπεριά), *Setaria spp.* (Σετάρια), *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά), *Xanthium spp.* (Αγκάθι). Μετρίως ευαίσθητα: *Abutilon theophrasti* (Αγριοβαμβάκι), *Euphorbia prostrata*, *Heliotropium europaeum* (κοινό ηλιοτρόπιο), *Solanum physalifolium*. **Βαμβάκι:** Ευαίσθητα: *Amaranthus retroflexus* (Τραχύ Βλήτο), *Chenopodium album* (Λουβουδιά), *Datura stramonium* (Τάτουλας), *Polygonum persicaria* (Αγριοπιπεριά), *Portulaca oleracea* (Αντράκλα), *Solanum nigrum* (Αγριοτοματιά), *Xanthium strumarium* (Αγριομελίτζάνα), *Echinochloa crus galli* (Μουχρίτσα). * Μετρίως ευαίσθητα: *Abutilon theophrasti* (Αγριοβαμβάκι), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας). Για το *Cynodon dactylon* (Αγριάδα) εφαρμόζεται η δόση 600 κ.εκ./στρ. 2. Η δράση του AXION COMBI στις επιφανειακές εφαρμογές επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν αναμένεται βροχόπτωση εντός 2 εβδομάδων, συνιστάται ελαφρύ πότισμα 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή για την ενσωμάτωση – «ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου στο έδαφος.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας αραβοσίτου ή βαμβακιού, μπορεί να ξανασπαρεί άμεσα μόνο αραβόσιτος ή βαμβάκι αφού προηγηθεί άροση του εδάφους.
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μετά από βαθιά άροση (40 εκ.) και περίοδο αναμονής τουλάχιστον 10 μηνών από την εφαρμογή του προϊόντος.
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα στη φυλλική επιφάνεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει Pendimethalin και 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
- Ύποπο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

UFI: TW99-9SSF-V105-W5R0

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. • Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή. • Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια εντός 7 ημερών οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια. • Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Γενικές πληροφορίες: Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα στα οποία έπεσε ψεκαστικό υγρό. Κρατήστε τον ασθενή ζεστό, σε άνετη θέση άνετα και καλύψτε τον καλά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και καλέστε γιατρό για λόγους ασφαλείας. Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων βάλτε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια θέση για τη μεταφορά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για αρκετά λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ κατάποσης: Μην προκαλέσετε εμετό, καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμεινούν συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντιδότη: Ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»

ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbuthylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μία φυτική ζώνη απόσχισης 5 μέτρων ή μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του αραβοσίτου και μία αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για την καλλιέργεια του βαμβακιού.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Αραβόσιτος, Βαμβάκι: Δεν ορίζεται (προφυτρωτική εφαρμογή).

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο αφρός και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μακριά από πηγές θερμότητας άμεσου ηλιακού φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φωτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυνματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογυγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν προκαλείται φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις. Στο βαμβάκι, κάτω από δυσμενείς συνθήκες ανάπτυξης των φυτών μπορεί να εμφανισθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας χωρίς επίπτωση στην παραγωγή. Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες αραβοσίτου που προορίζονται για σποροπαραγωγή. Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι.

