

Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα μην εφαρμόζετε το προϊόν σε αμμώδη εδάφη στις καλλιέργειες ρυζιού, ροδι, λωτός, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, φουντούκι, φυτώρια σπαργάνων και αμπέλου.

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα-μη-στόχους να αφήσετε μια αφέαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

Για να προστατέψετε τα αυτά μη-στόχους να αφήσετε μίαν αφέαστη ζώνη ασφαλείας από τη μη γεωργική γη ως εξής:

-για τις καλλιέργειες βαμβάκι και ρύζι:

• 5 μέτρα σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75%, ή

• 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

- Για όλες τις άλλες καλλιέργειες: 5 μέτρα σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι όλη η αντλία απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφονται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. **Συνδυαστικότητα:**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

- Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες που προορίζονται για απορροπαγωγή ή πολυλασασμό.

- Η εφαρμογή του να γίνεται απουσία ανέμου.

- Μην ψεκάτε σε καλλιέργειες που βρίσκονται υπό συνθήκες στρες.

- Εάν αναμένεται βροχόπτωση μην ψεκάτε.

- Μην το εφαρμόζετε όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε συνθήκες στρες από ξηρασία ή χαμηλές θερμοκρασίες.

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική clethodim, η οποία ανήκει στην ομάδα 1 κατά HRAC.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή/και εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην οποία εφαρμόστηκε το ζιζανιοκτόνο, σε περίπτωση αναγκαστικής επανασποράς στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρουν δικτυληθδονες καλλιέργειες και ρύζι άμεσα ενώ για τα σιτηρά συνιστάται να γίνει ελαφρύ όργωμα πριν τη σπορά. Σε περίπτωση κατευθείαν σποράς συνιστάται περίοδος αναμονής τουλάχιστον 4 εβδομάδων.

- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα του, στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μακριά από χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες και απευθείας ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (χρόνια) από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής. Ο περιεκτικός διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής:



Brixton®

ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ
ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ ΖΙΖΑΝΙΑ

Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

clethodim

Βοηθητικές ουσίες:

18 % β/ο

79.72 % β/β

Περιεχόμενο:
1 L

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά (ΑΑΔΑ):
70505/03-II-2023

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.p.A.
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italia

Υπευθυνός για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλέως Κων/νου 32, 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834 - E-mail: info@sipcam.gr

1L



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ZIZANIOKTONO



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Περιέχει clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Περιέχει αρωματικούς υδρογονάνθρακες (C10), <1% naphthalene.

UFI: S2GG-QWCD-A10N-UXV8

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Φοράτε γάντια, φόρμα εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας ματιών και αναπνοής κατά τη φόρτωση, ανάμιξη και εφαρμογή του προϊόντος.

Να αφήνεται αφέαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων για την προστασία των κατοίκων ή των παραρτημάτων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, αν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον πάθοντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντιδοτό: Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

«Για να αποφεύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ
(Μην πλύνετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρώτες επιφάνειες και τους δρόμους).

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Εκλεκτικό, μεταφωτιστικό ζιζανιοκτόνο με διασυστηματική δράση ενάντια σε ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στα υπέργεια και υπογεία μέρη του φυτού, παρεμποδίζοντας την ανάπτυξή τους. Τα συμπτώματα είναι ορατά 10-20 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται, τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνονται. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων (παρεμποδίζοντας τον ενζύμου καρβοξυλάση του ακετυλο-συνενζύμου Α).

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος καθολικός ψεκασμός των ζιζανίων.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού/διαλύματος εφαρμογής: Γεμίζετε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινήστε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση μέχρι το τέλος του ψεκασμού. Εφαρμόστε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΓ. ΕΡ. ΕΦΑΡΜ. ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ / ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ:

Ρυζί: Για **ετήσια** και **πολυετή** ζιζάνια, μεταφωτιστικά των ζιζανίων- Προσπαρτικά της καλλιέργειας (BBCH 00): **Δόση:** 100-160 κ.εκ./στρ. [Μεγ. Αρ. εφαρ. ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Ελαιοκράμβη: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μεταφωτιστικά των ζιζανίων, πριν την εμφάνιση των πλάγιων βλαστών έως την έναρξη επιμήκυνσης του κύριου βλαστού της καλλιέργειας (BBCH 20-30). [Μεγ. Αρ.εφαρ. ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1

Ζαχαρότευτλα: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως το στάδιο κλεισίματος των γραμμών της καλλιέργειας (BBCH 12-39). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1 εφαρμογή για **ετήσια** ζιζάνια. [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1 εφαρμογή ανά 2 έτη για **πολυετή** ζιζάνια.

Φινόκιο (Μαραθόριζα): Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έκπτυξη του 6^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 12-16). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1 εφαρμογή ανά έτος.

Τομάτα, Μελιτζάνα: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως πριν την άθιση της καλλιέργειας. (BBCH 12-59). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Βαμβάκι: α) Για **ετήσια** ζιζάνια **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. β) Για Αγριάδα (*Cynodon dactylon*) **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο 2^{ου} φύλλου έως την πλήρη κάλυψη της καλλιέργειας (Περίπου 90% της κάλυψης των σειρών) (BBCH 12-49). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Ηλιανθος: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm, **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτισ-

τικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι να κλείσει το 30% της γραμμής της καλλιέργειας. (BBCH 12-33). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1. **Πατάτα:** Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm, **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης/ κάλυψης των σειρών της καλλιέργειας (BBCH 12-39). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Μηδική: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm, **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως ότου το προς συγκομιδή μέρος φθάσει στο τυπικό του μέγεθος της καλλιέργειας (BBCH 12-49). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Καρότο: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι το εδωδύμο τμήμα του φυτού να φτάσει στο 50% της τελικής της διαμέτρου (BBCH 12-45). [Μεγ. Αρ.εφαρ. ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1 εφαρμογή ανά έτος.

Αγκινάρα: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έναρξη της επιμήκυνσης του κύριου βλαστού της καλλιέργειας (BBCH 12-51). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1 εφαρμογή ανά έτος.

Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας έως ότου ο βολβός έχει φθάσει στο 50% του τελικού του μεγέθους (BBCH 12-45). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Αμπέλι: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των καρπών, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-79). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Ελιά: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-87). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 2/20.

Ροδιά, Λυτός, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνικά μούσμουλα, Βερικοκιά, Ροδακινιά, Δαμασκηλιά, Κερασιά: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρί-

μανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-87). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Πορτοκαλιά, Γκρεϊπ – φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Λιμεττία (Πράσινα λεμόνια): Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την πλήρη ωρίμανση του καρπού, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-89). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 2/20.

Ακτινίδα: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των καρπών, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-79). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Αμυγδαλιά: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-87). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 2/20.

Φουντουκιά: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-87). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Καλλωπιστικά: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Εφαρμογή ανάλογα με την ανάπτυξη των ζιζανίων. (BBCH 12-71). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1 εφαρμογή ανά έτος.

Σπαράγγι: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Εφαρμογή πριν από την εμφάνιση των εδωδύμων βλαστών ή μετά τη συγκομιδή. [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1 εφαρμογή ανά έτος.

Ραπάνια/Ραφανίδες, Χρένα, Γογγύλια, Κοκκινόγούλια: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου μέχρι η ρίζα να φτάσει στο 50% της τελικής διαμέτρου (BBCH 12-45). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1 εφαρμογή ανά έτος.

Φυτόριζα πορρώνων και αμπέλων: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφωτιστικά των ζιζανίων. Εφαρμογή ανάλογα με την ανάπτυξη των ζιζανίων επί των γραμμών φύτευσης με μέγιστη κάλυψη το 30% της επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-87). [Μεγ. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.:](#) 1.

Σουσάμι Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm, **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} φύλλου έως την πλήρη κάλυψη της καλλιέργειας (Περίπου 90% της κάλυψης των σειρών) (BBCH 12-49). Μεν. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.: 1.

Φιστικιά Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-133 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 133 κ.εκ./στρ. Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή μέχρι την έναρξη της ωρίμανσης, σε λωρίδες κάτω από την κόμη στο 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού (BBCH 00-87) Μεν. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.: 2/20.

Σέλερι Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100-140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως την έκπτυξη του 6^{ου} πραγματικού φύλλου της καλλιέργειας (BBCH 12-16) Μεν. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.: 1 εφαρμογή ανά έτος.

Σελινόριζα (ραπανοσέλινο), Γουλι Χρήση ήσσονος σημασίας: Για **ετήσια** ζιζάνια α) από 2-3 φύλλα έως και πριν το αδελφώμα: **Δόση:** 70 κ.εκ./στρ. β) από την αρχή έως το τέλος του αδελφώματος: **Δόση:** 100 – 140 κ.εκ./στρ. Για **πολυετή** ζιζάνια με επιθυμητό ύψος ζιζανίων 20-30 cm, **Δόση:** 140κ.εκ./στρ. Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο του 2^{ου} πραγματικού φύλλου έως το στάδιο κλεισίματος των γραμμών της καλλιέργειας (BBCH 12-39). Μεν. Αρ.εφαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.: Για **ετήσια** ζιζάνια: 1 εφαρμογή. Για **πολυετή** ζιζάνια: 1 εφαρμογή ανά 2 έτη.

Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): Για όλες τις καλλιέργειες: 15-40
Παρατηρήσεις:

1. Για το ρύζι η εφαρμογή να γίνεται σε στεγνά τηγάνια πριν μπει το νερό και με ήδη φυτρωμένα τα ζιζάνια. Μετά την εφαρμογή περιμένετε τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την εισαγωγή του νερού. Γεμίστε το τηγάνι με νερό για τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη σπορά του ρυζιού.
2. Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
3. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.
4. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει και την νεκταρινιά.
5. Κατά την χρήση του σκευάσματος στις ανωτέρω ετήσιες καλλιέργειες οι οποίες προορίζονται για **σποροπαραγωγή**, η τελευταία εφαρμογή να πραγματοποιείται πριν από το σχηματισμό των ανθοφόρων οφθαλμών.
6. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες σπαραγγιού, λωτού, ακτινιδίου, ροδιάς, ζαχαροτεύτλων και καλλωπιστικών φυτών. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα.
7. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σουσαμιού, φιστικιάς, σέλερι, σελινόριζας και γουλιού από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**
-Πατάτα, ζαχαρότευτλα, ηλιάνθος, μηδική, σουσάμι:
Ετήσια ζιζάνια

Πριν το αδελφώμα των ζιζανίων (δόση 70 κ.εκ/στρ)	Μετά το αδελφώμα των ζιζανίων (δόση 100 κ.εκ/στρ)
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Ήρα (<i>Lolium</i> sp.), Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp.)	Ευαίσθητα ζιζάνια: Βρώμος (<i>Bromus</i> sp.), Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.)	Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp.)

Πολυετή ζιζάνια (140 κ.εκ/στρ):
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Πολυετής Ήρα (*Lolium perenne*)

- Ελαιοκράμβη:
Ετήσια ζιζάνια

Πριν το αδελφώμα των ζιζανίων (δόση 70 κ.εκ/στρ)	Μετά το αδελφώμα των ζιζανίων (δόση 100 κ.εκ/στρ)
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Ήρα (<i>Lolium</i> sp.), Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp.)	Ευαίσθητα ζιζάνια: Βρώμος (<i>Bromus</i> sp.),Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.)	Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αλεπονουρά (<i>Alopecurus myosuroides</i>), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp.)

- Αγκινάρα, σπαράγγι, κρεμμύδι, σκόρδο, ασκαλώνια, καρότο, φινόκιο, τομάτα, μελιτζάνα, ραπανάκι/ραφανίδες, χρένα, γογγύλια, κοκκινόγούλα, καλλωπιστικά, σέλερι, σελινόριζα, γουλι:
Ετήσια ζιζάνια

Πριν το αδελφώμα (δόση 70 κ.εκ/στρ)	Μετά το αδελφώμα (δόση 100-140 κ.εκ/στρ)
Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.)	Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> spp.), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.)
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp.), Ήρα (<i>Lolium</i> sp.)	Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Ήρα (<i>Lolium</i> sp.)

Πολυετή ζιζάνια (140 κ.εκ/στρ):
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Τραχεία λειβαδοπά (Ροα *trivialis*), Πολυετής Ήρα (*Lolium perenne*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Φεστούκα (*Festuca* sp.)

- Αμπέλι, ελιά, εσπεριδοειδή, λωτός, ρόδι, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακρόδρυα, ακτινιδιά, φυτώρια οπωρώνων και αμπέλου:
Ετήσια ζιζάνια

Πριν το αδελφώμα (δόση 70 κ.εκ/στρ)	Μετά το αδελφώμα (δόση 100-133 κ.εκ/στρ)
Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> sp.), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.)	Ευαίσθητα ζιζάνια: Αγριοβρώμη (<i>Avena</i> spp.), Βρώμος (<i>Bromus</i> sp.), Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Ήρα (<i>Lolium</i> sp.), Σετάρια (<i>Setaria</i> sp.), Αγριοκριθαρο (<i>Hordeum</i> sp.)

Πολυετή ζιζάνια (δόση 133 κ.εκ/στρ):
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριάδα (*Cynodon dactylon*), Πολυετής Ήρα (*Lolium perenne*), Βέλιουρας (*Sorghum halepense*), Φεστούκα (*Festuca* sp.), Τραχεία λειβαδοπά (Ροα *trivialis*)

- Βαμβάκι
Ετήσια ζιζάνια (δόση 100-140 κ.εκ/στρ)
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*), Βέλιουρας από σπόρο (*Sorghum halepense*)
Πολυετή ζιζάνια (δόση 200 κ.εκ/στρ)
Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια:
Αγριάδα (*Cynodon dactylon*)

- Ρύζι
Ετήσια ζιζάνια (δόση 100-160 κ.εκ/στρ)
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*)
Πολυετή ζιζάνια (δόση 100-160 κ.εκ/στρ)
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Κόκκινο ρύζι (*Oryza rufipogon*)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες): Ζαχαρότευτλο, Σελινόριζα, Γουλι: **60**, Φινόκιο, Σέλερι: **50**, Μηδική, Πατάτα, Καρότο, Αγκινάρα, Ραπανάκι/ Ραφανίδες, Χρένα, Γογγύλια, Κοκκινόγούλα: **40**, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Ασκαλώνια: **35**, Σπαράγγι: **30**, Τομάτα, Μελιτζάνα: **28**, Φουντουκιά, Αμυγδαλιά, Φιστικιά: **20**, Βερικοκιά, Ροδακινιά – Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά: **14**, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνικά μούσμουλα, Λωτός: **10**, Ελιά, Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Γκρέιπ- φρουτ, Λεμονιά, Λιμμετία, Κερασιά, Ακτινιδιά, Ροδιά: **7**, Αμπέλι: **3**, Ρύζι, Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Ηλιανθος, Φυτώρια οπωρώνων και αμπέλου, Καλλωπιστικά, Σουσάμι: **Μη εφαρμόσιμο.**