

UFI: JF06-PT17-Q10Y-SY05



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazole-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Υπάρχει για την πρόκληση βλάβης στο έμβryo.

Τρόπος δράσης: Τα ζιζάνια απορροφούν το ζιζανιοκτόνο από τα φύλλα τους βλαστούς και τις ρίζες και σταματούν την ανάπτυξη τους σύντομα μετά την εφαρμογή. Η δ.ο. mesotrione παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση της πλαστοκυκλίνης και των καρβοεινών με δράση στο ένζυμο 4-HPPD. Η δ.ο. terbutylazine δρα ως παρεμποδιστής της φωτοσύνθεσης.

Τρόπος εφαρμογής: Καθαλκός ομοιομόρφος ψεκάσμος της επιφάνειας του εδάφους, με ψεκάστρα υψηλού όγκου και ψεκάστικο υγρό 20-30 λίτρα ανά στρέμμα. Χρησιμοποιείτε ακροφύσια τύπου σκούπας με πίεση 1,5 – 3 bar και απόσταση της ψεκαστικής ράβδου από το έδαφος 40-50 εκ. Ψεκάσμος υπό συνεχή ανάδραση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε το δοχείο πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδενύοντας την συστατισμένη δόση του σκευάσματος. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδενύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
		κ.εκ./στρ.	Όγκος ψ.υ. λίτρα /στρ.		
Αραβόσιτος	Ευαίσθητα ζιζάνια Λουβούδια, Στελλάρια, Αγριοτοματιά, Αγριοπιπεριά, Αγριοβαμβάκι, Τραχύ βλήτο, Αγριομελιτζάνα, Τσιπούλας, Τραχινός, Σκαρολάχανο, Πολύγωνο	100-150	20 – 30	Ψεκάσμος Φυλλώματος από το 1 ^ο μέχρι το 8 ^ο φύλλο (BBCH 11-18)	1 εφαρμογή ανά 3 χρόνια στον ίδιο αγρό
	Μετρίως Ευαίσθητα ζιζάνια: Μουχρίτσα, Αιματόχορτο, Γλυστρίδα, Κεχρί, Γκαλίνισγκα, Πολυκόμψι, Περιεκολάδα				

Παρατηρήσεις:
1. Η δόση των 100-125 κ.εκ./στρ. χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των πλατυφύλλων ζιζανίων, ενώ η δόση των 150 κ.εκ./στρ. εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της γλυστρίδας, των ετήσιων αγρωστωδών ζιζανίων ή όταν χρειάζεται υπολειμματική διάρκεια δράσης για την καταπολέμηση από εδάφους των ζιζανίων που θα βλαστήσουν μετά την εφαρμογή.
2. Για τα ζιζάνια Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*) και Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*) η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται μέχρι το τρίτο φύλλο του ζιζανίου (BBCH 13).

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Καλαμπόκι: Δεν ορίζεται (καλύπτεται από την καλλιεργητική περίοδο μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδή)
Στοιχεία φυτοτοξικότητας: ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους. Μπορεί να εμφανισθούν ήπια συμπτώματα φυτοτοξικότητας τα οποία όμως είναι παροδικά και δεν επηρεάζουν την απόδοση της καλλιέργειας.

Αρ. Πατρίδας: Βλέπε φιάλη
Ημ. Παρασκευής:



Click Premium 400 SC

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο που μετακινείται ανοδικά και καθοδικά στο φυτό.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Terbutylazine: 33 % (β/ο)
Mesotrione: 7 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 62,39 % (β/β)

Περιεχόμενο: 1 L

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70.216/27-06-2017

Ημερομηνία 1ης αναδενύσης: 22/01/2021

Κάτοχος της άδειας – Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ
Λ.Ανθούσσα, 15349, Ανθούσα, Αττική
Τηλ.: 210 6666 612

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5235 139, E-mail: info@sipcam.gr

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ZIZANIOKTONO

1L

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση του περιεχομένου/περίκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του προϊόντος. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την αραίωση/ φόρτωση/ εφαρμογή του σκευάσματος.
Να φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια κατά την επανεπίσκεψη στην καλλιέργεια. Όταν η καλλιέργεια γεμινάει με καταρτημένη περογή, να αφήσετε ζώνη ασφαλείας 10 μέτρων από αυτή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.
Πρώτες βοήθειες - αντιδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.
Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε του παθόντα σε καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και ξεκολλασμένο. Εάν δεν επανέλθει η αναπνοή του παθόντα εφαρμόστε τεχνική αναπνοής. Καλέστε τον γιατρό ή το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ άμεσα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με το προϊόν. Πλύνετε καλά με άφθονο νερό. Εάν ο δερματικός ερεθισμός παραμένει, καλέστε γιατρό. Πλύντε καλά τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε καλά τα μάτια με άφθονο και καθαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν απαιτείται.
Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό άμεσα και δείξτε του αυτόν τον περιέκτη ή την ετικέτα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντιδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7779377

Για να αποφευχθεί τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.
Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κατά σε επαναλαμβανόμενα. Να απομακρύνετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθοστρωτές επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα υπόγεια νερά μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν δ.ο. terbutylazine περισσότερο από 1 φορά ανά 3 έτη στον ίδιο αγρό.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μίαν ψέκαστη ζώνη φυτικής ανόσωσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους να αφήσετε από τη γεωργική ή μίαν ψέκαστη ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνιας ή περιβαλλοντικής υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκαταστεί:

- Να μην εφαρμόζεται σε γλυκό καλαμπόκι και σε καλαμπόκι που προορίζεται για παραγωγή σπόρου.
- Να μην εφαρμόζεται με λάδι ή προσκαλλητικά ή καρβαμικά ή οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. Εφαρμογές αυτών των προϊόντων να γίνονται 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του CLICK PREMIUM 400 SC.
- Να μην εφαρμόζεται εάν έχει προηγηθεί εφαρμογή κοκκώδους οργανοφωσφορικού ή καρβαμικού εντομοκτόνου κατά τη σπορά.
- Να μην καλλιεργείτε το έδαφος 7 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή.
- Διαχείριση Ανθεκτικότητας
- Το σκεύασμα περιέχει τη δ.ο. mesotrione, η οποία ανήκει στην ομάδα 27 κατά HRAC και τη δ.ο. terbutylazine, η οποία ανήκει στην ομάδα 5 κατά HRAC.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ακολουθείτε τις παρακάτω γεωργικές πρακτικές:
- Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ).
- Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιεργείας μπορεί να γίνει άμεσα επανασπορά του καλαμπόκιου.

- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Στο χωράφι που χρησιμοποιήθηκε το ζιζανιοκτόνο μπορεί να σπαρθεί σπύρι και χειμερινή ελαικοκάρβη ή το επομένο φθινόπωρο (5 μήνες μετά την εφαρμογή). 12 μήνες μετά την εφαρμογή (την επομένη άνοιξη), μπορούν να σπαρθούν βαμβάκι, ηλιανθος, σόργο, σόγια και αραχίδα. **Να μην σπέρνεται χειμερινή ελαικοκάρβη πριν περάσουν 12 μήνες από την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.** Να μην σπέρνονται τεύλα, μηδική, καντός, λαχανικά, πατάτα, φασόλια και άλλα ψυχρόφιλα, πριν περάσουν 18 μήνες μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου.

- **της πρόβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα:** Η επανεπίσκεψη των εργατών μπορεί να γίνει 14 ημέρες μετά την εφαρμογή.
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βύτιο. Ξπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βύτιο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως ο σπρώς και όλα τα ίχνη του προϊόντος.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας επεξεργάζονται υπό πίεση με κατάλληλο μηχανισμό ή γίνεται τρίπλο ξέλυμα (τα νερά του ξελίματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενες με τρίτημη, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.

Συνθηματικές:
Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, μακριά από ήλιο και υγρασία σε καλά αεριζόμενο χώρο παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.