



Μεταφυτρωτικό
ζιζανιοκτόνο
Έλεγχος παραφυάδων
Αποξηραντικό

ΓΡΗΓΟΡΟ, ΕΥΚΟΛΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

NEO!



- Αποτελεσματικό σε πλατύφυλλα ζιζάνια, ακόμα και ανθεκτικά σε άλλα ζιζανιοκτόνα
- Άριστος έλεγχος παραφυάδων
- Αποξηραντικό πατάτας
- Εγκεκριμένο για ευρύ φάσμα καλλιεργειών (δενδρώδεις και ετήσιες)


SIPCAM
HELLAS



MIZUKI®

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Pyraflufen-ethyl 1,06% β/ο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ


Ανήκει στη χημική ομάδα των phenylpyrazole (φαινυλοπυραζόλια). Η δραστική ουσία pyraflufen-ethyl είναι αναστολέας του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου (protoporphyrinogen oxidase - PPO), παρεμποδίζοντας τους φωτοσυνθετικούς δίαυλους του φυτού.

ΠΩΣ ΔΡΑ

- Δρα μόνο με επαφή και απορροφάται αποκλειστικά από τα πράσινα μέρη των φυτών (φύλλα, παραφυάδες).
- Απορροφάται πολύ γρήγορα και η νέκρωση των ζιζανίων επέρχεται σε λίγες μέρες.
- Η δράση του βελτιώνεται με συνθήκες έντονου ηλιακού φωτισμού.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται καθ' όλη την διάρκεια του έτους ανάλογα με την εποχή εμφάνισης των ζιζανίων.



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποξήρανση στελεχών πατάτας

Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος.

Αντιμετώπιση ζιζανίων στην πατάτα

Προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά.

Αντιμετώπιση ζιζανίων στην τομάτα πριν τη μεταφύτευση

Καθολικός ψεκασμός.


Αντιμετώπιση ζιζανίων στην τομάτα μετά τη μεταφύτευση

Κατευθυνόμενος ψεκασμός μεταξύ των γραμμών φύτευσης με χρήση προστατευτικών καλύπτρων.

Αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων και αποξήρανση παραφυάδων

Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλύπτρων. Εφαρμόζεται χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με τα διάφορα μέρη των καλλιεργειών.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ ΖΙΖΑΝΙΑ




ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Πατάτα:	Αγριοτομάτα, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά, Πολυκόμπι, Πολύγωνο αναρριχώμενο
Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Ακτινίδιο, Ελιά	Αγριομάρουλο, Αναγαλλίδα, Αντράκλα, Βερόνικα, Βλήτο τραχύ, Γεράνι, Επιλόβιο, Ζωχός, Καρδαμίνη, Καφέλλα, Κόνυζα, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Μολόχα, Μύαγρο, Παπαρούνα κοινή, Πολυκόμπι, Σκαρολάχανο, Στελλάρια, Τοριλίδα, <i>Acalypha virginica</i> , <i>Chamaesyce prostrata</i> / <i>Euphorbia prostate</i> , <i>Diplotaxis erucoides</i>
Τομάτα (Υ):	Αγριοπιπεριά, Αγριοτομάτα, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά, Περιπλοκάδα, Πολυκόμπι, Πολύγωνο αναρριχώμενο
Αγκινάρα:	Αγριοτομάτα, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο άσπρο, Βλήτο τραχύ, Ζωχός, Καπνόχορτο, Λουβουδιά, Μολόχα, Περιπλοκάδα, Σισύμπριο, Τσουκνίδα μικρή, <i>Chenopodium murale</i> , <i>Diplotaxis virgata</i>
Μπανάνα:	Αγριοτομάτα, Στύφνος, Βλήτο καλλιεργούμενο, Λουβουδιά, Ζωχός πολυετής, Κόνυζα, Λαβατέρα, Λουβουδιά

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΧΡΗΣΗ	ΔΟΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ	ΜΕΓ. ΑΡΙΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ. ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ (ΗΜΕΡΕΣ)
		κ.εκ./στρ.	
Πατάτα	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	100-200	I
	Αποξήρανση στελεχών πριν τη συγκομιδή	200	2/5
Αμπέλι Επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	200	2/20
Μηλοειδή Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουςμουλιά, Ασιατικό αχλάδι (αχλαδόμηλο)			
Πυρηνόκαρπα Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερασιά	Αποξήρανση παραφυάδων	200	2/20
Ακρόδρυα Καρυδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά			
Ακτινιδιά			
Ελιά Επιτραπέζια και ελαιοποιήσιμη			
Τομάτα (Υ)	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	100-200	I
Αγκινάρα	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	87,5	I
Μπανάνα	Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια	100	I

Κάτοχος Άδειας	Nichino Europe Co Limited
Σύνθεση	Pyraflufen-ethyl 1,06% β/ο
Μορφή σκευάσματος	Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Αριθμός έγκρισης	70459/26.07.22