



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: 82M0-M0GJ-900X-P25J

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους στις καλλιέργειες της αγκινάρας και της μπανάνας να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων από μη γεωργική γη ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνιες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απολεισθεί:
Διαχείριση ανθεκτικότητας

• Το σκεύασμα περιέχει το ζιζανιοκτόνο pyraflufen-ethyl που ανήκει στην ομάδα 14 κατά HRAC.
• Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ.) και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργιών που ακολουθούν: 3 ημέρες
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, εναισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φαινοτικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την προτεινόμενη ετικέτα του.

Μέγ. Αριθ. Εφαρμογών ανά καλλιερ. περίοδο/ μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες):
Πατάτας: α) για απόσπρωση: 2/5, β) για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: 1 εφαρμογή. **Αγρόναρα, Χειμερινά σιτηρά, Αραβόσπορος, Σόργο, Ήλιανθος, Σόγια, Όλες οι καλλιέργειες:** 1 εφαρμογή. **Αμπέλι, Μπλοσιέρι, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυς, Ελιά, Εσπεριδοειδή, Ροδιά, Λωτός:** 2/20. **Ακτινιδιά:** 2/20 (15 ημέρες για αποξήρανση παραφρούδων). **Μπανάνια, Τομάτα (Υ):** 1 ανά έτος.

Τέλευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Αμπέλι (επιτραπέζιο & ονοποποίησης): 14 ημέρες. **Μηλιά, Αχλαδιά - Ασιατικά Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσαμμούλα, Ιαπωνική μουσαμμούλα, Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερασιά-Βουσσινιά, Πορτοκαλιά - Περγαμόντο - Νεραντζιά, Μανταρινιά - Κλημεντίνη, Λεμονιά - Κιτρολεμονιά, Γκρέιφρουτ - Φράπα, Ροδιά, Λωτός, Καρυδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Καστανιά, Πατάτα, Ακτινιδιά - Ελιά (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες):** 7 ημέρες. **Τομάτα (Υ)** (για εφαρμογή μετά τη μεταρύτευση): 28 ημέρες. **Μπανάνια:** 15 ημέρες. **Αγκινάρα, Τομάτα (Υ)** (εφαρμογή πριν τη μεταρύτευση). **Μαλακό/ζελήρο σιτάρι - Tritordeum - Τριτάκαλε, Κριθάρι, Βρώμη, Σικάλη, Αραβόσπορος, Σόργο, Ήλιανθος, Σόγια:** Μη εφαρμοσίμο. **Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομεινάρει όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορριπτικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ζέλυμα (τα νερά του ζελύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενσωματώνονται σε σημεία συλλογής ή ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

Αρ. Παρτίδας:
 Ημ. Παρασκευής:
 Βλέπε επί της συσκευασίας



- ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ
- ΑΠΟΣΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
- ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΦΥΔΑΔΩΝ ΣΕ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Γαλακτωματοποίηση υγρό (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Pyraflufen-ethyl: 1.06 % (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες: 98.94 % (β/β)

Περιεχόμενο: 1 L
Κάτοχος της άδειας: Nichino Europe Co Limited
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon Cambridge, Cambridge shire, Ηνωμένο Βασίλειο
Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.
Βασιλείας Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834, E-mail: info@sipcam.gr

Προϊόν έρευνας της: **Nichino**Europe



SIPCAM

ZIZANIOKTONO

1L

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας, μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση.

Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισοδού στην καλλιέργεια φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, συμβουλευθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε τα προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Πλύνετε το στόμα, κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή συμβουλευθείτε ένα γιατρό. Μη προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

Περίεκτη Benzensulfonic acid, C10-13-alkyl derivatives, άλατα ασβεστίου και 2-Methyl-1-propanol. Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιποδρωτικές επιφανείες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στις καλλιέργειες της πατάτας, του αμπελιού, των μη-λοισιδιών, των πυρηνόκαρπων, των ακρόδρυων, της ελιάς, της ακτινιδιάς και της τομάτας να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα

- **15 μέτρων** ή
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών, της ροδιάς και του λωτού να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **14 μέτρων** ή
- **10 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%** ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς στις καλλιέργειες της αγκινάρας και της μπανάνας, των χειμερινών σιτηρών, του αραβόσπου, του σόργου, του ήλιανθου, της σόγιας και για την εφαρμογή από τον τερματισμό μιας καλλιέργειας και μέχρι πριν τη σπορά ή φύτευση της επόμενης καλλιέργειας, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από τα επιφανειακά ύδατα:

- **10 μέτρων** ή
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με την χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους στις καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών, του αραβόσπου, του σόργου, του ήλιανθου, της σόγιας και της εφαρμογής από τον τερματισμό μιας καλλιέργειας και μέχρι πριν τη σπορά ή φύτευση της επόμενης καλλιέργειας, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από τη γεωργική γη:

- **5 μέτρων** ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **75%**.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη-στόχους στις καλλιέργειες της πατάτας, της τομάτας, του αμπελιού, των μη-λοισιδιών, των πυρηνόκαρπων, των ακρόδρυων, της ελιάς και της ακτινιδιάς, των εσπεριδοειδών, της ροδιάς και του λωτού, να αφήσετε μίαν αφέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- **10 μέτρων** ή
- **5 μέτρων** σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%** ή
- χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **90%**.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

Τρόπος εφαρμογής: Τρόπος εφαρμογής:

Αποθήκευση στελεχών/πατάτας: καθολικός φεκασιός φυλλώματος. **Αντιμετώπιση ζιζανίων στην τομάτα πριν τη μεταφύτευση:** καθολικός φεκασιός. **Αντιμετώπιση ζιζανίων στην τομάτα μετά τη μεταφύτευση:** κατευθυνόμενος φεκασιός **μεταξύ των γραμμών φύτευσης** με χρήση προστατευτικών καλλυπνών. **Αποθήκευση φυτών:** γυμνοί, χωρίς να ερθούν στη σταγονίδια με το διάφορα μέρη των καλλυχνών. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ακροφύσια μείωσης χαμηλής πίεσης με μέγιστες ταχύτητες 5-6 χλμ/ώρα και με πίεση που δεν υπερβαίνει τα 2 bar.

Τρόπος παρκαίσεως φεκασιτικού υγρού: **Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση.** Γεμίστε το δοχείο του φεκασιτικού μηχανήματος με νερό κατά τα 2/3. Προσθέτε τη απαιτούμενη ποσότητα αερανόματος μέσα στο φεκασιτικό δοχείο υπό συνεχή ανδάνευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό ανανεώοντας καλά και με τον ανανεωτήρα σε λειτουργία καθ' όλη τη διάρκεια του φεκασιού.

Τρόπος δόσης: Μεταφωτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων. Χρησιμοποιείται στην πατάτα για αποθήκευση των στελεχών πριν τη συγκομιδή και για τον έλεγχο των παρασίτων σε δενδροειδείς καλλιέργειες στο αμπέλι και στη ροδιά. Η δραστική ουσία γραβιθίλη-ethyl είναι αναστολέας του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπαρωμυρινογόνου (protoporphyrinogen oxidase - PPO), παρεμποδίζοντας τους φωτοσυνθετικούς δαύλους του φυτού. Συνεπώς η δράση του βελτιώνεται με συνθήκες έντονου ηλιακού φωτισμού.

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ –ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Πατάτα*: α) Αποθήκευση στελεχών πριν τη συγκομιδή: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30-40 λίτρα/στρ. Κατά την έναρξη κτηνισμάτος των φύλλων (Μάρτιος-Οκτώβριος). β) Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 100-200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ. υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Προφυτρωτικά ή χωρίς προφυτρωτικά:μέχρι την εμφάνιση του 5% των φυτών (Μάρτιος-Οκτώβριος). **Αμπέλι** (επιτραπέζιας και ονοποποίησης ποικιλίες): Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών: α) Αποθήκευση παραφιδών: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30-40 λίτρα/στρ. Από την πλήρη έκπτυξη 9 η περισσοτέρων φύλλων μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει μέγεθος μπιελίου (Απρίλιος-Αυγουστός). β) Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει μέγεθος μπιελίου (Φεβρουάριος-Αυγουστός). **Μηλοειδή** (Μηλιά, Αχλαδιά, Κιδοανιά, Μουσουμιά, Ιαπωνική μουσουμιά): Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών: α) Αποθήκευση παραφιδών: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30 λίτρα/στρ. Από τη δόγκωση των ανθοφόρων οσθαδμών μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους (Μάρτιος-Σεπτεμβρίου). β) Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30 λίτρα/στρ. Από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους (Φεβρουάριος-Σεπτεμβρίου). **Πυρηγόκαρπα (Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερασιά):** Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών: α) Αποθήκευση παραφιδών: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30 λίτρα/στρ. Από τη δόγκωση των ανθοφόρων οσθαδμών μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους (Μάρτιος-Αυγουστός). β) Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30 λίτρα/στρ. Από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 50% του τελικού μεγέθους (Φεβρουάριος-Αυγουστός). **Ακρόδρυς (Καρπούζι, Αγγουλάκι, Πουρκούλα, Φιστικιά, Καστανιά):** Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών: α) Αποθήκευση παραφιδών: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30 λίτρα/στρ. Από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 60% του τελικού μεγέθους (Μάρτιος -Σεπτεμβρίου). β) Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30 λίτρα/στρ. Από τον λήθαργο μέχρι οι καρποί να έχουν αποκτήσει το 60% του τελικού μεγέθους. (Φεβρουάριος-Σεπτεμβρίου). **Ακτινυδιά:** Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών: α) Αποθήκευση παραφιδών: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30 λίτρα/στρ. Από την πλήρη έκπτυξη των πρώτων φύλλων μέχρι την εμπορική ωρίμαση των καρπών (δεν είναι ακόμα κατάλληλοι για κατανάλωση) (Φεβρουάριος-Σεπτεμβρίου). β) Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 30 λίτρα/στρ. Από τον λήθαργο μέχρι την εμπορική ωρίμαση των καρπών (δεν είναι ακόμα κατάλληλοι για κατανάλωση) (Φεβρουάριος-Σεπτεμβρίου). **Ελιά** (επιτραπέζιες και ελαιοποιήσιμες ποικιλίες):

Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών: α) Αποθήκευση παραφιδών: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 10-40 λίτρα/στρ. Από το στάδιο που τα φύλλα έχουν αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος της ποικιλίας μέχρι τον έντονο μεταχωματισμό των καρπών (Απρίλιος -Σεπτεμβρίου). β) Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 25-40 λίτρα/στρ. Από το στάδιο που τα φύλλα έχουν αποκτήσει το τυπικό σχήμα και μέγεθος της ποικιλίας μέχρι τον έντονο μεταχωματισμό των καρπών (Απρίλιος -Σεπτεμβρίου). **Αγκινάρες:** Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 87,5 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 25-40 λίτρα/στρ. Από την εμφάνιση του 2^{ου} φύλλου μέχρι την εμφάνιση του 4^{ου} φύλλου (Ιούλιος-Οκτωβρίου). **Μπανάνες:** Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 100 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Νωρίς μεταφωτρωτικά (λανουόριος-Δεκέμβριος). **Τομάτα (Υ):** Για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 100-200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Καθολικός φεκασιός. **Πριν τη μεταφύτευση** (μέχρι 1 μέρα πριν) (Μάρτιος-Ιούνιος) ή Κατευθυνόμενος φεκασιός **μεταξύ των γραμμών φύτευσης** με χρήση προστατευτικών καλλυπνών. **Μετά τη μεταφύτευση** (μέχρι την έκπτυξη του 5^{ου} φύλλου μέχρι το σχηματισμό της 2^{ης} ταξιανθίας (Απρίλιος-Αυγουστός).

Χειμερινά σπάρτα (Μαλακό Στάρι, Σκληρό στάρι, Κριθάρι, Βρώμη, Σικαλη): Για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 75-100 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Καθολική εφαρμογή προσπαρτικά (Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου) ή Προφυτρωτικά (μέγιστο 3 ημέρες μετά τη σπορά) (Σεπτεμβρίου- Δεκεμβρίου). **Αραβόσιτος, Σόργο, Ηλιανθος:** Για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 75-100 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Καθολική εφαρμογή προσπαρτικά (Μάρτιος-Ιούνιος) ή Προφυτρωτικά (μέγιστο 3 ημέρες μετά τη σπορά) (Μάρτιος-Ιούνιος). **Ζιζάνια:** Για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 75-100 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Καθολική εφαρμογή προσπαρτικά (Απρίλιος- Ιούλιος) ή Προφυτρωτικά (μέγιστο 3 ημέρες μετά τη σπορά) (Απρίλιος- Ιούλιος). **Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλάκι, Μανταρινάκι, Λεμονάκι, Γκρέιφρουτ):** Για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 100-200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών μέχρι την έναρξη μεταχωματισμού των καρπών (Φεβρουάριος-Σεπτεμβρίου). **Ροδιά:** Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών: Για α) Αποθήκευση παραφιδών και β) Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 100-200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Από την έκπτυξη του 5ου φύλλου μέχρι τον έντονο μεταχωματισμό των καρπών. **Λωτός:** Κατευθυνόμενος φεκασιός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών: Για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 100-200 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Από την αρχή της έντονης βλάστησης έως όπου ο καρπός αποκτήσει το 50% του τελικού του μεγέθους. **Όλες οι καλλιέργειες (ΣΙΝΤΟΙ):** Για ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: **Δόση:** 75-100 κ.εκ./στρ. **Χυκος ψεκ.υγρού:** 20-40 λίτρα/στρ. Καθολική εφαρμογή από τον τερματισμό μιας καλλιέργειας και μέχρι πριν τη σπορά ή φύτευση της επόμενης καλλιέργειας.

*** Ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών στην καλλιέργεια της πατάτας είναι δύο (2): 1 εφαρμογή για καταπολέμηση ζιζανίων + 1 εφαρμογή για αποθήκευση στελεχών + 2 εφαρμογές για αποθήκευση στελεχών.**
Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη αγχολιά περιλαμβάνει και το οσιατικό αγχολιά (nashi, αγχολόμυλο).
2. Η χρήση στη ροδιά περιλαμβάνει και τη νεκρανιά.
3. Η χρήση στη κερασιά περιλαμβάνει και τη δισονιά.
4. Η χρήση στο σπάρτα περιλαμβάνει το τρικτάλε και το tritordeum.
5. Η χρήση στη πορτοκαλιά περιλαμβάνει το περγαμόνιτο και τη νεραντζιά.
6. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει την κλημινίνη.
7. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει την κίτρολεμνιά.
8. Η χρήση στο γκρέιφρουτ περιλαμβάνει τη φράπα.
9. Η χαμηλότερη δόση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε νεαρά ζιζάνια ή σε χαμηλές κηπότητες, ενώ η υψηλότερη δόση θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ζιζάνια που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης ή σε υψηλές κηπότητες.
10. Η εφαρμογή για αποθήκευση παραφιδών να γίνεται σε μη ζυθοποιημένες παραφίδες με μήκος έως 15-20 εκ.

11. Εφαρμογή απουσία ανέμου.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

*** Πατάτα:** **Ευαισθητά:** Αγριοτάμαχο, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά, Πολυκόμμι, Πολύγωνο αναρχώμενο **Μετρίως ευαισθητά:** Αγριοπιπέτα, Περιπόκαδα ***Τομάτα:** **Ευαισθητά:** Αγριοπιπέτα, Αγριοτάμαχο, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο τραχύ, Λουβουδιά, Περιπόκαδα, Πολυκόμμι, Πολύγωνο αναρχώμενο *** Αγκινάρες:** **Ευαισθητά:** Αγριοτάμαχο, Στύφνος, Αντράκλα, Βλήτο άσπρο, Βλήτο τραχύ, Ζυγός Καπνόχορτο, Λουβουδιά, Μολόχα, Περιπόκαδα, Σίσυμυρο, Τσουνκινά μικρή, *Chenopodiumstrum murale*, *Diplotaxis virgata*

*** Αμπέλι, Μηλοειδή, Πυρηγόκαρπα, Ακρόδρυς, Ακτινιδίο, Ελιά:** **Ευαισθητά:** Αγριοτάμαχο, Αναγαλλίδα, Αντράκλα, Βερόνικα, Βλήτο τραχύ, Γεράνι, Επιλόβιο, Ζυγός, Καραβινιά , Καφέλλα, Κόνυα, Λουβουδιά, Μαρτιάκος, Μολόχα, Μύαγρο, Παπαρούνα κοινή, Πολυκόμμι, Σκαρολάχανο, Στελλάρια, Τρολιδά, *Acalypha virginica*, *Chamaesyce prostrata* / *Euphorbia prostate*, *Diplotaxis erucoides* **Μετρίως ευαισθητά:** Αγριοτάμαχο, Στύφνος, Κόνυα *** Μπανάνες:** **Ευαισθητά:** Αγριοτάμαχο, Στύφνος, Βλήτο καλλιεργούμενο, Λουβουδιά, Ζυγός πολυετής, Κόνυα, Λαβιέρα, Λουβουδιά *** Χειμερινά σπάρτα:**

Πριν τη σπορά (δόση 75 κ.εκ/στρ)	Πριν τη σπορά (δόση 100 κ.εκ/στρ)
Ευαισθητά ζιζάνια: Καφέλα, Σινάπι, Βερόνικα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Κολλητόιδα, Κοινή παπαρούνα	Ευαισθητά ζιζάνια: Καφέλα, Σινάπι, Κολλητόιδα, Κοινή παπαρούνα, Βερόνικα

Μετά τη σπορά/Προφυτρωτικά	
Ευαισθητά ζιζάνια: Λουβουδιά, Κολλητόιδα , Λωδεκάνθι, Κοινή παπαρούνα, Στελλάρια, Βερόνικα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Καφέλα, Καπνόχορτο	Ευαισθητά ζιζάνια: Λουβουδιά, Κολλητόιδα, <i>Hyrcosum procumbens</i> , Λωδεκάνθι, Κοινή παπαρούνα, Στελλάρια, Βερόνικα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Καφέλα, Καπνόχορτο

*** Αραβόσιτος, Σόργο**

Πριν τη σπορά (δόση 75 κ.εκ/στρ)	Πριν τη σπορά (δόση 100 κ.εκ/στρ)
Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Αντράκλα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι	Ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι, Τραχύ βλήτο, Αναρχώμενο πολύγωνο, Αντράκλα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Πολυκόμμι

Μετά τη σπορά/Προφυτρωτικά	
Ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι, Πλαγιαστό βλήτο, Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Τάτουλας, Αναρχώμενο πολύγωνο, Αλμυρίδι, Αγριοτάμαχο Ζυγός, Αγριοελιτζάνα	Ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι, Πλαγιαστό βλήτο, Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Τάτουλας, Αναρχώμενο πολύγωνο, Αλμυρίδι, Αγριοτάμαχο, Ζυγός, Αγριοελιτζάνα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: <i>Pisum sativum</i>

*** Ηλιανθος**

Πριν τη σπορά (δόση 75 κ.εκ/στρ)	Πριν τη σπορά (δόση 100 κ.εκ/στρ)
Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Αντράκλα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι, Βαμβάκια	Ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι, Τραχύ βλήτο, Αντράκλα

Μετά τη σπορά/Προφυτρωτικά	
Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Τάτουλας, Αναρχώμενο πολύγωνο, Λαπάστα, Αντράκλα, Αλμυρίδι, Αγριοτάμαχο, Ζυγός, Αγριοελιτζάνα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Περιπόκαδα	Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Περιπόκαδα, Τάτουλας, Αναρχώμενο πολύγωνο, Λαπάστα, Αντράκλα, Αλμυρίδι, Αγριοτάμαχο, Ζυγός, Αγριοελιτζάνα

*** Σόγια**

Πριν τη σπορά (δόση 75 κ.εκ/στρ)	Πριν τη σπορά (δόση 100 κ.εκ/στρ)
Ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι, Τραχύ βλήτο, Αντράκλα, Λουβουδιά	Ευαισθητά ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι, Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Αντράκλα

Μετά τη σπορά/Προφυτρωτικά	
Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Λαπάστα	Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Λουβουδιά, Λαπάστα

*** Εσπεριδοειδή**

Στη δόση 100 κ.εκ/στρ.	Στη δόση 200 κ.εκ/στρ.
Μετά τη σπορά	
Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Περιπόκαδα, Σκαρολάχανο, Ζυγός Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Αντράκλα	Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Περιπόκαδα, Σκαρολάχανο, Ζυγός Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: <i>Borago officinalis</i> , Φθώμος, <i>Oxalis acetosella</i> , Ζυγός (<i>Sonchus arvensis</i>)

*** Ροδιά**

Στη δόση 100 κ.εκ/στρ.	Στη δόση 200 κ.εκ/στρ.
Μετά τη σπορά	
Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Αντράκλα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: <i>Diplotaxis erucoides</i> , Ζυγός	Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Αντράκλα, Ζυγός, <i>Diplotaxis erucoides</i>

*** Λωτός**

Στη δόση 100 κ.εκ/στρ.	Στη δόση 200 κ.εκ/στρ.
Μετά τη σπορά	
Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Αντράκλα	Ευαισθητά ζιζάνια: Τραχύ βλήτο, Αντράκλα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: <i>Diplotaxis erucoides</i> , <i>Euphorbia prostrata</i>

*** Μεσοδιάστημα μεταξύ δύο καλλιεργειών**

Στη δόση 75 κ.εκ/στρ.	Στη δόση 100 κ.εκ/στρ.
Μετά τη σπορά	
Ευαισθητά ζιζάνια: Αντράκλα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Περιπόκαδα, Ζυγός, <i>Diplotaxis virgata</i>	Ευαισθητά ζιζάνια: <i>Diplotaxis virgata</i> , Αντράκλα Μετρίως ευαισθητά ζιζάνια: Περιπόκαδα, Ζυγός