

Κατηγορία και τρόπος δράσης: Προφυτρωτικό και πρώιμα μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής και υπολειμματικής δράσης για την αντιμετώπιση ετήσιων αγριωνόμων και πλατυφύλων ζιζανίων που δρα μετά την απορρόφηση του από τις ρίζες και τους νεαρούς βλαστούς των ζιζανίων στόχων αναστατώντας τη βιοσύνθεση των καρβοϋνιδίων. Μετά την απορρόφηση του από τις ρίζες και τους βλαστούς μετακινείται διασυστηματικά προς το πάνω μέρος του φυτού.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με 20-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα αποστasia ανέμου, σε υγρό έδαφος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού Γεμίστε τον ψεκαστήρα με το 30-50% του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος συνεχίζοντας την ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση.

ΠΕΛΑΙΟ ΕΦΕΡΜΟΓΗΣ - ΣΤΟΧΟΣ ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Στόχος: Καταπολέμει ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια.

Δόσεις σκευάσματος:
- 40-50 κ.ε.κ/στρ. για όλες τις καλλιέργειες
- Όχι ψεκ. αγρ. κλπ. στρ.: 20-40 για όλες τις καλλιέργειες.

Αμψιέλ (επιτραπέζιο και ονοπούλαιο): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας του αμπελιώνα.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Μηλοείδη (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσαουλιά, Ιαπωνική μονομυλιά): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας του αμπελιώνα.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερσιόα): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας της φύτευσης.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά, Κερσιόα): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας της φύτευσης.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Ελιά: Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 50% της επιφάνειας ελαιώνα.

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών έως και την έναρξη επιμήκυνσης του και διαχωρισμό τους (BBCH 00-03).

Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Γκρέιφρουτ, Μανταρίνια, Λάιμ (Πράσινα λεμόνια): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας της φύτευσης.

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το λήθαργο των οφθαλμών έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Ακρόδρυς (Καρδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Κασταλιά): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 50% της επιφάνειας του αμπελιώνα.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Ακρόδρυς (Καρδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Κασταλιά): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 50% της επιφάνειας του αμπελιώνα.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Ακρόδρυς (Καρδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Κασταλιά): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 50% της επιφάνειας του αμπελιώνα.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Ακρόδρυς (Καρδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Κασταλιά): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 50% της επιφάνειας του αμπελιώνα.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Ακρόδρυς (Καρδιά, Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Κασταλιά): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 50% της επιφάνειας του αμπελιώνα.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Ακτινιδιά (Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο): Κατευθυνόμενος ψεκασμός στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της επιφάνειας του αμπελιώνα.

- Φθινοπωρινή εφαρμογή: Από την έναρξη του σταδίου του λήθαργου (BBCH 90-99).

- Χειμερινή/Ανοιξιάτικη εφαρμογή: Από το στάδιο του λήθαργου έως και πριν την έναρξη έκπτυξης των οφθαλμών (BBCH 00-07).

Μείγματος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιερητική περίοδο: 1 για όλες τις καλλιέργειες.

ΕΥΛΙΞΗΤΑ ΕΙΔΗ:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Ήρα (*Lolium rigidum*)

Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοταμάρι (*Solanum nigrum*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Στελλάρια (*Stellaria media*), Δουδεκάνηλο (*Lamium strigosum*), Ψυμασσάνα (*Sinapis arvensis*).

ΜΕΤΡΙΧΟΣ ΕΥΛΙΞΗΤΑ ΕΙΔΗ:

Ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: Ήρα (*Lolium multiflorum*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*)

Ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: Αντράχλη (*Portulaca oleracea*), Καλεντούλα (*Calendula arvensis*), Γκιρς (*Picris helminthosca eschuloides*), Ελάτο τροχί (*Amaranthus retroflexus*), Κίρσιον (*Cirsium arvense*), Αγρία ρόκα (*Dipsacanthus erucoides*), Κόνιτσα (*Erigeron canadensis*), Αγρία γεράνιο (*Geranium molle*), Μολόχα (*Molva sylvestris*), Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*), Σωχός (*Sonchus oleraceus*), Σωχός ασπρός (*Sonchus asper*), Σωχός ολερσεύς (*Sonchus oleraceus*), Αγριορόκα (*Paracetanthus officinalis*), Βερνίκια (*Veronica spp.*), Πορροφύ κίτρινη (*Cyperus rotundus*), Καψέλια (*Capsella bursa-pastoris*), *Lactuca denticalata*

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.

2. Η χρήση στην κερσιόα περιλαμβάνει τη βουτανιά.

3. Η χρήση στη δαμασκηνιά περιλαμβάνει και την αγριο-ροδακινιά.

4. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει την κλημεντίνη.

5. Η χρήση στην πορτοκαλιά περιλαμβάνει τη νεραντζιά και το περγαμόντο.

6. Η δράση του σκευάσματος επηρεάζεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν βρέξει σε 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, αναμένεται άρδευση περίπου 10mm νερού για την ενσωμάτωση - ενεργοποίηση του σκευάσματος στο έδαφος.

7. Μεταφυτρωτικό το σκεύασμα εφαρμόζεται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων (2-3 πραγματικά φύλλα).

8. Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

9. Για τις καλλιέργειες αμπελιού, μηλοειδών, πυρηνόκαρπων, ακρόδρυς και ακτινιδιά η φθινοπωρινή εφαρμογή πραγματοποιείται μετά τη συγκομιδή.

10. Για τις καλλιέργειες ελιάς και εσπεριδοειδών η ανοιξιάτικη εφαρμογή πραγματοποιείται μετά τη συγκομιδή.

11. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού, Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανιά, στις ποικιλίες αχλαδιού, Κρουστάλλι και Κοντούλα, καθώς και στις ποικιλίες ελιάς, Καλαμών και Κορωνίτση. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεκτή η απουσία φυτοτοξικότητας.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετσοκληκτικές χρήσεις: Για όλες τις καλλιέργειες: Μη εφαρμογή.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν προκαλεί φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται στις συνιστάμενες δόσεις και καλλιέργειες. Μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα λεύκανσης στην καλλιέργεια τα οποία εξαφανίζονται μετά από 1-2 εβδομάδες, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην αποδόση της καλλιέργειας.

Rexxar®

Προφυτρωτικό και μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής

ΜΙΚΡΟΚΑΨΟΥΛΕΣ ΣΕ ΑΙΩΡΗΜΑ (CS)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Clomazone:

36% (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες:

67.98 % (β/β)

Περιεχόμενο:
1 L

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.p.A
Via Sempione, 195, 20016 Pero (MI), Italia

Αρ. Άδειας
Διάθεσης
στην Αγορά:
70.596/09.09.2025

Υπευθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.
Βασίλειος Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834, E-mail: info@sipcam.gr



ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογυγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει την δραστική ουσία clomazone, ένα ζιζανιοκτόνο που ανήκει στην ομάδα 13 κατά ΗΡΑΕ.

Ενα εναλλακτικό μέθοδο αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιερητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής της πρόσφασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διαθέστε περιεχόμενο/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση του σκευάσματος».

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την εφαρμογή».

Ποσότητα βελανιδιάς - Αντίδοτο:

Δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιοστρό.

Συνιστάται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το συμβάν. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΤΗΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρήσει ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό (οφθαλμολόγο).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΙ: Απορροή/Ξέγαση με άφθονο νερό και με μολυσμένα ρούχα. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το πάσχοντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ περίπτωση απώλειας των αισθήσεων τοποθετήστε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια στάση για μεταφορά.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΠΡΑΤΟΙ: Ακολουθείτε θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Ή ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λυθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν σφικταστή ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική ή χημικοβιομηχανική ακροφυσία μειώσεως της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό το βυτίο και όλα τα εξαρτήματά του ψεκαστικού μέχρι να εξασθενίσουν πλήρως ο αέρας και όλα τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά όγκια συσκευασίας ξεπλένονται υπο πίεση με καθαρό μηχανικό ή χημικό τρίψιμο (τα νερά του ξεπλυσίματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στην συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριψύμα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική απαράβατη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεση έκθεση σε ηλιακό φως



ΠΡΟΣΟΧΗ

• Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνια επίδραση.
• Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

UFI: PQ9Y-RPX2-E106-6AUK

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής:

Βλέπε φιάλη

