



# Ripper®

(clethodim 12% β/ο + pyraflufen ethyl 1% β/ο)



-  Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο εναντίον αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων
-  Ελέγχει ετήσια, πολυετή ζιζάνια και παραφυάδες

**Ολοκληρωμένο – Γρήγορο – Αξιόπιστο**

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

## ΣΤΟΧΟΣ



**Αμπέλι**  
(οινοποιήσιμες  
και επιτραπέζιες  
ποικιλίες)

Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη  
και πλατύφυλλα.  
Αποξήρανση λαίμαργων βλαστών.



**Μηλιά**  
**Αχλαδιά**  
**Κυδωνιά**  
**Μουσμουλιά**  
**Ιαπωνική μουσμουλιά**

Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη  
και πλατύφυλλα.  
Αποξήρανση παραφυάδων.



**Βερικοκιά**  
**Ροδακινιά**  
**Δαμασκηνιά**  
**Κερασιά**

Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη  
και πλατύφυλλα.  
Αποξήρανση παραφυάδων.



**Γκρέιπ Φρουτ**  
**Πορτοκαλιά**  
**Λεμονιά**  
**Λιμμετία**  
(Πράσινα λεμόνια)  
**Μανταρινιά**


Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη  
και πλατύφυλλα.  
Αποξήρανση παραφυάδων.



**Αμυγδαλιά**

**Φουντουκιά**  
**Καρυδιά**  
**Καστανιά**

Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη  
και πλατύφυλλα.  
Αποξήρανση παραφυάδων



**Ροδιά**

Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη  
και πλατύφυλλα.  
Αποξήρανση παραφυάδων.



**Λωτός**

Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη  
και πλατύφυλλα.  
Αποξήρανση παραφυάδων.



**Αγροί σε αγρανάπαυση.**  
**Όρια αγρών**  
**με ακαλλιέργητη γη.**

Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη  
και πλατύφυλλα.



Κ.Εκ./στρέμμα	Όγκος ψεκαστικού υγρού Λίτρα/στρέμμα		Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
200	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών. <b>BBCH 00-79</b>	1
200	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. <b>BBCH 00-87</b>	1
200	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. <b>BBCH 00-87</b>	1
200	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση. <b>BBCH 00-89</b>	2/20
200	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. <b>BBCH 00-87</b>	2/20
200	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. <b>BBCH 00-87</b>	1
200	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμανση των καρπών. <b>BBCH 00-87</b>	1
200	20 - 40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. <b>BBCH 00-87</b>	1
200	20 - 40	Εντοπισμένη (spot) εφαρμογή με χρήση προστατευτικών καλυπτρών με μέγιστο ψεκασμένης έκτασης 30% που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ./στρ.	1 / 2έτη

## ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

Ετήσια αγρωστώδη:

Αιματόχορτο, μουχρίτσα, πία κοινή, πράσινη σετάρια, ελευσίνη, ήρα πολυάνθη, βρόμος, αγριοβρώμη μεγάλη, αγριοκρίθαρο.

Ετήσια πλατύφυλλα:

Βλήτο τραχύ, λουβουδιά, μαρτιάκος, αντράκλα, καφέλλα, κόνουζα, πολυκόμμι, βερόνικα, στελλάρια, τσουκνίδα μικρή, μολόχα, ξινολάπαθο, άγριο ρόκα, γεράνιο, οξαλίδα.

Πολυετή αγρωστώδη:

Αγριάδα, βέλιουρας.

Πολυετή πλατύφυλλα:

Περιπλοκάδα, αγριοράδικο, ζωχός πολυετής, αγριοτρίφυλλο.



Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  
**SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. ΑΕ**  
info@sipcam.gr | www.sipcam.gr