

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες clethodim και pyraflufen-ethyl που ανήκουν στις ομάδες 1 και 14 κατά HRAC, αντιστοιχώς. Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στη φυλλική επιφάνεια.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας σε τραφτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ετικέτα του.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

(Να μην πλένεται τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους σε οπωρώνες και αμπελώνες να αφήσετε μια αφέαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 10 μέτρων ή
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χημική ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια αφέαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας
Ημ. Παρασκευής:



Ripper®

ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Υγρό Γαλακτωματοποίηση (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

clethodim

12 % β/ο

pyraflufen-ethyl

1% β/ο

Βοηθητικές ουσίες:

85,66 % β/β

Περιεχόμενο:
1 L

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.p.A.
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italia

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά (ΑΑΔΑ):
70573/II-12-2024

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.,
Βασιλέως Κων/νου 32, 19400 Κορωπί
Τηλ.: 210 5223 834
E-mail: info@sipcam.gr



ZIZANIOKTONO

1L

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Περιέχει clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Περιέχει hydrocarbons C10 aromatics <1% naphthalene (EC: 918-811-1).
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: P5J5-TVP8-H81W-T4A6

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Εφαρμογή με **τρακτέρ**: φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Εφαρμογή με **ψεκαστικά μέσα χειρός**: φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

Κατηγορία και τρόπος άρσης: Μεταφωρητικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστικών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Η δραστική ουσία clethodiol είναι αναστολέας του ενζύμου ακετυλο-CoA καρβοξυλάση και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων που είναι ουσιώδεις για τον σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών. Απορροφάται από το φύλλωμα και μεταφέρεται στο ακροίο μερίστωμα αναερότατος, την ανάπτυξη του. Καταπολέμα αποτελεσματικά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Η δραστική ουσία pyraflufen-ethyl είναι αναστολέας του ενζύμου οξείδωση στο πρωτοπομφυρινόγόνου (PPO) και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης. Καταστρέφει τις μεμβράνες των λιπιδίων και των πρωτεϊνών με αποτέλεσμα τη διάλυση των κυττάρων. Καταπολεμά αποτελεσματικά πλατύφυλλα ζιζάνια.

Τα συμπτώματα είναι ορατά στα ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια 10-20 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, όπου σταματούν να αναπτύσσονται, τα φύλλα κιτρινίζουν και τελικά νεκρώνονται. Στα πλατύφυλλα ζιζάνια τα συμπτώματα εμφανίζονται 3-5 ημέρες μετά την εφαρμογή με νέκρωση φυλλών και τελικά νέκρωση του φυτού.

Τρόπος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καυπηρών. Εφαρμόζεται χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με τα διάφορα μέρη των καλλιέργειών. Στις καλλιέργειες δέντρων και αμπελιού, ο ψεκασμός εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης έτσι ώστε η τελική ψεκασμένη έκταση να αντιστοιχεί στο 30% (μέγιστο) της συνολικής έκτασης της καλλιέργειας.

Στους αγρούς σε αγρανάπαυση και στα όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη, ο ψεκασμός γίνεται εντοπιζόμενα (spot) έτσι ώστε η τελική ψεκασμένη έκταση να αντιστοιχεί στο 30% (μέγιστο) της συνολικής έκτασης αυτών.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινείτε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή με τρακτέρ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας και διατηρείστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

Εφαρμογή με ψεκαστικά μέσα χειρός: αναμειγνύετε πολύ καλά το διάλυμα και εφαρμόζετε αμέσως.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ. ΠΕΡ.

Αμπελί (επιτραπέζιες και ονοποισήσιμες ποικιλίες): Για **Ετήσια και πολυετή αμρωστώδη και πλατυφύλλα ζιζάνια** - **Αποθήραση λαιμαργών βλαστών**: **Δόση**: 200 κ.κ./στρ. Κατεβυθόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλλυπνών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το **30%** της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση **60κ. εκ. σκ./στρ.** Από τον λαιμό των βλαστωφόρων σφραγμών μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών (BBCH 00-79). Μεν. Αρ.εφα.ανά καλ. περ./ε.ε. Εφασ.: 1.

Μηλοειδή (Μηλιά, Χαλδισιά, Κυδωνιά, Κουρσουλιά, Ιαπωνική μουςμουλιά), Πυρηνόκαρπα (Βερικοκιά, Ροδανθιά, Δαμασκήνια, Κερασιά), Φουντούκια, Καρυδιά, Καστανιά, Ροδιά, Λωτός : Για Εξόχως και πολυετή αρρωστήματα και πλατύφυλλα ξιζάνια* - Αποξήρανση πα-
ραφρούδων: 200 κ.εκ./σπ. Κατεψυγόμενος φρεσκοίος με χρήση προστατευτικών καλυ-
πνών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να φεκαθεί έως το 30% της καλλιεργε-
υμένης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μείγηση 60 κ.εκ. σκ./σπ. Από τον λήθαργο των βλα-
στώνων σφαλμάτων μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή (BBCH 00-87). Μεγ. Αρ.ε-
φα. ανά κ.κ. περ./μ.ε. Εξοχ. 1:

Εσπεριδόθηκε (Πορτογαλία, Γκρεϊντ – φρουτ, Λεμονιά, Μανταρίνια, Λιμπετία (Πάσινα Λεμόνια): Για Ετήσια και πολυετή αρωματώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* - Αποξείρανση πο-
ταφυδιών. Δόση: 200 κ.ε./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυ-
πμών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργε-
μενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση **60κ.ε. κ.ε./στρ.** Από τον λήθαργο των βλα-
στών ανθοφορούν μέχρι: οι καρποί να είναι ώριμοι για κατάσπαλση (BBCH 00-89). *Μεγ. Αρ.ε-
φαρ. ανά καλ. περ. / μ.εφ.* 2/20.

Αμυγδαλιά: Για Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* - Αποξήρανση παραφυάδων: Δόση: 200 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το **30%** της καλλιέργειας.

μενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση **60κ.εκ. σκ./στρ.** Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή (BBCH 00-87). Μεγ. Αρ.ε-φαρ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρ.: 2/20.

**Αγροί σε αγρανάπαισι, Όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη: Για Ετήσια και πολυετή αγρω-
σταθή και πλατύφυλλα ζιζάνια*: Δόση: 200 κ.εκ./στρ. Εντοπιζόμενη (spot) εφαρμογή με χρη-
ση προστατευτικών καλυπτρών με μέγιστο ψεκασμένη έκταση **30%** που αντιστοιχεί σε μέγι-
στη δόση **60κ.εκ. κ/στρ. Μεν. Αγρ.εφαρ.ανά κλ. περ./μέσ. Εφαρ.: 1 ανά 2 έτη.****

Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.): Για όλες τις καλλιέργειες: 20-40

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.
2. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά.
3. Η χρήση στη μοναρινιά περιλαμβάνει την κλημεντίνη.
4. Να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμειλιού Κορινθιακής σταφίδας και Σουλτανιάς και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυσταλλά και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
5. Η εφαρμογή να γίνεται σε ζιζάνια που βρίσκονται σε ζωήρη ανάπτυξη. Απαιτείται επαρκές φύλλωμα για τη σωστή απορρόφηση του σκευασμάτος.
6. Η εφαρμογή για αποξήρανση παραφυάδων ή λαίμαργων βλαστών να γίνεται όταν έχουν μήκος έως 10-20 εκ.
7. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος με καλύπτρα αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με οποιοδήποτε τμήμα της καλλιέργειας.
8. Συνιστάται η χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους.
9. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα παρουσία ανέμου, όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή ή υψηλή υγρασία ή όταν αναμένεται βροχόπτωση.

***Καταπολεμούμενα ζιζάνια:**

-Αμπέλι:

<u>Ετήσια ευαίσθητα ζιζάνια</u>	<u>Πολυετή ευαίσθητα ζιζάνια</u>
Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
Βλήτο τραχύ (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	
Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>)	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>)
Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>)	Ζωχός πολυετής (<i>Sonchus arvensis</i>)
Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	Περιπλοκάδα (<i>Convolvulus arvensis</i>)
Πόα κοινή (<i>Poa annua</i>)	
Σετάρια πράσινη (<i>Setaria viridis</i>)	

- Πυρηνόκαρπα

Ετήσια ευαίσθητα ζιζάνια	Πολυετή ευαίσθητα ζιζάνια
Βερόνικα (<i>Veronica persica</i>)	
Βρόμος (<i>Bromus sterilis</i>)	
Ήρα πολυάνθη (<i>Lolium multiflorum</i>)	Αγριοράδικο (<i>Taraxacum officinale</i>)
Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>)	Ζωχός πολυετής (<i>Sonchus arvensis</i>)
Πόσα κοινή (<i>Poa annua</i>)	Περιπλοκάδα (<i>Convolvulus arvensis</i>)
Στελλάρια (<i>Stellaria media</i>)	
Τσουκνίδα μικρή (<i>Urtica urens</i>)	

- Μηλοειδή, Αγροί σε αγρανάπαυση, Όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη

Ετήσια ευαίσθητα ζιζάνια	Πολυετή ζιζάνια
Αιματόχορτο (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	
Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>)	
Βλήτο τραχύ (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	Ευαίσθητα
Ελευσίνη (<i>Eleusine indica</i>)	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>)
Ήρα πολάνθη (<i>Lolium multiflorum</i>)	Αγριοράδιο (<i>Taraxacum officinale</i>)
Καφέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>)
Κόνυζα (<i>Erigeron canadensis</i>)	Ζωχός πολυετής (<i>Sonchus arvensis</i>)
Λουβουδιά (<i>Chenopodium album</i>)	
Μαρτιάκος (<i>Senecio vulgaris</i>)	Μετρίως ευαίσθητα
Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	Αγριοτρίφυλλο (<i>Trifolium repens</i>)
Πόσα κοινή (<i>Poa annua</i>)	
Πολυκόμποι (<i>Polygonum aviculare</i>)	
Σετάρια πράσινη (<i>Setaria viridis</i>)	

- Εσπεριδοειδή

<u>Ετήσια ζιζάνια</u>	<u>Πολυετή ευαίσθητα ζιζάνια</u>
Ευαίσθητα Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i>) Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i>) Μολόχα (<i>Malva sylvestris</i>) Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Ξινολάπαθο (<i>Rumex acetosa</i>) Πόα κοινή (<i>Poa annua</i>) Ρόκα άγρια (<i>Diotaxis erucoides</i>)	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i>) Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i>) Ζωχός πολυετής (<i>Sonchus arvensis</i>) Περιπλοκάδα (<i>Convolvulus arvensis</i>)
Μετρίως ευαίσθητα Αγριοβρώμη μεγάλη (<i>Avena sterilis</i>) Αγριοκρίθαρο (<i>Hordeum murinum</i>) Βρόμος (<i>Bromus sterilis</i>) Γεράνιο (<i>Geranium sp.</i>) Κόνυζα (<i>Erigeron bonariensis</i>) Οξάλιδα (<i>Oxalis acetosella</i>) Σετάρια πράσινη (<i>Setaria viridis</i>)	

- Ακρόδρυα

<u>Ετήσια ευαίσθητα ζιζάνια</u>	<u>Πολυετή ζιζάνια</u>
Καψέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Πόα κοινή (<i>Poa annua</i>)	Μετρίως ευαίσθητα Αγριοτριφύλλο (<i>Trifolium repens</i>)

- Ροδιά: Ετήσια, Ευαίσθητα: Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum*)

- Λωτός: Ετήσια, Ευαίσθητα: Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis*)

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημερίδες): Αμπέλι: 7, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουςμουλιά, Κερασιά-Βουσιανά, Γκρέιπφρουτ, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά-Κλημενίνη, Λιμπετία, Ροδιά, Αυτός: 10, Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά: 14, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Καστανιά: 20, Αγρόσι σε αγρανάπωση, Όρια αγρών με ακαλλιέρηση νη: --.