

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

**Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτόυγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:**

**Διαχείριση ανθεκτικότητας**

Το σκεύασμα περιέχει τις δραστικές ουσίες clethodim και pyraflufen-ethyl που ανήκουν στις ομάδες 1 και 14 κατά HRAC, αντιστοίχως.

Συνιστάται η εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες ή/και εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα), προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

**Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:**

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Όταν έχει στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό πάνω στη φυλλική επιφάνεια.

**Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:** Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με την ετικέτα του.

**Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:** Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ**

(Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους σε επιφανειακά ύδατα και αμπελώνες να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

- 10 μέτρων ή  
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών τηρείτε από τα επιφανειακά ύδατα μίαν αφέακτη ζώνη προστασίας για την καλλιέργεια της ελιάς και της ακτινιδιάς:

- 14 μέτρων ή  
- 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή  
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή  
- χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%.

Αρ. Παρτίδας: Βλέπε επί της συσκευασίας  
Ημ. Παρασκευής:



# Ripper®

ΜΕΤΑΦΥΤΡΩΤΙΚΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ ΕΠΑΦΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΑΓΡΩΣΤΩΔΩΝ  
ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ ΖΙΖΑΝΙΩΝ

Υγρό Γαλακτωματοποίησης (EC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

clethodim

12 % β/ο

pyraflufen-ethyl

1% β/ο

Βοηθητικές ουσίες:

85,66 % β/β

Περιεχόμενο:  
1 L

Κάτοχος της άδειας: SIPCAM OXON S.p.A.  
Via Sempione 195, 20016, Pero (MI), Italia

Αρ. Άδειας  
Διάθεσης στην  
Αγορά (ΑΑΔΑ):  
70573/II-12-2024

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: :  
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε.,  
Βασιλέως Κων/νου 32, 19400 Κορωπί  
Τηλ.: 210 5223 834  
E-mail: info@sipcam.gr

GR02-08-26/A



ZIZANIOKTONO

1L

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ  
ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ  
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- Περιέχει clethodim. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- Περιέχει hydrocarbons C10 aromatics <1% naphthalene (EC: 918-811-1).
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια και διάχυτη ρύπανση των υδατικών πόρων.

UFI: P5J5-TVP8-H81W-T4A6

**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. Εφαρμογή με τρακτέρ: φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Εφαρμογή με ψεκαστικά μέσα χειρός: φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΟΤΟ:**

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

**Κατηγορία και τρόπος δράσης:** Μεταφωρητικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστίων και πλατύφυλλων ζιζανίων. Η δραστική ουσία clethodim είναι αναστολέας του ενζύμου ακετυλο-CoA καρβοξυλάσης και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση των λιπιδίων οξέων που είναι ουσιώδης για τον σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών. Απορροφάται από το φύλλωμα και μεταφέρεται στο ακραίο μερίστωμα αναστέλλοντας την ανάπτυξη του. Καταπολέμηση αποτελεσματικά ετήσια και πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Η δραστική ουσία ryegrass-ethyl είναι αναστολέας του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου (PPO) και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης. Καταστρέφει τις μεμβράνες των λιπιδίων και των πρωτεϊνών με αποτέλεσμα τη διάλυση των κυττάρων. Καταπολέμηση αποτελεσματικά πλατύφυλλα ζιζάνια.

Τα συμπτώματα είναι ορατά στα ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια 10-20 ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος, όπου σταματούν να αναπτύσσονται, τα φύλλα κτρινίζουν και τελικά νεκρώνονται. Στα πλατύφυλλα ζιζάνια τα συμπτώματα εμφανίζονται 3-5 ημέρες μετά την εφαρμογή με νέκρωση φυλλώματος και τελικά νέκρωση του φυτού.

**Τρόπος εφαρμογής:** Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών. Εφαρμόζεται χωρίς να έρθουν σε επαφή τα σταγονίδια με τα διάφορα μέρη των καλλιεργειών. Στις καλλιεργείες δέντρων και αμπελιού, ο ψεκασμός εφαρμόζεται στις γραμμές φύτευσης έτσι ώστε η τελική ψεκασμένη έκταση να αντιστοιχεί στο 30% (μέγιστο) της συνολικής έκτασης της καλλιεργείας. Στους αγρούς σε αγρανάπωση και στα όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη, ο ψεκασμός γίνεται εντοπισμένα (spot) έτσι ώστε η τελική ψεκασμένη έκταση να αντιστοιχεί στο 30% (μέγιστο) της συνολικής έκτασης αυτών.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινείστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμογή με τρακτέρ: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος μέσα στο ψεκαστικό δοχείο. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας και διατηρείστε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού. Εφαρμογή με ψεκαστικά μέσα χειρός: αναμειγνύετε πολύ καλά το διάλυμα και εφαρμόζετε αμέσως.

**ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ – ΔΟΣΕΙΣ – ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛ. ΠΕΡ.**  
**Αμπέλι** (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες), **Ακτινίδια** (πράσινα, κόκκινα, κίτρινα): Για **Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια\*** - Αποξήρανση **λαιμαργών βλαστών /παρφυάδων:** **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμική φύτευση της καλλιεργείας ώστε να ψεκαστεί έως το **30%** της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση **60**κ.εκ. σκ./στρ. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι την ολοκλήρωση των καρπών (BBCH 00-79). Μεγ. Αρ.εφαρμ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρμ.: 1.

**Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά), Πυρηνόκαρπα** (Βερικοκιά, Ροδακινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά), Φουντουκιά, Καρυδιά, Καστανιά, **Ροδιά, Λωτός** : Για **Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια\*** - Αποξήρανση **παρφυάδων:** **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμική φύτευση της καλλιεργείας ώστε να ψεκαστεί έως το **30%** της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση **60**κ.εκ. σκ./στρ. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή (BBCH 00-87). Μεγ. Αρ.εφαρμ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρμ.: 1.

**Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Γκρεϊν – φρουτ, Λεμονιά, Μανταρινιά, Λιμνεταιία (Πάσινα Λεμόνια)):** Για **Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια\*** - Αποξήρανση **παρφυάδων:** **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμική φύτευση της καλλιεργείας ώστε να ψεκαστεί έως το **30%** της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση **60**κ.εκ. σκ./στρ. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση (BBCH 00-89). Μεγ. Αρ.εφαρμ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρμ.: 2/20.

**Αμυγδαλιά, Ελιά:** Για **Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια\*** - Αποξήρανση **παρφυάδων:** **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμική φύτευση της καλλιεργείας ώστε να ψεκαστεί έως το **30%** της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση **60**κ.εκ. σκ./στρ. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή (BBCH 00-87). Μεγ.

Αρ.εφαρμ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρμ.: 2/20.

**Αγροί σε αγρανάπωση, Όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη:** Για **Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια\*** **Δόση:** 200 κ.εκ./στρ. Εντοπισμένη (spot) εφαρμογή με χρήση προστατευτικών καλυπτρών με μέγιστο ψεκασμένης έκτασης **30%** που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση **60**κ.εκ. σκ./στρ. Μεγ. Αρ.εφαρμ.ανά καλ. περ./ μεσ. Εφαρμ.: 1 ανά 2 έτη.  
**Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.):** Για όλες τις καλλιεργείες: 20-40

#### Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.
2. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά.
3. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει την κλημεντίνη.
4. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσιμένες στο έδαφος ελιές.
5. Οι ελιές που προσορίζονται για παραγωγή ελαιολάδου, μπορούν να συλλεχθούν εάν πέσουν μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση πρόωρης πτώσης των ελιών μετά την εφαρμογή, πρέπει να συλλέγονται αμέσως για να αποφευχθεί η παρατεταμένη επαφή του καρπού με το έδαφος.
6. Να προηγηθεί δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανιά και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρουσάκι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
7. Η εφαρμογή να γίνεται σε ζιζάνια που βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη. Απαιτείται επαρκές φύλλωμα για τη σωστή απορρόφηση του σκευάσματος.
8. Η εφαρμογή για αποξήρανση παρφυάδων ή λαιμαργών βλαστών να γίνεται όταν έχουν μήκος 10-20 εκ.
9. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος με καλύπτρα αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με οποιοδήποτε τμήμα της καλλιεργείας.
10. Συνιστάται η χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους.
11. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα παρουσία ανέμου, όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή ή υψηλή υγρασία ή όταν αναμένεται βροχοπτώση.

#### \*Καταπολεμούμενα ζιζάνια:

#### -Αμπέλι:

| Ετήσια ευαίσθητα ζιζάνια                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Πολυετή ευαίσθητα ζιζάνια                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αιματόχορτο ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )<br>Βλήτο τραχύ ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Μαρτιάκος ( <i>Senecio vulgaris</i> )<br>Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Πόα κοινή ( <i>Poa annua</i> )<br>Σετάρια πράσινη ( <i>Setaria viridis</i> ) | Αγριάδα ( <i>Cynodon dactylon</i> )<br>Ζωχός πολυετής ( <i>Conchus arvensis</i> )<br>Περιπλοκάδα ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) |

#### - Πυρηνόκαρπα

| Ετήσια ευαίσθητα ζιζάνια                                                                                                                                                                                                                                                               | Πολυετή ευαίσθητα ζιζάνια                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Βερόνικα ( <i>Veronica persica</i> )<br>Βρόμος ( <i>Bromus sterilis</i> )<br>Ήρα πολύανθη ( <i>Lolium multiflorum</i> )<br>Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Πόα κοινή ( <i>Poa annua</i> )<br>Στελλάρια ( <i>Stellaria media</i> )<br>Τσουκνίδα μικρή ( <i>Urtica urens</i> ) | Αγριοράδι ( <i>Taraxacum officinale</i> )<br>Ζωχός πολυετής ( <i>Conchus arvensis</i> )<br>Περιπλοκάδα ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) |

#### - Μηλοειδή, Αγροί σε αγρανάπωση, Όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη

| Ετήσια ευαίσθητα ζιζάνια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Πολυετή ζιζάνια                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Αιματόχορτο ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )<br>Αντράκλα ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Βλήτο τραχύ ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )<br>Ελευσίνη ( <i>Eleusine indica</i> )<br>Ήρα πολύανθη ( <i>Lolium multiflorum</i> )<br>Καφέλλα ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )<br>Κόνυζα ( <i>Erigeron canadensis</i> )<br>Λουβουδιά ( <i>Chenopodium album</i> )<br>Μαρτιάκος ( <i>Senecio vulgaris</i> )<br>Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Πόα κοινή ( <i>Poa annua</i> )<br>Πολύκομπος ( <i>Polygonum aviculare</i> )<br>Σετάρια πράσινη ( <i>Setaria viridis</i> ) | <b>Ευαίσθητα</b><br>Αγριάδα ( <i>Cynodon dactylon</i> )<br>Αγριοράδι ( <i>Taraxacum officinale</i> )<br>Βέλιουρας ( <i>Sorghum halepense</i> )<br>Ζωχός πολυετής ( <i>Conchus arvensis</i> )<br><br><b>Μετρίως ευαίσθητα</b><br>Αγριοτρίφυλλο ( <i>Trifolium repens</i> ) |

#### - Εσπεριδοειδή

| Ετήσια ζιζάνια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Πολυετή ευαίσθητα ζιζάνια                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ευαίσθητα</b><br>Αντράκλα ( <i>Portulaca oleracea</i> )<br>Ζωχός ( <i>Conchus oleaceus</i> )<br>Μολόχα ( <i>Malva sylvestris</i> )<br>Μουχρίτσα ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Σινόβλασθο ( <i>Rumex acetosa</i> )<br>Πόα κοινή ( <i>Poa annua</i> )<br>Ρόκα άγρια ( <i>Diplotaxis erucoides</i> )<br><b>Μετρίως ευαίσθητα</b><br>Αγριοβίονη μεγάλη ( <i>Avena sterilis</i> )<br>Αγριοκρίθαρο ( <i>Hordeum murinum</i> )<br>Βρόμος ( <i>Bromus sterilis</i> )<br>Γεράνιο ( <i>Geranium sp.</i> )<br>Κόνυζα ( <i>Erigeron bonariensis</i> )<br>Οξάλιδα ( <i>Oxalis acetosella</i> )<br>Σετάρια πράσινη ( <i>Setaria viridis</i> ) | Αγριάδα ( <i>Cynodon dactylon</i> )<br>Βέλιουρας ( <i>Sorghum halepense</i> )<br>Ζωχός πολυετής ( <i>Conchus arvensis</i> )<br>Περιπλοκάδα ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) |

#### - Ακρόδωρα

| Ετήσια ευαίσθητα ζιζάνια                                                     | Πολυετή ζιζάνια                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Καφέλλα ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )<br>Πόα κοινή ( <i>Poa annua</i> ) | <b>Μετρίως ευαίσθητα</b><br>Αγριοτρίφυλλο ( <i>Trifolium repens</i> ) |

- **Ροδιά: Ετήσια, Ευαίσθητα:** Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum*)

- **Λωτός: Ετήσια, Ευαίσθητα:** Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis*)

- **Ελιά: Ετήσια ευαίσθητα:** Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum*), Λουβουδιά (*Chenopodium album*), Πράσινη σετάρια (*Setaria viridis*), Αγριομάτα (*Solanum nigrum*), Κόνυζα (*Erigeron canadensis*, *Erigeron bonariensis*), Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*). **Πολυετή ευαίσθητα:** Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*)

- **Ακτινιδιά: Ετήσια ευαίσθητα:** Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis*), Κόνυζα (*Erigeron canadensis*, *Erigeron bonariensis*) Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli*). **Πολυετή ευαίσθητα:** Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis*)

**Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες):** Αμπέλι, Ακτινιδιά: 7, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μουσμουλιά, Ιαπωνική μουσμουλιά, Κερασιά-Βυσσινιά, Γκρέιφφρουτ, Πορτοκαλιά, Λεμονιά, Μανταρινιά-Κλημεντίνη, Λιμνεταιία, Ροδιά, Λωτός, Ελιά: 10, Ροδακινιά-Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Βερικοκιά: 14, Αμυγδαλιά, Καρυδιά, Φουντουκιά, Καστανιά: 20, Αγροί σε αγρανάπωση, Όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη: --.