

Τρόπος δράσης: Το **Sirtaki®** είναι αποτελεσματικό σε αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια που δρο μέσα την απορρόφηση του από τις ρίζες και τους νεαρούς βλαστούς των ζιζανίων στόχων αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών. Απορροφάται από τις ρίζες και τους βλαστούς και μετατοπίζεται προς το πάνω μέρος του φυτού.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός σε υγρό έδαφος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε τον ψεκαστήρα με το 30-50% του απαιτούμενου νερού. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του προϊόντος συνεχίζοντας την ανάδευση και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμει αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*, στις ακόλουθες καλλιέργειες, δόσεις και χρόνους εφαρμογής:

Πατάτα: Εφαρμογή μετά το τελευταίο αλκάωμα και πριν από την εμφάνιση ριζώνιων στο έδαφος με δόση 30 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.:** 20-50. **Ρυζί** (απαρμένο σε τηγάνια με νερό: Εφαρμογή πριν από τη σπορά της καλλιέργειας με δόση 50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.:** 15-60. **Ρυζί** (απαρμένο σε τηγάνια με νερό: Εφαρμογή νωρίς μεταφύτευτικά στα 2 έως 4 φύλλα της καλλιέργειας με δόση 50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.:** 15-60. **Ρυζί** με έληξη σπορά: Εφαρμογή προφυτωρτικά της καλλιέργειας με δόση 50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.:** 15-60. **Ρυζί** με έληξη σπορά: Εφαρμογή νωρίς μεταφύτευτικά στα 2 έως 4 φύλλα της καλλιέργειας με δόση 50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.:** 15-60. **Σόγια:** Εφαρμογή προφυτωρτικά της καλλιέργειας με δόση 40 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.:** 15-40. **Καπνός:** Εφαρμογή στη γραμμή μετά τη μεταφύτευση με δόση 50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.:** 15-40. **Καπνός:** Εφαρμογή στη γραμμή μετά τη μεταφύτευση με δόση 50 κ.εκ./στρ. **Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.:** 20-50.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 1 για όλες τις καλλιέργειες.

* Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: *Portulaca oleracea* (αντράκλα).

ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΛΙΣΘΗΤΑ ΕΙΔΗ:

Ευαίσθητα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια: *Echinochloa crus-galli* (μοιχρίτσα), *Panicum dichotomiflorum* (άνισα διχοσυνική), *Setaria viridis* (ασπρά).

Ευαίσθητα ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια: *Abutilon theophrasti* (αγριοβαμβάκι), *Solanum nigrum* (αγριοσταμάτι), *Chenopodium album* (χρηνοπόδιο).

Παρατηρήσεις:

1. Ψεκάστε σε καλά προετοιμασμένο επίπεδο έδαφος, χωρίς οβόλους.
 2. Η δράση του σκευάσματος στις επιφανειακές εφαρμογές επιβεβαιώνεται σημαντικά από την εδαφική υγρασία. Εάν δεν βρέξει σε 7-10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται όρδευση περίπου 10mm νερού για την ενσωμάτωση – ενεργοποίηση του σκευάσματος στο έδαφος.
 3. Ομοιόμορφη σπορά σε βάθος τουλάχιστον 3-4cm για όλες τις καλλιέργειες, προσέχοντας ώστε να μην μείνουν οι σπόροι ακάλυπτοι (εκτός από ρυζί (απαρμένο σε τηγάνια με νερό)).
 4. Η εφαρμογή του να γίνεται με ήπιο καρό.
 5. Εάν η εφαρμογή γίνει καθυστερημένα μπορεί να προκληθούν παροδικά συμπτώματα λεύκανσης χωρίς όμως καμία επίδραση στην παραγωγή.
 6. Τυχόν διασπορά του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε γειτονικές καλλιέργειες.
- Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:** Πατάτα, Ρυζί, Σόγια, Καπνός. Όριζεται από τον χρόνο εφαρμογής.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Η δράση του προϊόντος εκδηλώνεται κατά το ψήσιμα των ζιζανίων. Για επαύξηση της εκλεκτικότητας συνιστάται η σπορά των καλλιεργειών να γίνεται στο συνιστώμενο βάθος σποράς. Σε πολύ επιφανειακά τοποθετούμενους σπόρους καλλιεργειών σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων μετά την σπορά η εκλεκτικότητα του σκευάσματος να μειωθεί. Λόγω του τρόπου δράσης της δ.ο. Clomazone μπορεί να εμφανισθούν συμπτώματα λεύκανσης της καλλιέργειας. Τα συμπτώματα αυτά εξαφανίζονται εντός 1-3 εβδομάδων χωρίς συνέπειες στην ανάπτυξη και στην τελική παραγωγή της καλλιέργειας.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοεργασίες ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να απολειστεί:

ΠΡΟΣΟΧΗ. ΜΗ ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΟΤΑΝ ΦΥΣΙΛΕΙ.

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ), όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν: Μην σπέρνετε ή φυτεύετε νέες καλλιέργειες για 6 μήνες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος εκτός των ακόλουθων εξαιρέσεων:
- Σπορά σόγιας, καρότου, μπικελίου, φασολιών, κουκιών, φαγόσαραβότου ή φύτευσης πατάτας ή μεταφύτευσης καπνού και πιπεριάς, μετά από αναστροφή του εδάφους.

- Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας του ρυζιού μπορεί να γίνει επανασπορά ρυζιού σε ξηρό έδαφος. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να επαναληφθεί ο ψεκασμός με οποιοδήποτε σκεύασμα περιέχει Clomazone.

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Οι εργάτες να μην εισέρχονται στον ψεκασμένο αγρό πριν στεγνώσει το ψεκαστικό διάλυμα (6 ώρες).

Sirtaki®

Προφυτωρτικό και μεταφύτευτικό ζιζανιοκτόνο επαφής

ΜΙΚΡΟΚΑΦΟΥΛΑΣ ΣΕ ΑΙΩΡΗΜΑ (CS)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Clomazone:

36% (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες:

67.98% (β/β)

Περιεχόμενο:
1 L

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά:
70.28/04-04-2018

Κάτοχος της άδειας – Υπεύθυνος για την τελική διάθεση
πριν αγορά: SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μον. ΕΠΕ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί – Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr



ZIZANIOKTONO

1 L

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

«Φοράτε κατάλληλα γάντια κατά την ανάμιξη-φόρτωση και ολόκληρη φόρμα εργασίας και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή».

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικές πληροφορίες

Δείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στο γιατρό.

Συνιστάται ιατρική παρακολούθηση για τουλάχιστον 48 ώρες μετά το συμβάν.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΗΣΗΣ: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό (οφθαλμίατρο).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Συμβουλευθείτε /Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση απορρόφησης των αισθηρών τοποθετήστε τον ασθενή σε σταθερή πλάγια στάση για μεταφορά.

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

ΓΙΑΤΡΟΙ: Ακολουθείστε θεραπεία συμπτωματική.

ΤΗΛΕΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-77.93.777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ

Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λθόστροτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους, κατά την εφαρμογή σε ρυζι και καπνό να αφήσετε μία αέριστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τη μη γεωργική γη.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Πλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό (σάπουνι) και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις φορές με καθαρό νερό. Πριν το ξαναχρησιμοποίησης, ξεπλύνετε το πάλι με άφθονο νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας ξεπλύνονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστράψουν προηγούμενες με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποστρέφεται σε σημεία συλλογής για ανάλυση ή ενεργείας. Καθαίρεση εγκαταστάσεων για το σκεύος αυτό η καταστροφή, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του, σε χύριο ξηρό, καλά αεριζόμενο, δροσερό.



- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
- Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής:

Βλέπε φιάλη

