

Staple® SL

ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ (SL)

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Pyriithiobac - sodium 38.3% (β/ο)
Βοηθητικές ουσίες 65,84% (β/β)
Χημική ομάδα: Ανάλογο βενζοϊκού οξέος - Πυριμιδίνης

Περιεχόμενο: 200cc

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά:
70.157/30-03-2026

Ημ. Λήξης της Εγκρ.
Κυκλοφορίας:
28-07-2026

Κάτοχος της άδειας:
Α.Σ. Δημητριακών Ορεσιτιάδας « Η Ένωση »
ΣΚΡΑ 19, Τ.Κ. 68200, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α. Ε.
Βασ. Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί
Τηλ.: 2105223834, E-mail: info@sipcam.gr



ZIZANIOKTONO

200cc

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά για τον έλεγχο ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων από σπόρο ή και ανεπτυγμένων στο βαμβάκι.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
- Υποπτο για πρόκληση καρκίνου
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Δηλώσεις προφύλαξης: • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης. • Πλυθείτε σχολαστικά μετά το χειρισμό. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. • Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμένει καλέστε γιατρό. • Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και καλέστε προληπτικά γιατρό. Εάν ο ασθενής είναι αναισθητός διατηρήστε σε σταθερή θέση για μεταφορά. • Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα χωρίς να καταπιείτε. Μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό. **Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. **ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**

UFI: KRD2-T17K-QC04-7E7S

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Μην μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.
Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αιθέραστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.
Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους τηρείτε μίαν αιθέραστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική: - 10 μέτρων ή - 5 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή - χρησιμοποιείστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%
Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: Βλέπε Φιάλη
ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:



ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΟΙΞΤΕ ΕΔΩ

STAPLE® SL

Τρόπος δράσης: Εμποδίζει την σύνθεση αμινοξέων των φυτών και οδηγεί σε νέκρωση των ιστών. Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων τα οποία σταματούν να αναπτύσσονται και γίνονται χλωρωτικά μετά από 5-10 ημέρες. Τα ευαίσθητα ζιζάνια ξηραίνονται σε 2-4 εβδομάδες ενώ άλλα παραμένουν πράσινα αλλά δεν αναπτύσσονται και είναι ανενεργά.

Τρόπος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με πίεση μικρότερη από 2,5 atm με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, με μπέκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε την φιάλη πριν την εφαρμογή. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση και προσθέτουμε αναδεύοντας την συνιστώμενη δόση του σκευάσματος. Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές προτείνεται η προσθήκη του επιφανειοδραστικού KRITÓN στην συνιστώμενη δόση, υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας συνεχώς.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ/ΖΙΖΑΝΙΟ – ΔΟΣΕΙΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος/ζιζάνιο	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος Αριθμός εφαρμογών / καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα (max)	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα/στρ.)		
Βαμβάκι	Πορφυρή κύπερη (<i>Cyperus rotundus</i>) Ακανθώδης σίντα (<i>Sida spinosa</i>) Βλήτο λεπτό (<i>Amaranthus viridis</i>)	12-18*	20-40	Προσπαρτικά , με ελαφρά μηχανική ενσωμάτωση ή Μετασπαρτικά-προφυτρωτικά , με ελαφρύ πότισμα φυσικής ή τεχνητής βροχής	1
	Αγριοβαμβάκι (<i>Abutilon theophrasti</i>) Αγριομελιτζάνα (<i>Xanthium strumarium</i>) Τραχύ βλήτο (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Τάτουλας (<i>Datura stramonium</i>) Αγριοτοματιά (<i>Solanum nigrum</i>) Ακανθώδης σίντα (<i>Sida spinosa</i>) Φυσαλίδα (<i>Physalis angulata</i>) Αγροποινόσεται (<i>Euphorbia heterophylla</i>) Κύπερη (<i>Cyperus spp</i>)	18			
				Μεταφυτρωτικά Εφαρμογή στα 2-6 φύλλα ανάπτυξης	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Το προϊόν εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο βαμβάκι. Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι' αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες άλλες καλλιέργειες.
- Η εφαρμογή του STAPLE να αποφεύγεται σε περιοχές όπου οι εδαφοκλιματικές συνθήκες μπορεί να ευνοήσουν την έκλυση των μεταβολιτών στα υπόγεια ύδατα (δηλαδή σε αμμώδη εδάφη, σε περιοχές με υψηλή βροχόπτωση).

*Σε εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία ή άργιλο: 18 κ.εκ./στρ. Μέσης σύστασης εδάφη με λίγη οργανική ουσία: 15 κ.εκ./στρ. Ελαφρά εδάφη φτωχά σε οργανική ουσία: 12 κ.εκ./στρ.

Για τις μεταφυτρωτικές εφαρμογές:

- Να γίνονται μόνο επ' όσον το βαμβάκι και τα ζιζάνια δεν είναι σε κατάσταση στρες από κρύο, ξηρασία, υγρασία, προσβολές εντόμων ή άλλο.
- Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι πάνω από 21° C και το βαμβάκι αλλά και τα ζιζάνια θα πρέπει να είναι σε κατάσταση ζωηρής ανάπτυξης.
- Προτείνεται η χρήση σε συνδυασμό με το επιφανειοδραστικό σκεύασμα KRITÓN στην κατάλληλη δόση.
- Μην ψεκάσετε αν αναμένεται βροχή στις επόμενες 4 ώρες.

Για τις μετασπαρτικές - προφυτρωτικές εφαρμογές:

- Το έδαφος θα πρέπει να είναι φιλοχλωματισμένο.
- Εάν δεν βρέξει εντός 4-7 ημέρες μετά την εφαρμογή να ακολουθήσει πότισμα με τεχνητή βροχή.
- Να μην αυξάνετε τις δόσεις και να αποφεύγετε τα διπλοπεράσματα.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας: Δεν είναι φυτοτοξικό για την προτεινόμενη καλλιέργεια και δόσεις. Είναι πιθανόν κατά την 1^η - 2^η εβδομάδα μετά την εφαρμογή να παρατηρηθούν χλωρώσεις στα φύλλα του βαμβακιού. Το φαινόμενο είναι συνάρτηση της δόσης που τελικά χρησιμοποιήθηκε. Είναι όμως παροδικό και δεν επηρεάζει την ανάπτυξη της καλλιέργειας ή τις αποδόσεις.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας βαμβακιού στην οποία χρησιμοποιήθηκε το STAPLE® SL, στον ίδιο αγρό, την ίδια περίοδο, μπορεί να ξανασπαρεί βαμβάκι.
- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Στο χωράφι που εφαρμόστηκε το STAPLE® SL μπορούν να σπαρθούν τα εξής: σιτάρι μετά από 4 μήνες, 30 ημέρες για όσπρια/ελαούχους σπόρους.
- **της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:** Μην εισέρχεστε στη ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στη φυλλική επιφάνεια.

Καθαρισμός ψεκαστικών μέσων: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού τρεις (3) φορές, απομακρύνοντας όλα τα ίχνη του σκευάσματος με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά, με καθαρό νερό. **Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Η απόσυρση ή η καταστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνεται σε εμπορικούς αποτεφρωτές. Άδειες συσκευασίες θα πρέπει να πλένονται καλά με άφθονο νερό και τα νερά του ξεπλύματος να προστίθενται στο ψεκαστικό υγρό. Μετά τη διαδικασία αυτή οι άδειες συσκευασίες αποσύρονται είτε με καύση σε αποτεφρωτή είτε ως οικιακά απόβλητα αφού προηγουμένως καταστεί (π.χ. με τρύπημα) αδύνατη η περαιτέρω χρήση τους.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βαμβάκι: Μη εφαρμοσμένο.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί: Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία pyriithiobac-sodium που ανήκει στην ομάδα B2 κατά HRAC. Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κτλ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 έτη όταν αποθηκεύεται κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.