

Stelth® 50 SC

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαμβάκι

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ (SC)

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Fluometuron (φλουομετουρόν):

50% (β/ο)

Βοηθητικές ουσίες:

56.12 % (β/β)

Περιεχόμενο:
5 L

Αρ. Άδειας
Διάθεσης στην
Αγορά:
70371/20-01-2020

Κάτοχος της άδειας – Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32, Τ.Κ. 19400 Κορωπί - Αττικής
Τηλ.: 210 5223 834, Fax: 210 5223 139, E-mail: info@sipcam.gr



SIPCAM

ZIZANIOKTONO

5L

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τρόπος δράσης: Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση.

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιομόρφος ψεκασμός του εδάφους προφυτρωτικά αμέσως μετά την σπορά. Η εφαρμογή για γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιόμετρα ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακατεύει καλά τη φυάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευασμάτων σε μικρή ποσότητα νερό και ρίξτε το στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό υπό συνεχή ανάδευση.

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΣΤΟΧΟΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Καταπολέμηση αγριωνοτών και πλατυμέλεων ζιζανίων.

Δοσολογία: Μία εφαρμογή προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά (ΒΒΧΗ 01-03).

Βάθος: 200-400 κ.ε.κ/στρ.

Όγκος ψεκ.υγρ. λίτρ./στρ.: 30-50.

Παρατηρήσεις:

- Η δόση είναι ανάλογη με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και αι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.
- Σε 7-10 μέρες από την προφυτρωτική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. ώστε να 'ενεργητοποιηθεί' το φλουμεντόλ.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε αμείβωτα εδάφη.

Καταπολεμώμενα ζιζάνια:

Ευαισθητά Αγριωνοτόνα ζιζάνια:

Μουχρίτσα (*Echinochloa* sp.)

Ευαισθητά Πλατύφυλλα ζιζάνια: Αγριοβαμβάκι (*Abutilon theophrasti*)*, Αγριοελιτζάνα (*Xanthium strumarium*)*, Αγριονιόττα (*Solanum nigrum*), Αγριοπεπέρια (*Polygonum persicaria*), Αγριο σινάρι (*Sinapis arvensis*), Αντράκλα (*Portulaca oleracea*), Βήλητα (*Amaranthus* sp.), Ζυγκί (*Onchus* sp.), Ήλιωτροπία (*Heliotropium europaeum*)*, Λάπαθο (*Rumex* sp.), Λουβουδιές (*Chenopodium* sp.), Μαρτάκος (*Senecio vulgaris*), Πολυκόκκιο (*Polygonum aviculare*), Τάτουλα (*Datura stramonium*), Τριβόλι (*Tribulus terrestris*), Χαμομηλιά (*Matricaria recutita*)

Μετριας ευαισθησία ζιζάνια:

Χρυσόφωρα (*Chrozophora thraictica*), Δωδεκανότι (*Lamium amplexicaule*), Στάρις (*Setaria* sp.), *Καταπολεμούνται καλύτερα με τη μεγάλη δόση

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Βαμβάκι: Μη εφαρμοσμένο, καλύπτεται από το χρώ-νο εφαρμογής του σκευασματος.

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυ-τά τα προϊόντα του: Είναι εκλεκτικό στο βαμβάκι και δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.

Συνδυασμός δράσης --

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Αμέσως μετά τον ψεκασμό καθαρίστε ενδελεχώς τον εξοπλισμό ψεκασμού. Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυθίο και ξεπλύνετε το δοχείο ψεκα-σμού, την αντλία και τα ακροφύσια 3 φορές με καθαρό νερό μέχρι να απομακρυνθούν οι αφρός και τα ίχνη του προϊόντος.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευα-σίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, μπιτόνια) ξεπλύνονται υπό πίεση με κατάλληλο μη-χανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγούμενος με τριψύμια για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, αναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασματος: Διατηρείται στην αρχική του απορραβιστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από ηλιακό φως. Στις αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγο-φόμενη ημερομηνία παρασκευής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

- Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια και συσκευή προστασίας ματιών. • Διάθεση περιεχομένου/ περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • Φοράτε γάντια και ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτιση και κατά την εφαρμογή. • Φοράτε γάντια, μακρομάνικο ποκάμισο και μακρύ παντελόνι κατά την επανέσβαση στην καλλιέργεια.

Πρώτες Βοήθειες – Αντίδοτο:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: ζητείστε ιατρική βοήθεια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ ΚΑΤΑΡΣΗΣ: καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιασφαλισία. Διαφοροτο το στόμα. Σε περίπτωση ζητήστε ιατρική βοήθεια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν παρατηρήσει ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση εισπνοής μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: 210 77 93 777

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης».

ΜΗ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

(Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Να αποφευχθεί η ρύπαν-ση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιβαστρίτσες, επιφανειακά και τους δρόμους).

Για να προστατέψετε το **φύτο-μη-στόχος** τηρείτε από τις γεωτονικές καλλιέργειες: μην αψηφάτε ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωτονική ή τη χρησιμοποιείτε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **75%**.

Όταν η καλλιέργεια γεωτονίζει με κατοικημένη περιοχή να αφήνεται ζώνη ασφαλείας **10 μέτρων** από αυτή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά **50%**.

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογόνες ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκευασμα είναι να χρησιμοποιηθεί ή να αποκηλείται:

Διαχείριση ανθεκτικότητας:

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας υποθέστε: εναλλακτικές προκτικές αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανικές, καλλιεργητικές), όπου είναι εφικτό ή κάνετε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα με δια-φορετικό τρόπο δράσης.

Χρονική απόσταση ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- **σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:** Σε περίπτωση αποτυχίας της καλ-λιέργειας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκευασμα, στον ίδιο αγρό, μπορεί να σπαρθεί μό-νο βαμβάκι.
- **σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:** Μη σπείρετε και μη φυτέψετε άλ-λη καλλιέργεια πριν περάσουν 6 μήνες από την εφαρμογή του και μετά από βαθύ όργωμα.
- **της πρόσβασης του ανθρώπου και των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκευασμα:** Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υποπλο για πρόκληση κερκίνου
- Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

UFI: J1A1-H332-KA03-JG61

Αρ. Παρτίδας:
Ημ. Παρασκευής:

Βλέπε φυάλη

